



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y EL NEUMOCOCO
TEMPORADA 2013-2014**

ANEXO IV: RECOMENDACIONES ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

1. **Informar al paciente sobre riesgos y beneficios de las vacunas.**
2. **Identificar posibles contraindicaciones y precauciones:**

ANAMNESIS DE CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES para la vacuna de la gripe:

- ¿Ha sufrido reacción alérgica grave (de tipo anafilaxia) a dosis previas de la vacuna o a alguno de sus componentes, como proteínas del huevo? No vacunar.
- ¿Es alérgico a algún antibiótico presente en la vacuna? No vacunar. Solicitar otra vacuna de gripe que contenga distinto antibiótico,
- ¿Padece enfermedad aguda grave con o sin fiebre y afectación del estado general? Vacunar al finalizar el periodo de convalecencia.
- ¿Está recibiendo quimioterapia? Esperar 3-4 semanas o a que el nº de granulocitos sea mayor de 1.000/mm3.
- ¿Ha padecido Sdr.Guillain-Barré? No vacunar si antecedente de aparición en las 6 semanas posteriores a la administración de una vacuna antigripal.
- ¿Está sometido a tratamiento anticoagulante? Vacunar vía subcutánea. Excepto con CHIROMAS donde la vía subcutánea está contraindicada. Ver anexo aspectos técnicos de la vacuna (Chiromas y anticoagulación).

FALSAS CONTRAINDICACIONES:

- Administración junto con gammaglobulinas: al ser vacunas inactivadas puede administrarse antes, después o simultáneamente. En este último caso poner en lugares anatómicos diferentes.
- Tratamiento antibiótico en ese momento.
- Madre lactante.
- Edad avanzada.
- Historia de alergia inespecífica o historia familiar de alergia.
- Historia de hipersensibilidad no anafiláctica al pollo o plumas de ave.
- Historia de dermatitis secundaria a la administración tópica de antibióticos o a otro componente de la vacuna.
- Administración concomitante de tratamientos de desensibilización.
- Corticoterapia de corta duración (menos de 2 semanas, aplicada en días alternos con preparados de acción corta a dosis substitutivas) o administrados vía tópica a dosis habituales.
- Niños con asma que reciben corticoterapia intermitente, de mantenimiento, o inhalado.
- Familiares con algún tipo de inmunodeficiencia.
- Tuberculosis pulmonar y pacientes con PPD positiva y menos de un mes del inicio de la quimioprofilaxis.
- Enfermedad aguda benigna como proceso catarral o diarrea en un individuo sano.
- Fase de convalecencia de enfermedad leve.
- Infección simple de vías respiratorias superiores (coriza o catarro), sin fiebre o con fiebre moderada, rinitis alérgica etc.
- Niños y adultos infectados por VIH.