

Vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH)

Más información
en el Portal de Salud

www.salud.jcyl.es/ciudadanos/vacunaciones

Vacunación frente al VIRUS del papiloma humano (VPH)

Prevención del cáncer de cuello de útero

Lo que necesitas saber




Junta de
Castilla y León

Vacunación frente al VIRUS del papiloma humano (VPH)

Prevención del cáncer
de cuello de útero
2016-2017

Prevenírlo hoy

es la salud de mañana



celajay dirección de arte



Junta de
Castilla y León

Lo que necesitas saber?

¿QUÉ ES EL VPH?

El virus del papiloma humano (VPH) pertenece a una familia de virus que causa infecciones de piel y mucosas en varias áreas del cuerpo. Existen más de 100 cepas diferentes de este virus.

Es la causa de **infección de transmisión sexual** más común.

Cualquier persona sexualmente activa puede infectarse por VPH en algún momento de su vida, aunque la mayoría de ellas ni siquiera lo sabrá. La infección por VPH es más frecuente al final de la adolescencia y alrededor de los veinte años.

¿QUÉ ENFERMEDADES PRODUCE EL VPH?

La mayoría de las infecciones producidas por el VPH no causan ningún síntoma y desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden causar cáncer de cuello de útero en las mujeres. Así mismo, también se asocia a otros cánceres menos frecuentes tanto en hombres como mujeres. Además, puede causar verrugas genitales y verrugas en la parte superior del tracto respiratorio.

¿SE PUEDE PREVENIR LA INFECCIÓN POR EL VPH?

Sí. La vacunación es una medida de prevención muy efectiva para evitar la infección por los tipos de VPH 16 y 18 que causan la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero. Sin embargo, sólo es efectiva en personas que no se han infectado previamente con el virus.

Al transmitirse por vía sexual, el uso del preservativo y la reducción del número de parejas sexuales ayudan a prevenir el contagio de esta infección y otras enfermedades de transmisión sexual.

¿POR QUÉ VACUNARSE?

Porque las vacunas actualmente disponibles protegen frente a los tipos de VPH llamados de 'alto riesgo' (tipos 16 y 18) que causan **más del 70% de los cánceres de cuello de útero**.

Al no proteger frente a todos los tipos de VPH que pueden causar cáncer de cuello de útero, las mujeres vacunadas siguen necesitando participar en los programas de prevención de cáncer de cuello de útero con revisiones ginecológicas periódicas.

La vacuna no elimina el virus VPH si ya se ha adquirido.

¿QUIÉNES DEBEN RECIBIR LA VACUNA?

La vacuna es especialmente eficaz en mujeres que nunca han estado expuestas al virus y es por este motivo por el que las autoridades sanitarias recomiendan vacunar a las mujeres **antes del inicio de las relaciones sexuales**. La eficacia de la vacuna puede ser inferior si estas ya se han iniciado.

El Calendario Oficial de Vacunaciones de la Infancia de Castilla y León marca los 12 años para la **vacunación frente al virus del papiloma-humano (VPH)** y establece que se realizará por campaña específica.

Durante este **curso escolar 2016-2017**, esta vacuna está dirigida a **las niñas nacidas en los años 2004 y 2005**.

El Programa de vacunaciones oferta esta vacunación financiada para todas las mujeres nacidas a partir de 1994 no vacunadas con anterioridad.

¿CÓMO SE ADMINISTRA LA VACUNA?

La vacuna se administra mediante inyección intramuscular en la zona superior del brazo.

La pauta de vacunación recomendada **hasta los 14 años** es de **dos dosis**, debiéndose respetar necesariamente un intervalo entre ellas de **6 meses** para garantizar su efectividad. Si la vacunación se inicia en niñas **mayores de 15 años**, la pauta recomendada será de **tres dosis**.

¿DÓNDE VACUNARSE?

La vacuna se administrará en el centro de salud o en el punto de vacunación habitual.

Acuerde en su centro de vacunación la cita más adecuada para cumplir la pauta recomendada.

Vacunación frente al VIRUS del papiloma humano (VPH)

¿CUANDO VACUNARSE?

La primera dosis se administrará **del 5 al 23 de diciembre de 2016**.

La fecha para la segunda dosis se fijará **una vez administrada la primera, pasados al menos 6 meses**.

¿QUÉ CONTIENE LA VACUNA CONTRA EL VPH?

La vacuna frente al VPH se obtiene a partir de partículas que simulan fracciones del virus e inducen la producción de anticuerpos. Sus componentes no son infecciosos ni cancerígenos.

No contiene antibióticos ni conservantes.

¿ES SEGURA LA VACUNA CONTRA EL VPH?

Sí. La vacuna es segura y bien tolerada de forma similar al resto de las vacunas incluidas en el calendario. Los efectos adversos son generalmente leves y de corta duración.

Son frecuentes las reacciones locales en el lugar de la inyección como dolor, inflamación y enrojecimiento. Con menor frecuencia pueden aparecer reacciones generales como fiebre, cefalea, mialgias y síntomas digestivos.

Después de cualquier procedimiento médico, incluido la vacunación, puede producirse un **síncope o mareo**, especialmente en adolescentes. Es aconsejable quedarse sentado o tumbado durante unos 15 minutos después de la vacunación para evitar su aparición.

¿QUIÉN NO DEBE RECIBIR LA VACUNA O DEBE ESPERAR?

La única **contraindicación absoluta** para esta vacuna es haber sufrido una reacción de tipo anafiláctico con una dosis previa o presentar alergia a alguno de sus componentes, incluida la levadura.

No debe administrarse durante el embarazo.