

Información para pacientes

Citisina (Todacitan®) para el tratamiento de la dependencia del tabaco

Citisina está indicada en adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.

Al igual que otros tratamientos farmacológicos para la deshabituación tabaquica, en Sacyl su utilización se plantea en pacientes incluidos en el [Proceso Asistencial Integrado para la atención a las personas fumadoras](#). Es en la fase de acción cuando se valorará la posibilidad de iniciar tratamiento farmacológico.



Posología y forma de administración

La duración del tratamiento es de **25 días**.

Un envase de 100 comprimidos es suficiente para un ciclo de tratamiento completo.

Debe dejar de fumar a más tardar el 5.º día de tratamiento.

En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses, aunque solo se financiará un tratamiento al año de cualquier fármaco para deshabituación.

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima
Del 1º al 3º día	1 comprimido cada 2 horas	6 comp.
Del 4º al 12º día	1 comprimido cada 2,5 horas	5 comp.
Del 13º al 16º día	1 comprimido cada 3 horas	4 comp.
Del 17º al 20º día	1 comprimido cada 5 horas	3 comp.
Del 21º al 25º día	1-2 comprimidos al día	2 comp.

nº de comprimidos al día	Posología en 12 horas					Intervalo
	1	2	3	4	5	
1º día	6	1	1	1	1	cada 2 horas
2º día	6	1	1	1	1	
3º día	6	1	1	1	1	
4º día	5	1	1	1	1	cada 2,5 horas
5º día	5	1	1	1	1	
6º día	5	1	1	1	1	
7º día	5	1	1	1	1	
8º día	5	1	1	1	1	
9º día	5	1	1	1	1	cada 3 horas
10º día	5	1	1	1	1	
11º día	5	1	1	1	1	
12º día	5	1	1	1	1	
13º día	4	1	1	1	1	cada 5 horas
14º día	4	1	1	1	1	
15º día	4	1	1	1	1	
16º día	4	1	1	1	1	
17º día	3	1	1	1	1	cada 6 horas
18º día	3	1	1	1	1	
19º día	3	1	1	1	1	
20º día	3	1	1	1	1	
21º día	2	1	1	1	1	
22º día	2	1	1	1	1	
23º día	2	1	1	1	1	
24º día	2	1	1	1	1	
25º día	2	1	1	1	1	

- ✓ Solo debes tomar citisina (Todacitan®) si tienes la **firme intención de dejar de fumar**.
- ✓ **No debes seguir fumando ni usar productos que contengan nicotina mientras estés con el tratamiento**, porque esto podría provocar reacciones adversas más graves.
- ✓ La posología es compleja y exigente. **Asegúrate de que has comprendido la forma de tomarla.**