

Entidad	Duración del Tratamiento (PROAZA)
<b><u>INFECCIONES RESPIRATORIAS Y ORL</u></b>	
Bronquitis aguda	5 días
Exacerbación de EPOC	5 días. 7 días si <i>P. aeruginosa</i> con criterios de ingreso hospitalario. Muy grave con riesgo de <i>Pseudomonas</i> : 10 días
Neumonía adquirida en la comunidad	<i>S. pneumoniae</i> : 5-7 d. <i>Legionella, Chlamydia, Mycoplasma</i> : 14 d Factores de riesgo para <i>Pseudomonas</i> /SARM: 7-14 d
Neumonía adquirida en el hospital/asociada a VM	7 días. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> : 14 días.
Absceso pulmonar	4-6 sem
Tuberculosis pulmonar	6 meses
Sinusitis bacteriana aguda	5-7 días. Si síntomas severos o comorbilidades: 7-10 días.
<b><u>INFECCIONES GENITO-URINARIAS</u></b>	
Cistitis/ITU no complicada	3 días con Fosfomicina Trometamol. 5 días con otros antibióticos.
ITU recurrente	14 días
ITU complicada	7-14 días.
Pielonefritis no complicada	7 días si quinolonas. 10-14 d si beta-lactámico. Cotrimoxazol: 10 d.
Pielonefritis complicada	Alt. estructural de la vía urinaria: 10-14 d. Pnf focal: 3 sem. Absceso renal: 4 sem.
Prostatitis aguda	28 d.
Prostatitis crónica	4 semanas si quinolonas. 6 semanas si beta-lactámicos
Enf Pélvica inflamatoria	14 días.
<b><u>INFECCIÓN ABDOMINAL</u></b>	
Gastroenteritis	3- 5 d
Diarrea por <i>Cl. Difficile</i>	10 d
Diverticulitis aguda no complicada	7 d.
Diverticulitis aguda complicada	5 días tras drenaje/cirugía.
Peritonitis secundaria comunitaria	5 días (con cirugía o drenaje).
Peritonitis secundaria nosocomial	7 días (con cirugía o drenaje)
Absceso drenado	2-3 días tras drenaje
Absceso no drenado	Hasta resolución del absceso
Colecistitis	Intervenida: 3 días. No intervenida: 7 días
Colangitis	3 días si control adecuado del foco y respuesta clínica. 10 días al menos si no CPRE.
Apendicitis	Flemonosa: 24 h. Gangrenosa 3-5 d. Peritonitis difusa : mínimo 5 d
Diverticulitis	No complicada:3-5 d. Complicada con absceso y/o peritonitis: al menos 10 d (según evolución)
Peritonitis secundaria y terciaria/abscesos intraabdominales	Hasta resolución del cuadro.
<b><u>INFECCIONES VASCULARES</u></b>	

Entidad	Duración del Tratamiento (PROAZA)
<b>Bacteriemia sin endocarditis, foco drenado, catéter retirado</b>	<i>S. aureus</i> no complicada: 14 días <i>S. aureus</i> complicada: 28 d. <i>S. epidermidis</i> y otros SCN: 5 d. BGN: 7-10 d. <i>Enterococcus</i> : 7 d. <i>Candida</i> : 14 días tras primer hemocultivo negativo.
<b>Endocarditis válvula nativa</b>	Protésica tardía: 4-6 sem. Protésica precoz: 6 sem. <i>S. viridans</i> : 2-4 sem. <i>Enterococcus</i> , Gram neg: 4-6 sem. <i>S. aureus</i> : 4 sem. <i>C. albicans</i> , <i>Brucella</i> : 90 d
<b>Endocarditis válvula protésica</b>	ECN, <i>S. aureus</i> : 6-8 sem.
<b>Infección de catéter</b>	ECN: 5-7 días. <i>Enterococcus</i> , Gram -: 7-14 d. <i>S. aureus</i> : 2-4 sem. <i>C. albicans</i> : 14 d desde primer hemocultivo de control negativo.
<b><u>INFECCIONES OSTEOARTICULARES</u></b>	
<b>Artritis</b>	14-28 d.
<b>Osteomielitis aguda</b>	6 sem.
<b>Osteomielitis crónica</b>	3 sem- 6 m
<b>Infección osteoarticular tras extracción de implante</b>	28 d
<b>Infección protésica precoz</b>	8 sem si desbridamiento con retención de prótesis. 6 sem si retirada protésica.
<b>Infección crónica</b>	6 sem si retirada protésica
<b><u>INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS</u></b>	
<b>Celulitis no complicada /erisipela</b>	5-7 días
<b>Celulitis complicada no necrosante/ absceso mayor</b>	5-10 días (si drenaje).
<b>Fascitis necrosante. Pionositis</b>	10-14 días, con tratamiento iv hasta desaparición de clínica sistémica y desbridamiento.
<b>Pie diabético</b>	7-10 d
<b><u>INFECCIONES DEL SN</u></b>	
<b>Meningitis</b>	Neumococo: 10 días. Meningococo: 5-7 d. <i>Listeria monocytogenes</i> : 21 d.
<b>Meningitis nosocomial</b>	<i>S. aureus</i> : 14 días. <i>Ps. Aeruginosa</i> : 21 días. BGN: 14-21 días
<b>Encefalitis aguda</b>	VHS: 14-21 días.
<b>Absceso cerebral</b>	4-6 sem.
<b><u>OTRAS</u></b>	
<b>Fiebre neutropénica empírica</b>	Hasta que esté afebril durante 72 horas.
<b><u>PEDIATRIA</u></b>	
<b>Faringoamigdalitis aguda</b>	10 días
<b>Otitis media aguda</b>	< 2 años: 10 días; 2-5 años: 7 días; > 6 años: 5-7 días Graves/Ingresados: 7-10 días
<b>Sinusitis aguda</b>	10-14 días
<b>Otomastoiditis</b>	14 días; formas complicadas 21 días.
<b>Neumonía adquirida en la comunidad sin ingreso</b>	5-7 días

Entidad	Duración del Tratamiento (PROAZA)
<b>Neumonía adquirida en la comunidad con ingreso</b>	7-10 días. Con afectación del estado general: hasta una semana después de desaparición de la fiebre. Si hay empiema 2-4 semanas.
<b>Sospecha de neumonía por aspiración</b>	14 días
<b>Neumonía en gripe confirmada</b>	5 días
<b>Infección del tracto urinario</b>	<3 meses: 7-14 días >3 meses: 7-10 días >2 años con clínica de cistitis: 3-5 días