

EXUDADO/FROTIS FARINGO-AMIGDALAR

Material



hisopo (con medio de transporte)



depresor lingual

Recogida




frotar cada amígdala y/o faringe posterior utilizando depresor lingual para evitar cualquier contacto con saliva, lengua u otras áreas no relacionadas.

EXUDADO/FROTIS NASOFARÍNGEO


Cultivo de *Bordetella* sp.

Material



dos hisopos con varilla metálica y flexible (bien de alginato cálcico o de Dacrón).

Recogida



Introducir cada torunda por un orificio nasal sin forzar la entrada hasta la nasofaringe posterior. Rotar y dejar dentro durante 30 seg. o hasta que el paciente empiece a toser. Retirar inmediatamente si esto ocurre.

EXUDADO/FROTIS FARINGO-AMIGDALAR

Prueba rápida de antígeno (Antígeno *S. pyogenes*)

Material



hisopo (sin medio de transporte)



depresor lingual

Cultivo de *Neisseria gonorrhoeae* (gonococo)

Material



hisopo (con medio de transporte)



depresor lingual

Recogida:



frotar cada amígdala y/o faringe posterior utilizando depresor lingual para evitar cualquier contacto con saliva, lengua u otras áreas no relacionadas.

EXUDADO/FROTIS NASAL

Cultivo de portadores de *S. aureus*

Material



Hisopo con medio de transporte



solución salina

Recogida

Insertar el hisopo, prehumedecido con solución salina, aproximadamente 1 ó 2 cm dentro de cada fosa nasal

BUCAL

Cultivo de hongos (candidiasis oral)/Sospecha angina de Vincent

Material



Recogida

Recomendar al paciente que se enjuague la boca con una solución estéril. Rotar el hisopo sobre la mucosa oral o encías lesionadas y zonas próximas.