



HAD | Hospitalización
a Domicilio

COMPLEJO
ASISTENCIAL
UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA



INFORMACIÓN A PACIENTES PORTADORES DE TRATAMIENTO CON INFUSOR ELASTOMÉRICO


HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD)

COMPLEJO
ASISTENCIAL
UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA



INFUSOR ELASTOMÉRICO, ¿QUÉ ES?

Son dispositivos que permiten la administración continua o intermitente de medicamentos vía **intravenosa/subcutánea** de forma controlada en el **domicilio** del paciente.



Son un recipiente de plástico rígido y transparente en cuyo interior se encuentra un globo o depósito elastomérico en el que se introduce la medicación a infundir. El globo distendido ejerce una presión constante y **fuerza al medicamento a través del tubo de infusión hacia el catéter del paciente.**

Sus **beneficios** son:

- Es portátil y silencioso.
- No utiliza electricidad o batería.
- Preserva la autonomía, calidad de vida e interacción con la familia.

ALGUNAS RECOMENDACIONES



- Realizar las actividades diarias con normalidad.
- Está permitido realizar ejercicio ligero, como caminar.
- Evitar actividades extremas.
- Asegúrese que el clamp permanece abierto mientras recibe el tratamiento.
- No exponerse ni exponer el infusor a la luz solar directa o al frío intenso.
- Evitar que el infusor esté al alcance de mascotas



- Puede ducharse.
- Proteger el dispositivo y el acceso venoso/subcutáneo del agua cubriéndolos con una bolsa.
- Se recomienda evitar actividades en el agua.



- Dormir boca arriba o del lado contrario al catéter, no acostarse sobre el infusor.
- Ubicar el dispositivo en un lugar seguro (sobre la cama), éste debe estar por encima de la cintura (no colgarlo ni colocarlo sobre el suelo).
- Evitar colocar almohadas térmicas, mantas eléctricas ni bolsas de agua caliente sobre el infusor.

SIGNOS DE ALARMA: Consulte con su equipo de Hospitalización a Domicilio

Fiebre

Enrojecimiento, calor o dolor en la zona del **catéter**

Dolor en el brazo o en el cuello

El **elastómero** no se desinfla o pierde líquido o gotea

O el **catéter** se ha movido



Tiene dudas sobre la **medicación** que ha de tomar o el **horario** de la misma

Presenta un “**nuevo síntoma**” de forma repentina que no haya indicado previamente a los miembros del equipo de **Hospitalización a Domicilio**