



- Cápsulas duras 200 mg

¿QUÉ ES?

Rebetol® es ribavirina, un antivírico que inhibe la multiplicación del virus de la hepatitis C. Se utiliza combinado con peginterferón alfa para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- Informe a su médico si tiene antecedentes de anemia hemolítica, enfermedad cardiovascular o autoinmune, enfermedad psiquiátrica grave o problemas de tiroides.
- Este medicamento puede causar malformaciones al feto:
 - Si es **mujer**, evite el embarazo durante el tratamiento y hasta 4 meses después de terminarlo con medidas anticonceptivas eficaces.
 - Si es **varón**, utilice usted y su pareja un método anticonceptivo eficaz durante y hasta 7 meses después de finalizar el tratamiento. No tenga relaciones sexuales con una mujer embarazada sin utilizar un condón.
 - Confirmar un resultado negativo en el test de embarazo antes del tratamiento y mensualmente.

¿CÓMO SE TOMA?

- **Con alimentos o dentro de las 2 horas tras el desayuno y la cena.** Se favorece la absorción del medicamento.
- Las cápsulas deben tragarse enteras, sin abrir.
- Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda, si han pasado más de 6 horas, espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.
- **Cumpla rigurosamente la dosificación** indicada por su médico.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **didanosina**, puede aumentar el riesgo de acidosis láctica y pancreatitis.
- Comunique a su médico si está en tratamiento con otros inhibidores de la transcriptasa inversa (abacavir, estavudina, lamivudina, zalcitabina, zidovudina).
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Este medicamento puede producir: cambios de humor (irritabilidad, depresión), insomnio, cansancio, dolor de cabeza, debilidad, dolor de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y peso, diarrea o heces blandas, sequedad de boca o de piel, prurito, anemia, caída de pelo. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.
- **Contacte inmediatamente** con su médico si aparece **tos, fiebre y problemas al respirar, hematomas o sangrado, depresión o pensamientos suicidas, cambios en el ritmo cardiaco, trastornos visuales o de audición, o sarpullido generalizado.**
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

