



- Comprimidos recubiertos con película 100 mg / 40 mg

Maviret® es un medicamento que contiene glecaprevir y pibrentasvir, dos antivíricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique.

## ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a glecaprevir, pibrentasvir o alguno de los excipientes de Maviret®. Contiene lactosa, consulte con su médico si padece intolerancia a ciertos azúcares.
- Informe a su médico si tiene problemas hepáticos graves aparte de la hepatitis C.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se dispone de datos suficientes. Los medicamentos anticonceptivos que contienen **etinilestradiol** no se deben utilizar en combinación con Maviret®.

## ¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **3 comprimidos al día con alimentos**, a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus, el grado de fibrosis de su hígado y de si ha recibido tratamientos previos.
- **ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.**

## ¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
  - Si han pasado menos de 18 horas, tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
  - Si han pasado más de 18 horas, espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOME DOSIS DOBLE.**
- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente **SÓLO** si han pasado menos de 3 horas desde que lo tomó. Si ha pasado más de 3 horas, no repita la dosis y siga la pauta habitual.
- Cumpla rigurosamente las indicaciones de su médico. No deje de tomar Maviret® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

## INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **atazanavir** (para la infección VIH), **atorvastatina** o **simvastatina** (para reducir el colesterol en sangre), **carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o primidona** (antiepilepticos), **dabigatrán** (para prevenir coágulos en sangre), medicamentos que contienen **etinilestradiol** (algunos anticonceptivos), **rifampicina** (para las infecciones) o  **hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*,** para tratar la depresión),
- Informe a su médico si toma medicamentos para reducir la actividad del sistema inmunitario (**ciclosporina, tacrolimus**), para la infección por el VIH (**darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir**), para problemas de corazón (**digoxina**), para reducir el colesterol en sangre (**fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina**), para úlceras y otros problemas de estómago (**omeprazol**) o para prevenir coágulos de sangre (**warfarina** u otros medicamentos similares).
- Es muy importante que informe a su médico o farmacéutico de todos los fármacos o plantas medicinales que toma. Consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos. Pueden aumentar la toxicidad o disminuir la eficacia de Maviret®.

## EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: **fatiga, dolor de cabeza, náuseas, diarrea o sensación de debilidad.** Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece síntomas de una reacción alérgica grave (erupción o enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, ...).
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

## ¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su hospital.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es) (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN  
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**  
**Servicio de Farmacia**  
**Tlf:**

