



- Comprimidos recubiertos con película 50/100 mg

Zepatier® es un medicamento que contiene elbasvir y grazoprevir, dos antiviricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique. Se utiliza solo o combinado con ribavirina para tratar la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a elbasvir y grazoprevir o alguno de los excipientes de Zepatier®. Zepatier® contiene **lactosa y sodio**. Consulte a su médico si padece intolerancia a la lactosa o a ciertos azúcares y si sigue una dieta baja en sodio.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de Zepatier® toma **ribavirina** (tanto si lo toma la mujer como el varón).

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **1 comprimido al día con o sin comida** a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus, el grado de fibrosis de su hígado y de si ha recibido tratamientos previos.

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 16 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 16 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOME DOSIS DOBLE.**

ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.

- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente SOLO si han pasado menos de 4 horas desde que lo tomó y queda más de 8 horas hasta la siguiente dosis. Si ha pasado más de 4 horas, no repita la dosis y siga la pauta habitual.
- Cumpla rigurosamente las indicaciones de su médico. No deje de tomar Zepatier® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*, para tratar la depresión), **rifampicina** (antibiótico para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **fenitoína**, **carbamazepina** (antiepilépticos), **bosentan** (para tratar la hipertensión pulmonar), **modafilino** (para ayudar a las personas que no pueden permanecer despiertas), **ciclosporina** (inmunosupresores para prevenir el rechazo de un órgano trasplantado o para tratar enfermedades inflamatorias graves), **ketoconazol** (para el síndrome de Cushing) y los siguientes antivirales para el VIH: **atazanavir**, **cobicistat**, **darunavir**, **efavirenz**, **etravirina**, **lopinavir**, **saquinavir** y **tipranavir**.
- Informe a su médico si **toma dabigatrán, tacrolimus o si toma algún tratamiento para bajar el colesterol en sangre** (atorvastatina, lovastatina, fluvastatina, rosuvastatina o simvastatina).
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que informe a su médico o farmacéutico de todo lo que toma y les consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos o plantas medicinales.

EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: **fatiga y dolor de cabeza**. Si además de Zepatier® toma ribavirina informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, erupción o enrojecimiento de la piel...)
 - Síntomas de problema hepático (fatiga, falta de apetito, náuseas y vómitos, ictericia o color amarillento en ojos o piel, o heces descoloridas)
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su hospital.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en <https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>.

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**

Servicio de Farmacia

Tlo:

