



- Comprimidos recubiertos con película 60 mg

Daklinza es un medicamento que contiene daclatasvir, un antivírico que impide que el virus de la hepatitis C se multiplique. **Se utiliza combinado siempre con otros medicamentos** para tratar la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a daclatasvir o alguno de los excipientes.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de daclatasvir toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón).

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome 1 **comprimido (60 mg) al día con o sin comida**. Tómelo a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus, el grado de fibrosis de su hígado y de si ha recibido tratamientos previos.

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 20 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 20 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOME DOSIS DOBLE.**

ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.

- **Cumpla rigurosamente las** indicaciones de su médico. No deje de tomar Daclatasvir salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia de su hospital.

INTERACCIONES

- **Daclatasvir interacciona con muchos medicamentos. Siempre debe consultar** con su médico o su farmacéutico antes de tomar otros medicamentos o plantas medicinales. Es muy importante porque algunos medicamentos pueden hacer que daclatasvir no sea eficaz o puede que sea necesario cambiar la dosis. También puede ocurrir que daclatasvir aumente la toxicidad de otros medicamentos.
- **No debe tomar** daclatasvir junto a **rifampicina** (antibiótico para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*, para tratar la depresión), **algunos antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina u oxcarbazepina) o dexametasona** entre otros. Su uso conjunto puede hacer que daclatasvir no sea eficaz.
- Informe a su médico de **todos** los medicamentos que tome, especialmente: amiodarona, ranolazina, digoxina (para tratar problemas del corazón), verapamilo, diltiazem, amlodipino o nifedipino (para tratar la tensión arterial alta), claritromicina, eritromicina (antibióticos), ketoconazol (cáncer de próstata o síndrome de Cushing), itraconazol (antifúngico), estatinas (para tratar los niveles altos de colesterol), anticonceptivos orales (es importante ya que puede no ser el más adecuado y deba cambiarlo).

EFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: fatiga, dolor de cabeza y náuseas. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico. Informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
 - Erupción cutánea con fiebre, enrojecimiento, picor, hinchazón de cara o inflamación de ganglios linfáticos.
- Comuníquelo a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA)

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**
Servicio de Farmacia
Tlo:

