



comprimidos recubiertos con película
comprimidos revestidos por película
dasabuvir
Vía oral / Vía oral

- Comprimidos recubiertos con película 250 mg

Exviera® es un medicamento que contiene dasabuvir, un antivírico que impide que el virus de la hepatitis C se multiplique. Se utiliza **siempre combinado** con otros medicamentos (Viekirax® y ribavirina) para tratar la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a dasabuvir o alguno de los excipientes de Exviera®.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se debe usar en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de Exviera® toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón).

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **1 comprimido cada 12h con comida**. Tómelo a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus y del grado de fibrosis de su hígado.

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 6 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. NO TOME DOSIS DOBLE.

ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.

- **Cumpla rigurosamente las** indicaciones de su médico. No deje de tomar Exviera® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia de su hospital.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **etinilestradiol** (anticonceptivo), **carbamazepina**, **fenobarbital** y **fenitoína** (antiepilepticos), **efavirez**, **nevirapina** y **etravirina** (para tratar la infección por VIH), **enzalutamida** (para tratar el cáncer de próstata), **mitotano** (para el cáncer de corteza suprarrenal), **rifampicina** (antibiótico para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **Hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum* para la depresión) y **gemfibrocilo** (para tratar los lípidos altos en sangre).
- Consulte con su médico o farmacéutico si toma rosuvastatina, fluvastatina o pitavastatina (para bajar los niveles de colesterol en sangre)
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que informe a su médico o farmacéutico de todo lo que toma y les consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos o plantas medicinales.

EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: insomnio, fatiga, debilidad, picor de piel y náuseas.
- Informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia) o si aparece una coloración amarillenta en piel y ojos y su orina es más oscura de lo normal (posible problema del hígado).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
 - Fiebre, tos persistente, problemas al respirar o signos de infección.
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**
Servicio de Farmacia
Tlo:

