



- Comprimidos recubiertos con película 12,5/75/50 mg

Viekirax® es un medicamento que contiene paritaprevir, ombitasvir y ritonavir, tres antiviricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique. Se utiliza siempre **combinado** con otros medicamentos (Exviera® y/o ribavirina) para tratar la hepatitis C crónica.

## ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a paritaprevir, ombitasvir, ritonavir o alguno de los excipientes de Viekirax®.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C.
- Informe a su médico si tiene infección por VIH o está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se debe usar en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de Viekirax® toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón).

## ¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **2 comprimidos al día (juntos) con comida**. Tómelo a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus y del grado de fibrosis de su hígado.

## ¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
  - Si han pasado menos de 12 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
  - Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. NO TOME DOSIS DOBLE.

## ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.

- **Cumpla rigurosamente las** indicaciones de su médico. No deje de tomar Viekirax® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

## ¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia de su hospital.

## INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **etililestradiol** (anticonceptivo), **carbamazepina**, **fenobarbital** y **fenitoína** (antiepilépticos), **Norvir®**, **nevirapina**, **efavirenz**, **etravirina**, **indinavir**, **lopinavir/ritonavir**, **saquinavir**, **tipranavir** (para tratar la infección por VIH), **rifampicina**, **ácido fusídico**, **claritromicina**, **telitromicina** (antibióticos), **Hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum* para la depresión), **lovastatina**, **atorvastatina** y **simvastatina** (para tratar los niveles altos de colesterol), **ergotamina y derivados** (para las migrañas), **alfuzosina** (para tratar la hiperplasia benigna de próstata), **sildenafil** (para la disfunción eréctil y la hipertensión pulmonar), **triazolam** y **midazolam** (para el insomnio y la ansiedad), **pimozida** y **quetiapina** (para trastornos psiquiátricos), **amiodarona** (para los trastornos del ritmo del corazón), **colchicina** si tiene usted insuficiencia renal o hepática (para la gota), **salmeterol** (inhalador para el asma o la bronquitis crónica), **ticagrelor** (...), **enzalutamida** (para el cáncer de próstata), **mitotano** (para el cáncer de corteza suprarrenal) e **itraconazol**, **posaconazol**, **voriconazol** (para tratar infecciones por hongos).
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto es importante que informe a su médico o farmacéutico de todo lo que toma y les consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos o plantas medicinales.

## EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: insomnio, fatiga, debilidad, picor o reacciones en la piel (erupción o enrojecimiento) y náuseas.
- Informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia) o si aparece una coloración amarillenta en piel y ojos y su orina es más oscura de lo normal (posible problema del hígado).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
  - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
  - Fiebre, tos persistente, problemas al respirar o signos de infección.
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es) (sección CIMA).

PROGRAMA DE ATENCIÓN  
FARMACÉUTICA AL PACIENTE

Servicio de Farmacia

Tlo:

