

## A.11. Relaciones sexuales





Para la valoración del comportamiento sexual mantenido por los adolescentes de Castilla y León se les preguntó acerca de: si han tenido alguna vez relaciones sexuales completas, la edad a la que las tuvieron por primera vez, con cuántas personas mantuvieron relaciones sexuales completas en los últimos 30 días, si utilizan algún método anticonceptivo, si la última vez que mantuvieron relaciones sexuales completas emplearon los encuestados o su pareja preservativo, si los encuestados o su pareja han utilizado la píldora del día después en alguna ocasión y cuántas veces la han empleado.


El 18,2% de los adolescentes refieren haber tenido alguna vez relaciones sexuales completas (RSC), en mayor proporción los jóvenes del ámbito rural (27,9%) que el urbano (15,7%) ( $p < 0,001$ ), sin hallarse diferencias estadísticamente significativas según sexo. La edad de la primera RSC entre los que sí las han tenido, abarca

desde los 10 a los 17 años, siendo la media a los 14,5 años (mediana a los 15 años).

En cuanto al número de parejas sexuales en los últimos 30 días de los jóvenes que sí mantuvieron RSC, la mayor parte de las chicas (48,5%) refiere haber tenido una pareja (42,6% en los chicos) o dos o más parejas (8,3% de chicas, 7,8% de chicos) mientras que en los chicos es más frecuente no haber tenido ninguna pareja en los últimos 30 días (49,6%, frente al 43,1% en chicas) ( $p = 0,641$ ). Según el ámbito geográfico, la mayoría de los jóvenes del medio urbano (51,6%; 35,1% en medio rural) no han tenido ninguna pareja en el último mes, mientras que en el medio rural es más frecuente haber tenido una pareja (54,7%; 41,4% en medio urbano) o dos o más parejas (10,2%; 7,1% en medio urbano) ( $p = 0,103$ ) (Gráfico 11.1).




Gráfico 11.1. Número de parejas sexuales en los últimos 30 días, por sexo y ámbito geográfico



El 89,7% de aquéllos que han mantenido RSC en algún momento utilizan algún método anticonceptivo; el método más utilizado es el preservativo (83,4%), aunque el 85,2% de los jóvenes indican haberlo utilizado en la última RSC, sin hallar diferencias estadísticamente

significativas por sexo ni ámbito geográfico. Después del preservativo, los métodos anticonceptivos más empleados son: los anticonceptivos orales (7,0%) y el coitus interruptus o marcha atrás (5,7%) (Gráfico 11.2).

Gráfico 11.2. Métodos anticonceptivos empleados



En cuanto al uso de la píldora del día después (PDD), el 16,6% de los adolescentes (los jóvenes encuestados o su pareja) que han mantenido RSC refieren haberla empleado alguna vez (26,0% de chicas y 8,4% de chicos;  $p = 0,002$ ). Entre los que han utilizado la PDD, el 28,4% la han utilizado dos

o más veces, en mayor proporción por los jóvenes del medio rural (37,1%) que del urbano (21,8%), sin ser estas diferencias estadísticamente significativas probablemente debido al pequeño tamaño de la submuestra de jóvenes que han empleado la PDD ( $n = 30$ ) (Gráfico 11.3).

Gráfico 11.3. Número de veces que han empleado la PDD, por sexo y ámbito geográfico

