



- Comprimidos recubiertos con película 400/100 mg

Eplclusa® es un medicamento que contiene sofosbuvir y velpatasvir, dos antiviricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique. A veces se puede utilizar combinado con otro antivirico llamado ribavirina.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a sofosbuvir, velpatasvir o alguno de los excipientes de Eplclusa®.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C o problemas en los riñones.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de Eplclusa® toma **ribavirina** (tanto si lo toma la mujer como el varón).

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **1 comprimido al día con o sin comida** a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración habitual del tratamiento es de 12 semanas.
- **ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.**

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 18 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 18 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOME DOSIS DOBLE.**
- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente SOLO si han pasado menos de 3 horas desde que lo tomó. Si ha pasado más de 3 horas, no repita la dosis y siga la pauta habitual.
- Cumpla rigurosamente las indicaciones de su médico. No deje de tomar Eplclusa® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*, para tratar la depresión), **rifampicina y rifabutina** (antibióticos para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **fenitoína, fenobarbital y carbamazepina** (antiepilépticos). No tome Eplclusa® con otros fármacos que contengan **sofosbuvir**.

- Informe a su médico si toma fármacos para tratar problemas cardiacos como **amiodarona y digoxina**, para fluidificar la sangre como **dabigatran**, para tratar problemas del sueño como **modafilino**, antiepilépticos como **oxcarbamazepina**, para bajar el colesterol en sangre (**rosuvastatina u otras estatinas**), y para tratar el VIH (**efavirenz, tenofovir disoproxil fumarato**).
- Informe a su médico si toma fármacos para reducir la acidez del estómago:
 - Antiácidos que tengan **aluminio, magnesio o carbonato cálcico**: deberá tomarlos al menos 4 horas antes o 4 horas después de Eplclusa®
 - Inhibidores de la bomba de protones (**omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol...**): Eplclusa® deberá tomarse con comidas y 4 horas antes del Inhibidor de la bomba de protones.
 - Antagonistas H₂ (**ranitidina, famotidina, cimetidina...**): deberá tomarlos al mismo tiempo que Eplclusa® o separarlos 12 horas. Puede que su médico disminuya la dosis del antiácido.
- Es muy importante que informe a su médico o farmacéutico de todos los fármacos o plantas medicinales que toma. Consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos. Pueden aumentar la toxicidad o disminuir la eficacia de Eplclusa®

EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: **nauseas, fatiga y dolor de cabeza**. Si además de Eplclusa® toma ribavirina informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
 - Si toma algún medicamento para problemas de corazón y nota falta de aliento, mareo, palpitaciones o desvanecimiento.
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su hospital.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**

Servicio de Farmacia

Tlo:

