



- Comprimidos recubiertos con película 400/100/100 mg

Vosevi® es un medicamento que contiene sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir, tres antiviricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir o alguno de los excipientes de Vosevi®. Contiene lactosa, consulte con su médico si padece intolerancia a ciertos azúcares.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C o problemas en los riñones, o si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se dispone de datos suficientes. Los medicamentos anticonceptivos que contiene **etinilestradiol** no se deben utilizar en combinación con Vosevi®.

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **1 comprimido al día con alimentos**, a la misma hora todos los días. Trague el comprimido entero, sin masticar, partir o disolver (tiene un sabor muy amargo). La duración habitual del tratamiento es de 12 semanas.
- **ES MUY IMPORTANTE QUE TOMÉ TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.**

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 18 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 18 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOMÉ DOSIS DOBLE.**
- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente **SÓLO** si han pasado menos de 4 horas desde que lo tomó. Si ha pasado más de 4 horas, no repita la dosis y siga la pauta habitual.
- **Cumpla rigurosamente** las indicaciones de su médico. No deje de tomar Vosevi® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **carbamazepina, fenitoína o fenobarbital** (antiepilépticos), **etinilestradiol** (algunos anticonceptivos), **dabigatrán** (para prevenir coágulos en la

sangre), **rifampicina y rifabutina** (para las infecciones), **rosuvastatina** (para reducir el colesterol en sangre) o **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*).

- Informe a su médico si toma **amiodarona, ciclosporina, digoxina, modafinilo, oxcarbazepina, rifapentina**, medicamentos para tratar el VIH (**atazanavir, efavirenz, lopinavir o tenofovir disoproxil**), para bajar el colesterol en sangre (**pravastatina u otras estatinas**), o para prevenir coágulos en sangre (**warfarina** u otros medicamentos similares).
- Informe a su médico si toma fármacos para reducir la acidez del estómago:
 - Antiácidos que tengan **aluminio, magnesio o carbonato cálcico**: deberá tomarlos al menos 4 horas antes o 4 horas después de Vosevi®
 - Dosis alta de inhibidores de la bomba de protones (**omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol**) o antagonistas H₂ (**ranitidina, famotidina, cimetidina**)
- Es muy importante que informe a su médico o farmacéutico de todos los fármacos o plantas medicinales que toma. Consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos. Pueden aumentar la toxicidad o disminuir la eficacia de Vosevi®

EFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: **dolor de cabeza, diarrea, náuseas, dolor de estómago, disminución del apetito, vómitos o dolor muscular.**
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (erupción o enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, ...).
 - Si toma algún medicamento para problemas de corazón y nota falta de aliento, mareo, palpitaciones o desvanecimiento.
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su hospital.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**
Servicio de Farmacia
Tlf:

