



- Comprimidos recubiertos con película 90/400 mg

Harvoni® es un medicamento que contiene sofosbuvir y ledipasvir, dos antivíricos que impiden que el virus de la hepatitis C se multiplique. Se utiliza solo o combinado con ribavirina para tratar la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a sofosbuvir, a ledipasvir o alguno de los excipientes de Harvoni.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C o problemas en los riñones.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de Harvoni toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón).

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome **1 comprimido al día con o sin comida** a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus, el grado de fibrosis de su hígado y de si ha recibido tratamientos previos.
- Si está tomando algún antiácido, tómelo al menos 4 horas antes o al menos 4 horas después de Harvoni®. Si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol) tómelo al mismo tiempo que Harvoni®, no lo tome antes.

¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
 - Si han pasado menos de 18 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Si han pasado más de 18 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. NO TOME DOSIS DOBLE.

ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.

- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente SOLO si han pasado menos de 5 horas desde que lo tomó. Si ha pasado más tiempo, no repita la dosis y siga la pauta habitual.

- **Cumpla rigurosamente las** indicaciones de su médico. No deje de tomar Harvoni® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia de su hospital.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **rosuvastatina o pravastatina** (para tratar los niveles altos de colesterol), **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*, para tratar la depresión), **rifampicina** (antibiótico para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **algunos antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina u oxcarbazepina), simeprevir** (para tratar la hepatitis C). Informe a su médico si toma algún tratamiento para bajar el colesterol en sangre o para tratar el VIH.
- Consulte con su médico o farmacéutico si toma **amiodarona** (para tratar los trastornos del ritmo del corazón), digoxina o dabigatrán.
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que informe a su médico o farmacéutico de todo lo que toma y les consulte antes de empezar a tomar nuevos medicamentos o plantas medicinales.

EFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: fatiga y dolor de cabeza. Si además de Harvoni toma ribavirina informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
 - Fiebre, tos persistente, problemas al respirar o signos de infección.
- Comunique a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**

Servicio de Farmacia

Tlo:

