



9-Relaciones sexuales

9. RELACIONES SEXUALES


El cuestionario incluye una serie de preguntas para valorar los hábitos en cuanto a sexualidad de los adolescentes de Castilla y León: se preguntó acerca de si han tenido alguna vez relaciones sexuales completas (RSC), y en caso afirmativo a qué edad las tuvieron por primera vez, con cuántas personas mantuvieron RSC en los últimos 30 días, si utilizan algún método anticonceptivo, si la última vez que mantuvieron RSC emplearon preservativo y si han utilizado la píldora del día después en alguna ocasión y cuántas veces la han empleado. Estas dos últimas preguntas se refieren tanto al encuestado/a como a su pareja.

El 22,3% de los adolescentes refieren haber tenido alguna vez RSC, en mayor proporción los chicos (25,4%) que las chicas (19,3%) ($p=0,017$), sin diferencias estadísticamente significativas por ámbito (urbano 22,4%, rural 22,1%). La edad de la primera RSC entre los que sí las han tenido, abarca desde los 12 a los 17 años, siendo la media a los 14,6 años (mediana a los 15 años). No hay diferencias estadísticamente significativas por sexo ni entre jóvenes de ámbito urbano y rural.

En cuanto al número de parejas sexuales en los últimos 30 días de los jóvenes que sí mantuvieron RSC, la mayor parte de los adolescentes refiere haber tenido una pareja (51,5% de los chicos y 60% de las chicas) y un 9,7% de los chicos y el 5% de las chicas tuvieron dos o más parejas en ese periodo, mientras que en los

chicos es más frecuente no haber tenido ninguna pareja en los últimos 30 días (38,8%, frente al 35% en chicas). Estas diferencias no son estadísticamente significativas, y tampoco por ámbito geográfico (Gráfico 9.1).


Gráfico 9.1. Número de parejas sexuales en los últimos 30 días, por sexo y ámbito geográfico.



El 75,2% de los adolescentes encuestados refiere haber utilizado preservativo en su última RSC, con diferencias significativas por sexo (chicos 82,1%, chicas 65,3%, $p=0,003$), pero no por ámbito, aunque es mayor su utilización en medio urbano (75,1%, rural 73,9%). Sin embargo, sólo el 57,9% de aquéllos que

en algún momento han mantenido RSC dice utilizar algún método anticonceptivo; el método más utilizado es el preservativo (53,7% de los que han mantenido RSC), seguido de los anticonceptivos orales (9%) (Gráfico 9.2).

Gráfico 9.2. Métodos anticonceptivos empleados.



En cuanto al uso de la píldora del día después (PDD), el 23,7% de los adolescentes (los jóvenes encuestados o su pareja) que han mantenido RSC refieren haberla empleado alguna vez, sin diferencias por sexo o por ámbito. Entre los que han utilizado la PDD, el 39,3% la han utilizado dos o más veces, en proporción

similar chicas (40%) y chicos (38,8%) pero más los jóvenes de medio urbano (40,4%) que rural (25%), sin poder establecerse la significación estadística de estas diferencias debido al pequeño porcentaje de jóvenes que han empleado la PDD (n = 56) (Gráfico 9.3).

Gráfico 9.3. Número de veces que han empleado la PDD, por sexo y ámbito geográfico.

