



- Jeringas 135 mcg
- Jeringas 180 mcg

¿QUÉ ES?

Pegasys® es peginterferón alfa-2a (interferón pegilado), una proteína que modifica la respuesta del sistema inmune e inhibe la multiplicación del virus de la hepatitis B o C. Se utiliza para el tratamiento de la hepatitis B crónica y combinado con ribavirina para el de la hepatitis C crónica.

ANTES DE PONERSE ESTE MEDICAMENTO

- No usar si alergia al medicamento, o si ha tenido alguna vez un ataque al corazón.
- Informe a su médico si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, autoinmune o psiquiátrica, psoriasis, problemas de tiroides o si está o piensa quedarse embarazada.

¿CÓMO SE ADMINISTRA?

- Este medicamento es de administración subcutánea, en el tejido justo debajo de la piel.
- Las zonas de inyección más adecuadas son: abdomen (excepto cintura y ombligo) y parte superior de los muslos.
- **Técnica de administración:**
 1. Saque la jeringa de la nevera 30 minutos antes de su administración. No la agite.
 2. Lávese las manos antes de comenzar.
 3. Compruebe que el líquido sea claro y sin partículas visibles.
 4. Retire la tapa protectora que cubre el final de la aguja y la tapa de goma de la jeringa. Coloque la aguja en la punta de la jeringa y retire el protector de la aguja.
 5. Saque el aire de la jeringa manteniéndola vertical y presionando suavemente el émbolo.
 6. Desinfecte la piel en el lugar de inyección con un algodón empapado en alcohol.
 7. Forme un pliegue cutáneo con los dedos pulgar e índice, sin apretar.



8. Sujete la jeringa por la parte más próxima a la aguja e inserte la aguja en el pliegue cutáneo formando un ángulo de 45-90° con acción firme y rápida. Si viera sangre en la jeringa, saque la jeringa, aplique presión en el lugar de inyección durante unos minutos y pinche en otro punto.
9. Inyecte el líquido despacio manteniendo el pliegue cutáneo.

10. Al finalizar, retire la jeringa, suelte el pliegue y aplique presión ligeramente sobre el lugar de inyección con un algodón.

11. Deseche la jeringa, sin tapar la aguja, en un recipiente rígido.

- Si se olvida administrar una dosis y se percata:
 - 1 ó 2 días después, inyéctesela lo antes posible y siga el calendario previsto.
 - 3-5 días después, inyéctesela lo antes posible y continúe las próximas dosis cada 5 días hasta recuperar el ritmo semanal previsto.
 - 6 días después, espere a la próxima dosis.
- **Cumpla rigurosamente la dosificación** indicada por su médico.

INTERACCIONES

- Usar con precaución junto a **teofilina** (puede ser necesario un ajuste de dosis).
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Este medicamento puede producir: fiebre, escalofríos, dolor muscular o en articulaciones, dolor de cabeza, reacciones en el lugar de inyección, debilidad, cansancio, cambios de humor (irritabilidad, depresión), insomnio, mareos, dolor de estómago, náuseas, pérdida de apetito, diarrea, sequedad de boca o de piel, prurito, caída de pelo. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.
- **Contacte inmediatamente** con su médico si aparece **fiebre y tos persistentes, problemas al respirar, sarpullido generalizado, dolor de pecho, latidos irregulares del corazón, depresión o pensamientos suicidas, dolor de estómago grave, sangre en heces, sangrado nasal grave o problemas de la vista.**
- Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- Debe guardar este medicamento en la nevera (2-8°C), en su caja original. NO en el congelador. Si por un descuido deja la jeringa fuera de la nevera, tenga en cuenta que se conserva estable 7 días a temperatura ambiente (hasta 25°C).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**
Servicio de Farmacia
Tlo: