



- Cápsulas 150 mg

¿QUÉ ES?

Olysis® es simeprevir, un antivirico que inhibe la multiplicación del virus de la hepatitis C. Se utiliza combinado siempre con otros medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si alergia al simeprevir o alguno de sus excipientes.
- Informe a su médico si tiene otra enfermedad en el hígado además de la hepatitis C, infección por hepatitis B, si ha recibido telaprevir o boceprevir, o si es descendiente del este asiático.
- Cuando tome simeprevir, puede ser más sensible a la luz solar (fotosensibilidad). Durante el tratamiento, utilice protección adecuada (gorro, gafas de sol, filtro solar) y evite la exposición intensa o prolongada al sol (o aparatos de bronceado).
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En mujeres fértiles, utilizar un método anticonceptivo eficaz. Si se combina con ribavirina, ver información de ésta.

¿CÓMO SE TOMA?

- Tome 1 **cápsula (150 mg) cada día con comida** (se favorece la absorción del medicamento). Tómela a la misma hora todos los días. Trague la cápsula entera.
- Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda, si han pasado más de 12 horas, espere a la siguiente toma. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.
- **Cumpla rigurosamente la dosificación** indicada por su médico. No deje de tomar Olysis® salvo que su médico le indique que lo interrumpa. Si el médico le suspende Olysis®, no debe reanudar más adelante. Si se retiran los otros medicamentos utilizados en combinación, también deberá interrumpir el tratamiento con Olysis®.
- En el caso de medicación sobrante, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia.

INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **atazanavir, carbamazepina, cisaprida, claritromicina, cobicistat, darunavir, dexametasona (sistémica), efavirenz, eritromicina, etravirina, fenitoína, fenobarbital, fluconazol, fosamprenavir, indinavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir, nevirapina, oxcarbamazepina, posaconazol, rifabutina, rifampicina, rifapentina, ritonavir, saquinavir, telitromicina, terfenadina, tipranavir, voriconazol** o productos con *Hypericum perforatum* (Hierba de San Juan) o *Silybum marianum* (Cardo mariano).
- Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Este medicamento puede producir: náuseas, disnea (sensación de falta de aliento), erupción y picor en la piel, aumento de la bilirrubina en sangre, fotosensibilidad y estreñimiento. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
 - **Dificultad para respirar, sibilancias o pitos al respirar o urticaria generalizada** (signos posibles de una reacción alérgica).
 - **Enrojecimiento, hinchazón, ampollas u otros signos de quemaduras de sol en la piel o los ojos.**
- Comuníquelo a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser debido a este medicamento.

¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz.

Este documento contiene información seleccionada cuyo fin es mejorar el uso eficaz y seguro del medicamento. En ningún caso sustituye al prospecto. Lea éste detenidamente.

**PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**

Servicio de Farmacia

Tlo:

