

Sovaldi® es un medicamento que contiene sofosbuvir, un antivírico que impide que el virus de la hepatitis C se multiplique. **Se utiliza combinado siempre con otros medicamentos** para tratar la hepatitis C crónica.

## ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- No usar si es alérgico a sofosbuvir o alguno de los excipientes de Sovaldi.
- Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C o problemas en los riñones.
- Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH.
- No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de sofosbuvir toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón).

## ¿CÓMO SE TOMA?

- Tome 1 **comprimido (400 mg) al día con comida**. Tómelo a la misma hora todos los días. Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración del tratamiento es variable y dependerá del genotipo de virus, el grado de fibrosis de su hígado y de si ha recibido tratamientos previos.

## ¿QUÉ HACER SI...?

- Ha olvidado tomar una dosis:
  - Si han pasado menos de 18 horas tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
  - Si han pasado más de 18 horas espere a la siguiente toma y siga la pauta habitual. **NO TOME DOSIS DOBLE.**

**ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE.**

- Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente SOLO si han pasado menos de 2 horas desde que lo tomó. Si ha pasado más tiempo, no repita la dosis y siga la pauta habitual.

- **Cumpla rigurosamente las** indicaciones de su médico. No deje de tomar Sovaldi® salvo que su médico le indique que lo interrumpa.

## ¿DÓNDE GUARDARLO?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al servicio de Farmacia de su hospital.

## INTERACCIONES

- Evitar su uso junto a **rifampicina** (antibiótico para tratar la tuberculosis y otras infecciones), **hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*, para tratar la depresión), **algunos antiepilépticos** (**fenobarbital, fenitoína, carbamazepina u oxcarbazepina**).
- Consulte con su médico o farmacéutico si toma **amiodarona** (para tratar los trastornos del ritmo del corazón),
- Siempre debe consultar con su médico o su farmacéutico antes de tomar otros medicamentos o plantas medicinales mientras esté tomando Sovaldi.

## EFFECTOS ADVERSOS

- Pueden aparecer: fatiga, dolor de cabeza, náuseas e insomnio. Anemia, molestias digestivas, resfriados. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico. Informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o palpitaciones del corazón (posible anemia).
- **Contacte lo antes posible** con su médico si aparece:
  - Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel...)
  - Fiebre, tos persistente, problemas al respirar o signos de infección.
- Comuníquelo a su médico o farmacéutico **cualquier síntoma** que crea pueda ser debido a este medicamento.

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento dentro del envase o en [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es) (sección CIMA).

**PROGRAMA DE ATENCIÓN  
FARMACÉUTICA AL PACIENTE**

**Servicio de Farmacia**

**Tlo:**