

EPIDEMIOLOGICO

DE CASTILLA Y LEÓN

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN RESPIRATORIA

*Redacción: Milagros Gil Costa
Servicio de Epidemiología*

A este grupo pertenecen: **enfermedad meningocócica, gripe, legionelosis, meningitis tuberculosa, tuberculosis respiratoria y varicela.** En nuestra Comunidad Autónoma se incluyen además **infección respiratoria aguda y neumonía.**

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

En el año 2001 se han notificado 30 casos de enfermedad meningocócica (tasa de 1,21 por 100.000 habi-

tantes) observándose un marcado descenso con respecto al año anterior: 64 en 2000, y una tasa de 2,81 casos 100.000 habitantes.

A nivel nacional, el número de casos declarados en 2001 ha sido de 908, tasa de 2,3 por 100.000 habitantes. (**Gráfico 1**).

Por provincias Segovia presenta la tasa mas elevada con 2,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de Burgos y León. (**Gráfico 2**).

GRÁFICO 1
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001



GRÁFICO 2 ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

Tasa de incidencia por provincia 1999-2001





GRÁFICO 4 GRIPE

Tasas de incidencia por provincia 1999-2001



GRIPE

Se ha producido un importante descenso en los casos declarados de Gripe con respecto a años anteriores. La tasa autonómica ha descendido de 4.535 en 2000 a 1.612 en el año 2001.


A nivel nacional se ha producido una situación similar pasando de 4.989 casos por 100.000 habitantes en 2000 a 2.146 en el año 2001 (Gráfico 3).

En el caso de la gripe las tasas anuales de incidencia no reflejan la situación real de la enfermedad, ya que no recogen la temporada epidemiológica completa.

La tasa más alta la presentó León con 2.500 casos por 100.000 habitantes y la más baja Soria con 532 por 100.000 habitantes (Gráfico 4).

GRÁFICO 3 GRIPE

Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001



LEGIONELOSIS

La legionelosis se encuentra incluida como enfermedad de declaración obligatoria a nivel nacional desde 1997, observándose un incremento progresivo

de notificación en el número de casos 430 en 1999, 752 en el 2000 y 1.404 en 2001, lo que supone una tasa de 3,55 por 100.000 habitantes.

En Castilla y León se han declarado un total de 17 casos durante el año 2001, lo que supone una tasa de incidencia de 0,69 por 100.000 habitantes. Por provincias León es la que presenta la tasa más elevada 2,17 casos por 100.000 habitantes.

La media de edad de los casos fue de 60 años, siendo el más joven de 41 años y el de más edad de 89; respecto a la distribución por sexo 15 de los 17 casos se registraron en varones.

MENINGITIS TUBERCULOSA

Del mismo modo que la Legionelosis esta enfermedad pasó a ser de Declaración Obligatoria en el año 1997. En el territorio nacional el número de casos de meningitis tuberculosa notificados es prácticamente similar en los tres últimos años, con una tasa de 0,19 casos por 100.000 habitantes para el año 2001.

A lo largo del año 2001 en Castilla y León se han notificado 4 casos de meningitis tuberculosa, con una tasa estimada de 0,16 por 100.000 habitantes.

Se declararon 3 casos en León, y 1 caso en Burgos.


TUBERCULOSIS RESPIRATORIA

El número de casos declarados ha sufrido un ligero descenso (5%) respecto al notificado en el año anterior (7.441 casos en 2001, frente a 7.835 en 2000), lo que ha supuesto una tasa en el último año de 18,83 por 100.000 habitantes para el conjunto nacional. En Castilla y León este descenso ha sido del 11%: 462 casos notificados en el 2001, frente a los 518 notificados en 2000. (Gráfico 5).

La incidencia notificada por provincias refleja grandes variaciones oscilando las tasas crudas en

GRÁFICO 5 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA


Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001



un rango de 31,39 para Zamora y 5,52 como tasa mínima para Segovia. (Gráfico 6).

GRÁFICO 6 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA

Tasas de incidencia por provincia 1999-2001



VARICELA

Durante el año 2001 en Castilla y León se han declarado 10.693 casos de varicela. La tasa de incidencia ha sido de 432 por 100.000 habitantes. A nivel nacional se han notificado 196.631 casos con una tasa de incidencia de 498 casos por 100.000 habitantes ligeramente superior con respecto al año 2000. (Gráfico 7).

Por provincias, hay una amplitud en el rango de las tasas durante el año 2001, con una variación entre Burgos con la tasa de incidencia más alta: 845,56 casos por 100.000 habitantes y Zamora con la tasa menor: 239,62 por 100.000. (Gráfico 8).

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Durante el año 2001, la Infección Respiratoria Aguda fue el proceso más declarado, debido a la alta

GRÁFICO 7 VARICELA

Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001





GRÁFICO 8 VARICELA

Tasas de incidencia por provincia 1999-2001



prevalencia de las rubricas incluidas en la IRA y la poca especificidad de los cuadros clínicos que se declaran bajo sospecha. En Castilla y León se han notificado 1.089.268. No puede establecerse una comparación con la tasa Nacional, ya que en 1997 dejó de ser Enfermedad de Declaración Obligatoria. (Gráfico 9).

Por provincias la mayor incidencia se ha registrado en Ávila y Salamanca con 55.456 y 55.089 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Entre las tasas más bajas figura Valladolid con 27.319 casos por 100.000. (Gráfico 10).

NEUMONIA

Durante el año 2001 se han notificado 2.436 casos de neumonía, lo que supone una tasa de incidencia de 98 casos por 100.000 habitantes. Del mismo modo que ocurre con las Infecciones Respiratorias agudas, no se puede establecer una comparación con la tasa nacional. (Gráfico 11).

GRÁFICO 9
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
 Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001




GRÁFICO 11
NEUMONÍA

Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001





GRÁFICO 10
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
 Tasa de incidencia por provincia 1999-2001




Durante, el 2001 las provincias que componen la Comunidad han presentado importantes diferencias entre sus tasas. La mayor incidencia, al igual que en años anteriores se ha registrado en Palencia con una tasa de 174 casos por 100.000 habitantes,

mientras que la provincia con menor tasa ha sido Segovia con 24 casos por 100.000. (Gráfico 12).

Se cuenta con información individualizada del 94% de los casos (2278), siendo el 63% de los casos varones. La media de edad se sitúa en 56 años.

GRÁFICO 12
NEUMONÍA

Tasa de incidencia por provincia 1999-2001



Boletín editado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social - Dirección General de Salud Pública

Suscripciones: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a profesionales sanitarios. Solicitudes: Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Avda. de Burgos, 5. 47071 VALLADOLID.



**Junta de
 Castilla y León**

Avda. de Burgos 5 • 47071 VALLADOLID

Imprime: Gráficas Germinal, S.C.L

Depósito Legal: VA-152

ISSN 0214-3852