


FIGURA 3.2
COMPLICACIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS. COMPLICACIONES CRÓNICAS



INFORME

Red de Médicos Centinelas de Castilla y León



CONTENIDO

- 2** Declaraciones semanales.
- 2** Exantemas virales maculo-papulares.
- 3** Complicaciones en pacientes diabéticos.




Declaraciones semanales

En 24 semanas de registro se ha alcanzado un porcentaje de declaración del 93% para el total de Castilla y León. Por provincias Salamanca, Soria Valladolid y Zamora presenta un porcentaje superior, mientras que en Avila se ha declarado el 90% de las semanas. Figura 1.1. ■

«En 24 semanas de registro se ha alcanzado un porcentaje de declaración del 93% para el total de Castilla y León»

FIGURA 1.1
PORCENTAJE DE DECLARACIONES EFECTUADAS SOBRE EL TOTAL DE TEÓRICAS POR PROVINCIA




Exantemas virales maculo-papulares

En 24 semanas de registro se han acumulado 273 casos que cumplen los criterios de definición de exantema viral maculo-papular.

La distribución por sexo no muestra diferencias significativas 50% (137) varones, 48% (132) mujeres. En 4 casos la variable sexo no fue consignada.


La fiebre presente en el 42% de los casos es el síntoma más frecuente que acompaña al exantema, junto tos y coriza en el 32% de los casos. Figura 2.1.

FIGURA 2.1
EXANTEMAS VIRALES MACULO-PAPULARES. SINTOMATOLOGÍA



De los 273 casos registrados, en un 20% (55 casos) no se ha especificado diagnóstico de sospecha. En los 218 casos restantes, un 44% han sido diagnosticados de eritema infeccioso (quinta enfermedad) y un 26% de exantema súbito (roseola). En la Figura 2.2 se presenta la distribución del diagnóstico de sospecha por grupo de edad. ■

FIGURA 2.2
EXANTEMAS VIRALES MACULO-PAPULARES. SINTOMATOLOGÍA



Complicaciones en pacientes diabéticos

En 24 semanas se han acumulado 316 registros por algún tipo de complicación en pacientes diabéticos.

Del total de casos, el 42%, han presentado algún tipo de compli-

cación aguda, en su mayoría, hipoglucemia clínicamente manifiesta. En la Figura 3.1 se presenta la distribución de complicaciones agudas por grupos de edad.

Se han registrado complicaciones crónicas en el 62% de los

registros (197 casos), siendo las más frecuentes el diagnóstico de retinopatía diabética (66 casos) y el de arteriopatía periférica (55 casos). En la Figura 3.2. se presenta la distribución de complicaciones crónicas por sexo. ■

FIGURA 3.1
COMPLICACIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS. COMPLICACIONES AGUDAS

