



Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

INFORME

CONTENIDO

- 2** Declaraciones semanales.
- 2** Obesidad en menores de 15 años.
- 3** Lactancia materna exclusiva (entre los 6 y 12 meses).
- 4** Sedantes y antidepresivos.
- 4** Indicadores y criterios de calidad de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León en el programa 2006.
- 6** Informaciones.



Junta de
Castilla y León




Declaraciones semanales

El porcentaje de declaraciones efectuadas en 12 semanas por médicos y pediatras con relación al total de teóricas ha sido del 90%. Por provincias, Valladolid y Salamanca reflejan los índices más bajos de declaración, 77% y 85% respectivamente. Figura 1.1. ■

FIGURA 1.1

PORCENTAJE DE DECLARACIONES EFECTUADAS SOBRE EL TOTAL DE TEÓRICAS POR PROVINCIA



Obesidad en menores de 15 años

En 14 semanas de registro se han acumulado un total de 74 consultas por obesidad infantil. El 57% de los casos corresponde a varones y el 43% a mujeres. Por grupos de edad el mayor número de casos se concentra en el grupo de 10 a 14 años. Figura 2.1

En más de la mitad de los casos la obesidad se descubre en el programa del niño sano/reconocimiento/screening, y en el 20% en una consulta por otra patología. Figura 2.2. ■

FIGURA 2.1

OBESIDAD INFANTIL. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR EDAD Y SEXO





FIGURA 2.2
OBESIDAD INFANTIL. DESCUBRIMIENTO



Lactancia materna exclusiva (entre los 6 y 12 meses)


En 12 semanas de registro se han acumulado 304 registros de lactancia materna exclusiva, con edades comprendidas entre los 6 y 12 meses.

La distribución por sexo es similar, 51% niñas (156 casos) y 47% niños (143 casos). La variable sexo no fue consignada en 5 casos.

El tipo de lactancia elegida inmediatamente después del parto, en este primer análisis, es materna exclusiva en el 77,8% de los casos (235) y sólo en un 11,2% (34 casos) se inicia directamente lactancia artificial. Figura 3.1

El 66,5% ha recibido la guía para padres de promoción de la lactancia materna y el 47% de los padres han recibido infor-

FIGURA 3.1
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. TIPO DE LACTANCIA A LA SALIDA DE LA MATERNIDAD



mación por parte de grupos de apoyo a la lactancia. Durante la estancia en el hospital, el 62% recibió ayuda del personal sanitario para iniciar la lactancia

materna. Por otra parte el 51% de las madres reconoce haber recibido muestras gratuitas para la lactancia artificial durante ese periodo. ■

Sedantes y antidepresivos

En 12 semanas de registro, el número de personas que han demandado o a las que se les ha prescrito sedantes y antidepresivos es de 316.


Más de la mitad de los casos 66,7% son mujeres. Por grupos de edad el mayor número de casos se concentra entre los 40 a 49 años. Figura 4.1.

La iniciativa de la demanda la toma el médico de familia en el 49,2% (155 casos). Se prescribe el tratamiento en el 93,3% (294).

Los síndromes ansioso y depresivo son los motivos de consulta más frecuentes, 62,1% y 38,3% respectivamente. En tercer lugar se consulta por trastornos del sueño en el 23,4%. ■

FIGURA 4.1

SEDANTES Y ANTIDEPRESIVOS. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO



Indicadores y criterios de calidad de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León en el programa 2006

Representatividad

- La cobertura de tarjeta sanitaria individual en la Comunidad de Castilla y León al comienzo del programa de 2006 era del 95%.
- En las Figuras 5.1 y 5.2 se representan los porcentajes de distribución por

grupo de edad y sexo de la población con TIS de Castilla y León, y los de la población cubierta por la RCSCyL no apreciándose diferencias superiores al 5% en ningún grupo de edad. En el grupo de 13 a 14 años se observa una discordancia del 5% proba-

blemente ocasionado por un retraso en la actualización de la tarjeta sanitaria en el paso de la atención pediátrica a la de familia.

- La distribución de profesionales en Castilla y León es de 91% médicos y 9% pediatras. En la RCSCyL esta

distribución es 82% médicos y 18% pediatras.

- La dispersión de la población medida a través de de la distribución por ámbito urbano (>50.000 habitantes), semiurbano (10.000-50.000) y rural (<10.000) se representa en la Figura 5.3. En la población cubierta por la RCSCyL está ligeramente sobre representada la población rural.


Funcionamiento

Cobertura

- En el programa de 2006 la diferencia entre la población cubierta y la población vigilada ha sido del 29%. Este resultado no se ajusta a los criterios de calidad que establecen que la diferencia no debe ser superior al 20%. No se aprecian variaciones superiores al 5% en los porcentajes según la estructura por edad y sexo entre población cubierta y vigilada.
- La tasa de notificación anual (con casos o sin

FIGURA 5.1

REPRESENTATIVIDAD DE LA POBLACIÓN CUBIERTA <15 AÑOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO



casos) tanto individual como para el conjunto de la red se fija en un mínimo del 70% de notificación. En el año 2006, 24 participantes se encuentran por debajo de dicho porcentaje. El conjunto de la red arroja un resultado del 87% de participación.

- Cumplimiento de variables:
Se consideran criterios mínimos una cumplimenta-

ción del 100% en TIS, edad o fecha de nacimiento, sexo y las variables relacionadas directamente con la definición de caso. Para el resto de variables la cumplimentación mínima debe ser del 85%.

Obesidad en menores de 15 años

- Fecha de nacimiento: 100%
- TIS: 100%
- Sexo: 100%
- Peso en Kg.: 100%
- Talla en cm.: 100%

El resto de variables supera el 85% de cumplimentación.


Dermatitis atópica en menores de 15 años

- Fecha de nacimiento: 99,5%
- TIS: 99,7%
- Sexo: 98%
- Tipo de dermatitis.: 99,2%
- Criterios de definición: 100%

El resto de variables supera el 85% de cumplimentación.

FIGURA 5.2

REPRESENTATIVIDAD DE LA POBLACIÓN CUBIERTA >14 AÑOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO



Hipertensión arterial y estilos de vida


- Fecha de nacimiento: 100%
- TIS: 100%
- Sexo: 99,4%
- TAS: 98,4%
- TAD: 98,4%

Resto variables

- Motivo de consulta: 76,9%
- Motivo de la toma de presión arterial: 68,1%
- N° de horas de actividad física por semana: 68,1%.

FIGURA 5.3

DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁMBITO URBANO, SEMIURBANO, RURAL



INFORMACIONES

El pasado mes de mayo se ha iniciado el estudio de casos y controles de obesidad infantil con redes centinelas en el que participan principalmente los pediatras de las redes de la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Asturias y Castilla y León. Este trabajo, financiado parcialmente por el Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministe-

rio de Sanidad y Consumo y con una duración prevista del trabajo de campo de un año, tiene como objetivo principal determinar la asociación entre hábitos dietéticos, actividad física y obesidad en niños menores de 15 años en el territorio estudiado.

Por otra parte esta programado iniciar en el próximo mes de octubre el registro de los cui-

dados paliativos y de soporte en el domicilio, que se desarrollará durante tres meses. Este trabajo de investigación, que esta siendo coordinado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas y está siendo también financiado parcialmente en la coordinación inter autonómica por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

PROGRAMA GENERAL DE REGISTRO 2007 (Médicos Centinelas)

OBESIDAD INFANTIL

(Menores de 15 años)

Criterios de inclusión:

Índice de masa corporal mayor del percentil 95 (tablas de la Fundación Orbegozo).

Se estudiarán los **nuevos diagnósticos de obesidad** que acudan a la consulta por este proceso o por cualquier otro tipo de patología. Solo se registrará la primera visita en el año.

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

(Estudio entre los 6 y 12 meses de edad)

Criterios de inclusión:

Incluye a los niños con edad comprendida entre los 6 y 12 meses de edad que acudan a la consulta por cualquier motivo: revisión del niño sano, consulta médica, administrativa, etc...

Se realizará un registro por niño.

SEDANTES Y ANTIDEPRESIVOS

(15 y más años de edad)

Criterios de inclusión:

Nuevas prescripciones, a pacientes de 15 y más años de edad, de fármacos del grupo de los ansiolíticos (N05B), hipnóticos y sedantes (N05C) y los antidepresivos (N06A), con el objeto de aliviar un malestar psicológico, asociado o no a una enfermedad física. Se incluirán también aquellos pacientes que soliciten este tipo de fármacos aún cuando no sea objetiva la necesidad de los mismos e independientemente de la decisión final del médico de prescribirlos o no.

Se considera asimismo una nueva prescripción, y por lo tanto debe notificarse, cuando el paciente haya sido tratado con anterioridad con estos fármacos u otros similares en episodios distintos, es decir, cuando haya pasado un periodo mínimo de 6 meses en remisión (sin tratamiento).

Criterios de exclusión:

- Se excluyen los tranquilizantes mayores o neurolépticos (N05A) y los psicoestimulantes tipo Anfetamina (N06B).
- Sucesivas consultas de un mismo paciente que no cumple los criterios anteriores (Ej. Renovación de recetas, cambios de especialidad o de principio activo dentro del mismo episodio, etc.).

NIVELES DE CONTACTO

* Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social: Sr. Jefe de la Sección de Epidemiología.

* Dirección General de Salud Pública y Consumo: A. Tomás Vega Alonso. P.º de Zorrilla, 1. 47071 VALLADOLID. Telfs.: 983 413 753 y 983 412 302- Fax: 983 413 745 - E-mail: vegaloto@jcy.es

ETIQUETA

OBESIDAD INFANTIL (Menores de 15 años)

Primeras 4 letras de la TIS
Fecha de nacimiento (D,M,A)
Sexo (V/M)
Peso en Kg.
Talla en cm.
País de origen del niño
ANTECEDENTES FAMILIARES
País de origen del padre
País de origen de la madre
Padre obeso
Madre obesa
Nº hermanos (excluido el caso)
Nº hermanos obesos (excluido el caso)
ANTECEDENTES PERSONALES
Lactancia materna (nº meses)
Peso al nacimiento
Talla al nacimiento
Descubrimiento
1.- Casual
2.- Consulta por síntomas
3.- Consulta por otra patología
4.- Programa del niño sano/reconocimiento/screening
Motivo de consulta
Tipo de obesidad:
1.- Endógena
2.- Exógena
3.- En estudio
FACTORES DE RIESGO
Nº de horas de televisión o videojuegos al día
Nº de horas de actividad física por semana
PATOLOGÍA ASOCIADA
Hipertensión
Dislipemias
Intolerancia a la glucosa/diabetes
Problemas psicosociales
Problemas osteomusculares
Problemas respiratorios
Alteraciones hormonales
Otros (especificar)
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Ve la televisión mientras come
Acude al comedor escolar
Desayuna regularmente
Realiza las cinco comidas regularmente
Toma 2 o más piezas de fruta al día
Come verduras y hortalizas todos los días
¿Cuántos días a la semana toma chucherías, refrescos, zumos y aperitivos?

NO EXISTE DECLARACIÓN ESTA SEMANA A CAUSA DE:

- 1.- NO SE HAN REGISTRADO CASOS
- 2.- AUSENCIAS DE LA CONSULTA

OTRAS INCIDENCIAS

SEMANA N.º

QUE FINALIZA EL SÁBADO / /

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (Estudio entre los 6 y 12 meses de edad)

Primeras 4 letras de la TIS
Fecha de nacimiento (D,M,A)
Sexo (V/M)
DATOS DE LA MADRE
Fecha de nacimiento (D,M,A)
Nº hijos (incluido el caso)
Experiencia previa de lactancia materna
Estudios acabados:
1.- No completó estudios primarios
2.- Primarios (escuela primaria, ICB)
3.- Secundarios (bachiller, FP, etc)
4.- Universitarios
Trabaja fuera del hogar
Fumadora habitual
¿Ha acudido a un curso de educación maternal? (S/N)
¿Recibió clases de lactancia en dicho curso? (S/N)
DATOS DEL PARTO
Hospital de nacimiento (especificar)
Parto (solo una opción):
1.- Normal, 2.- Cesárea, 3.- Otros distócicos
Peso al nacimiento
DATOS DE LA LACTANCIA (Sí/No)
¿Ha recibido la guía para padres del programa de promoción de la lactancia materna? (S/N)
¿Ha recibido información sobre grupos de apoyo a la lactancia materna? (S/N)
¿Recibió ayuda del personal sanitario durante su estancia en el hospital en relación con la lactancia materna? (S/N)
¿Recibió alguna muestra regalo de lactancia artificial? (S/N)
Tipo de lactancia a la salida de la maternidad (solo una opción):
1.- Materna exclusiva, 2.- Mixta, 3.- Artificial
Fecha de abandono de lactancia materna exclusiva
Fecha de abandono lactancia materna
Motivos que le decidieron por lactancia materna exclusiva:
Lo considera lo mejor para el niño
Comodidad
Economía
Consejo sanitario
Decisión del no inicio o abandono de la lactancia materna exclusiva:
Materna
Médico o pediatra
Otros
Factores contribuyentes del no inicio o abandono de la lactancia materna exclusiva:
Comodidad
Estética
Enfermedad de la madre
Enfermedad del niño
Escasa ganancia ponderal
Hipogalactia
Trabajo
Otros

SEDANTES Y ANTIDEPRESIVOS (15 y más años de edad)

Primeras 4 letras de la TIS
Fecha de nacimiento (D,M,A)
Sexo (V/M)
Situación laboral
1.- Ocupado
2.- Desempleado
3.- Pensionista
4.- Estudiante
5.- Labores del hogar
6.- Otra
Situación de convivencia
1.- Vive acompañado
2.- Vive solo
3.- Institucionalizado
4.- Otra situación
Motivo de la consulta (varias respuestas posibles):
Síndrome ansioso
Síndrome depresivo
Síndrome somatomorfo: somatización, conversión, hipocondría
Trastornos de adaptación: duelo, inadaptación-violencia...
Trastornos del sueño
Síndromes demenciales
Esquizofrenia y otros psicosis
Abuso o dependencia de drogas o psicofármacos
Trastornos del control de los impulsos: juego patológico, explosiones de ira, etc.
Maltrato o sospecha de maltrato
Control de reacciones adversas de fármacos
Otros síndromes psiquiátricos
Otros no relacionados directamente con patología psiquiátrica
Indeterminado
Especificar diagnóstico (en su caso):
Asociación con enfermedad física
TRATAMIENTO
Iniciativa de la demanda
1.- Del paciente
2.- Del médico de familia
3.- De otro médico (neurólogo, psiquiatra, otro)
Prescripción (Sí/No)
Prescripciones anteriores
1.- Primera prescripción conocida
2.- Antecedentes de tratamiento con psicofármacos. Fecha:
Especialidad principal
Tratamiento de este episodio
Especialidad 1: Dosis/Día
Especialidad 2: Dosis/Día
Especialidad 3: Dosis/Día
Periodo previsto de duración del tratamiento (en semanas) ..
Derivación:
1.- Equipo de salud mental
2.- Especialista de área
3.- Unidad hospitalaria
4.- Otros centros especializados
5.- Otros
6.- Ninguna



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad

RED CENTINELA SANITARIA DE CASTILLA Y LEÓN

COHORTE DE DIABETES DE CASTILLA Y LEÓN (CODICYL)

CASOS INCIDENTES DE DIABETES MELLITUS

ETIQUETA

Semana N° Finaliza el sábado
CIP (11 primeros dígitos)
Fecha de nacimiento
Sexo (V/M) ☐

Criterios de inclusión: Nuevos diagnósticos de Diabetes Mellitus de cualquier tipo

DIAGNÓSTICO Fecha de diagnóstico Tipo de diabetes..... Tipo 1 <input type="checkbox"/> Tipo 2 <input type="checkbox"/> Descubrimiento de la diabetes (respuesta única) <input type="checkbox"/> 1. Casual 2. Consulta por síntomas 3. Consulta por complicación 4. Despistaje Presencia de síntomas clásicos de diabetes (ejem.: sed excesiva, poliuria, pérdida de peso).....sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Tests diagnósticos Glucemia basal en plasma: mg/dl Glucemia al azar en plasma: mg/dl Glucemia en plasma a las 2 h. de SOG: mg/dl		EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA TAS/TAD Per. abdominal en cm..... Peso en Kg Talla en cm ANALÍTICA COMPLEMENTARIA HbA1c % Colesterol total mg/dl HDL mg/dl..... LDL mg/dl..... Triglicéridos mg/dl.....																																																										
COMPLICACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>sí</th> <th>fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retinopatía diabética</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Nefropatía y/o microalbuminuria.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Cardiopatía isquémica.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Antecedentes de ACV</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Arteriopatía periférica.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Síntomas de polineuritis</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Pie diabético, amputaciones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Infecciones de repetición.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			sí	fecha	Retinopatía diabética	<input type="checkbox"/>	Nefropatía y/o microalbuminuria.....	<input type="checkbox"/>	Cardiopatía isquémica.....	<input type="checkbox"/>	Antecedentes de ACV	<input type="checkbox"/>	Arteriopatía periférica.....	<input type="checkbox"/>	Síntomas de polineuritis	<input type="checkbox"/>	Pie diabético, amputaciones	<input type="checkbox"/>	Infecciones de repetición.....	<input type="checkbox"/>	OTRA INFORMACIÓN <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>sí</th> <th>no</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hª familiar de diabetes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Alcohol.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Embarazo.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obesidad</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sedentarismo.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tratamiento con hipolipemiantes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tratamiento con antihipertensivos.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Infecciones de repetición</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tabaquismo:</td> <td>sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> exfumador <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			sí	no	Hª familiar de diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alcohol.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Embarazo.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obesidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sedentarismo.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tratamiento con hipolipemiantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tratamiento con antihipertensivos.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infecciones de repetición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tabaquismo:	sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> exfumador <input type="checkbox"/>	
	sí	fecha																																																										
Retinopatía diabética	<input type="checkbox"/>																																																										
Nefropatía y/o microalbuminuria.....	<input type="checkbox"/>																																																										
Cardiopatía isquémica.....	<input type="checkbox"/>																																																										
Antecedentes de ACV	<input type="checkbox"/>																																																										
Arteriopatía periférica.....	<input type="checkbox"/>																																																										
Síntomas de polineuritis	<input type="checkbox"/>																																																										
Pie diabético, amputaciones	<input type="checkbox"/>																																																										
Infecciones de repetición.....	<input type="checkbox"/>																																																										
	sí	no																																																										
Hª familiar de diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Alcohol.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Embarazo.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Obesidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Sedentarismo.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Tratamiento con hipolipemiantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Tratamiento con antihipertensivos.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Infecciones de repetición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																										
Tabaquismo:	sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> exfumador <input type="checkbox"/>																																																											
Tipo de tratamiento instaurado en el momento del test diagnóstico (respuesta única)..... <input type="checkbox"/> 1. Dieta exclusivamente 2. Antidiabéticos orales 3. Antidiabéticos orales e insulina 4. Insulina exclusivamente		Interconsulta en el momento del diagnóstico: (especificar especialidad) OBSERVACIONES																																																										

EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA RED
EJEMPLAR PARA EL MÉDICO



**Junta de
Castilla y León**

Edita: **Centro Coordinador de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León**
 Consejería de Sanidad ■ DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO, Paseo de Zorrilla, 1 - 47071 VALLADOLID
 TELÉFONOS 983 413 753/983 412 302 - FAX 983 413 745 - E-mail: vegaloto@jcy.l.es

Servidor Web: <http://www.sanidad.jcy.l.es/centinelas>

Depósito Legal: VA-577/94 ■ ISSN: 1134-9336 ■ Realiza e imprime: Gráficas Germinal S.C.L.