

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
Gerencia AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Código Diag. Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01	
GAP ÁVILA	4.424	66,69 %	6634	J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae						8	75,00 %
GAP BURGOS	9.307	67,67 %	13754	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada						31.823	64,17 %
GAP LEÓN	9.197	67,52 %	13622	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada						546	54,58 %
GAP EL BIERZO	3.410	61,79 %	5519	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada						36.763	70,46 %
GAP PALENCIA	4.610	63,80 %	7226	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica						27.862	57,55 %
GAP SALAMANCA	7.574	67,41 %	11236	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS						97.002	65,98 %	
GAP SEGOVIA	3.471	71,77 %	4836	% DE PACIENTES CON J01 por Grupo de Edad			14 a 64	65 a 74	= o+75			
GAP SORIA	2.916	67,47 %	4322	GAP ÁVILA	61,99 %	67,76 %	71,98 %					
GAP VALLADOLID OESTE	4.829	61,00 %	7917	GAP BURGOS	63,74 %	67,12 %	74,01 %					
GAP VALLADOLID ESTE	6.265	63,14 %	9922	GAP LEÓN	66,87 %	66,68 %	68,34 %					
GAP ZAMORA	4.999	66,57 %	7509	GAP EL BIERZO	59,10 %	62,07 %	65,05 %					
TOTAL GRS	61.002	65,98 %	92.497	GAP PALENCIA	60,49 %	63,46 %	68,33 %					
				GAP SALAMANCA	64,33 %	66,44 %	71,04 %					
				GAP SEGOVIA	66,47 %	71,20 %	78,71 %					
				GAP SORIA	63,46 %	67,27 %	72,96 %					
				GAP VALLADOLID OESTE	56,95 %	63,90 %	65,86 %					
				GAP VALLADOLID ESTE	58,51 %	64,22 %	69,10 %					
				GAP ZAMORA	61,77 %	68,72 %	70,50 %					
				TOTAL GRS	62,44 %	66,13 %	70,48 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico

% pacientes con J01 del total de los diagnósticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA	0,04 %	27,20 %	0,04 %	0,02 %	15,76 %	0,12 %	5,25 %	4,66 %	0,18 %	27,20 %	0,02 %		19,39 %	0,06 %	0,06 %
GAP BURGOS	0,03 %	21,08 %	0,27 %	0,01 %	22,78 %	0,03 %	3,06 %	11,60 %	0,14 %	28,67 %	0,01 %		12,26 %		0,06 %
GAP LEÓN	0,02 %	19,76 %	0,17 %	0,01 %	16,29 %	0,01 %	6,16 %	3,72 %	0,27 %	29,13 %	0,08 %		24,35 %	0,01 %	0,01 %
GAP EL BIERZO		15,17 %	0,03 %		25,66 %	0,08 %	5,72 %	1,59 %	0,26 %	22,47 %	0,08 %		28,90 %		0,05 %
GAP PALENCIA	0,08 %	21,58 %	0,19 %		19,86 %	0,08 %	4,73 %	6,90 %	0,25 %	25,76 %	0,09 %		20,45 %		0,04 %
GAP SALAMANCA		18,92 %	0,06 %	0,01 %	17,83 %	0,01 %	7,95 %	5,99 %	0,27 %	31,47 %	0,03 %		17,36 %	0,03 %	0,06 %
GAP SEGOVIA		24,12 %	0,08 %		22,66 %	0,03 %	4,96 %	3,17 %	1,23 %	27,68 %	0,13 %		15,92 %		0,03 %
GAP SORIA		29,48 %	0,12 %		17,84 %	0,15 %	9,15 %	3,27 %	0,24 %	24,29 %	0,03 %	0,03 %	15,35 %		0,06 %
GAP VALLADOLID OEST		25,54 %	0,24 %	0,04 %	18,65 %	0,04 %	2,76 %	4,08 %	0,15 %	28,59 %	0,05 %	0,02 %	19,77 %	0,04 %	0,04 %
GAP VALLADOLID ESTE	0,01 %	27,37 %	0,07 %		20,02 %	0,01 %	4,80 %	4,71 %	0,20 %	22,08 %	0,07 %	0,01 %	20,60 %		0,03 %
GAP ZAMORA	0,05 %	19,24 %	0,07 %	0,03 %	18,93 %	0,12 %	6,40 %	4,80 %	0,10 %	28,10 %	0,03 %	0,02 %	22,06 %		0,03 %
TOTAL GRS	0,02 %	22,19 %	0,14 %	0,01 %	19,45 %	0,05 %	5,40 %	5,57 %	0,26 %	27,42 %	0,05 %	0,01 %	19,37 %	0,01 %	0,04 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AGREDA	306	83,15 %	368
AGUILAR DE CAMPOO	454	67,66 %	671
ALAEJOS	137	66,50 %	206
ALBA DE TORMES	322	74,19 %	434
ALDEADAVILA DE LA RIBER	145	75,92 %	191
ALISTE	220	67,69 %	325
ALMAZAN	228	65,71 %	347
ALTA SANABRIA	19	65,52 %	29
ANTONIO GUTIERREZ	817	63,48 %	1287
ARANDA NORTE	369	62,44 %	591
ARANDA RURAL	265	70,29 %	377
ARANDA SUR	349	68,30 %	511
ARCOS DE JALON	85	74,56 %	114
ARENAS DE SAN PEDRO	330	70,66 %	467
AREVALO	551	71,10 %	775
ARMUNIA	409	67,05 %	610
ARTURO EYRIES	250	59,81 %	418
ASTORGA I	411	60,89 %	675
ASTORGA II	206	73,31 %	281
AVILA ESTACION	322	69,40 %	464
AVILA NORTE	221	60,05 %	368
AVILA RURAL	217	64,97 %	334
AVILA SUR ESTE	244	62,00 %	550

Avila Sur Oeste J01 del
Total de los diagnosticados
de Bronquitis

	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
AGREDA		25,42 %			21,51 %	0,84 %	8,38 %	3,35 %		36,59 %	
AGUILAR DE CAMPOO	0,19 %	17,11 %			21,43 %		1,32 %	5,08 %	0,19 %	41,17 %	
ALAEJOS		16,88 %			8,75 %		16,88 %	9,38 %		26,25 %	
ALBA DE TORMES		31,45 %			13,71 %		11,02 %	1,08 %		20,43 %	0,27 %
ALDEADAVILA DE LA RIBER		7,43 %			21,71 %		4,00 %	1,14 %		30,29 %	
ALISTE		18,56 %			11,74 %		7,58 %	7,95 %		28,79 %	0,38 %
ALMAZAN		30,38 %			28,46 %		10,00 %	1,92 %		13,46 %	
ALTA SANABRIA		9,52 %			14,29 %					23,81 %	
ANTONIO GUTIERREZ		24,66 %	0,68 %		16,40 %		6,56 %	1,58 %	0,23 %	28,96 %	
ARANDA NORTE	0,24 %	15,61 %	0,49 %		20,73 %		2,44 %	12,20 %	0,49 %	35,85 %	
ARANDA RURAL		10,26 %			20,86 %		2,98 %	12,58 %	0,66 %	38,41 %	
ARANDA SUR		7,94 %		0,25 %	23,08 %		4,96 %	11,17 %	0,50 %	39,95 %	
ARCOS DE JALON		19,00 %			10,00 %		14,00 %	3,00 %		31,00 %	1,00 %
ARENAS DE SAN PEDRO		10,97 %			8,88 %	0,52 %	3,39 %	5,74 %		47,00 %	
AREVALO		29,79 %			18,86 %		8,23 %	3,29 %		22,01 %	
ARMUNIA	0,22 %	14,10 %			13,66 %		4,63 %	7,27 %	0,44 %	35,24 %	
ARTURO EYRIES		21,38 %			23,19 %		3,62 %	4,71 %		27,17 %	
ASTORGA I		11,53 %			7,98 %		2,88 %	3,77 %	0,44 %	37,69 %	
ASTORGA II		9,96 %			9,13 %		2,07 %	8,30 %		35,27 %	
AVILA ESTACION		43,15 %			13,99 %		2,04 %	6,41 %		18,08 %	
AVILA NORTE		34,30 %			19,42 %	0,41 %	7,02 %	2,48 %		21,90 %	
AVILA RURAL		35,68 %			24,90 %		2,49 %	3,73 %		17,01 %	0,41 %
AVILA SUR ESTE		25,07 %			15,83 %		9,50 %	6,33 %	0,26 %	25,33 %	
AVILA SUR OESTE		44,16 %		0,36 %	20,80 %	0,36 %	3,65 %	3,28 %	0,36 %	14,23 %	

J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
0,28 %	3,63 %		
	13,53 %		
	21,88 %		
	21,77 %	0,27 %	
	35,43 %		
	25,00 %		
	15,38 %	0,38 %	
	52,38 %		
	20,93 %		
	11,95 %		
	14,24 %		
	12,16 %		
	22,00 %		
	23,50 %		
	17,66 %	0,15 %	
	24,45 %		
	19,93 %		
	35,70 %		
	35,27 %		
	16,03 %	0,29 %	
	14,46 %		
	15,35 %		0,41 %
	17,68 %		
	12,41 %	0,36 %	

BABIA		20,00 %		34,55 %		10,91 %	3,64 %		18,18 %	
BALTANAS		27,22 %		6,96 %		19,62 %	19,62 %		11,39 %	
BAÑEZA I		19,32 %		19,51 %	0,19 %	4,13 %	1,13 %		27,58 %	
BAÑEZA II		15,71 %		18,26 %		7,01 %	4,03 %	0,42 %	25,69 %	
BARCO DE AVILA		20,16 %		23,26 %		7,75 %	2,33 %		34,88 %	
BARRIO ESPAÑA		42,61 %		14,35 %		2,17 %	3,04 %		17,39 %	
BEJAR		21,79 %		16,03 %		3,63 %	9,19 %	0,21 %	32,05 %	
BELORADO		34,33 %		17,91 %		11,94 %	6,97 %	0,50 %	21,39 %	
BEMBIBRE		13,73 %		28,76 %		0,74 %	4,82 %	0,19 %	26,53 %	0,37 %
BENAVENTE NORTE	0,47 %	13,65 %		18,35 %	0,24 %	4,71 %	7,06 %		37,18 %	
BENAVENTE SUR		12,82 %	0,34 %	17,71 %	0,17 %	3,54 %	3,71 %		37,10 %	
BERLANGA DE DUERO		22,41 %		12,07 %		1,72 %			34,48 %	
BOÑAR		28,74 %		28,74 %		6,90 %	4,60 %		22,99 %	
BRIVIESCA		18,03 %		24,32 %		1,37 %	12,84 %	0,82 %	28,14 %	
BURGO DE OSMA		25,00 %		14,86 %		16,89 %	2,70 %		31,76 %	
BURGOHONDO		12,42 %		16,77 %		1,24 %	3,73 %	0,62 %	39,75 %	
BURGOS RURAL NORTE		7,51 %		15,96 %		1,41 %	14,08 %		32,86 %	
BURGOS RURAL SUR		9,54 %		15,79 %		1,32 %	18,42 %		32,57 %	
CACABELOS		11,87 %		23,48 %		3,54 %	1,01 %	1,77 %	20,71 %	
CALZADA DE VALDUNCIEL		6,30 %		29,13 %		4,72 %	8,66 %		42,52 %	
CAMARZANA DE TERA		26,28 %		24,09 %		1,46 %	4,38 %		22,63 %	
CAMPOS LAMPREANA		18,80 %		20,30 %		7,52 %	1,50 %		31,58 %	
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT		27,93 %		15,32 %		5,41 %	13,51 %	0,90 %	27,93 %	
CANDELEDA	0,29 %	31,10 %		11,63 %	0,29 %	1,45 %	13,95 %		22,67 %	
CANTALAPIEDRA		7,98 %		5,52 %		8,59 %	1,84 %	0,61 %	33,74 %	
CANTALEJO		21,02 %		26,10 %		1,36 %	2,71 %	3,73 %	31,19 %	
CANTERAC		30,27 %		21,62 %		4,86 %	10,81 %	0,54 %	20,00 %	
CAPUCHINOS		30,74 %	0,41 %	13,11 %		9,43 %	9,02 %		28,69 %	
CARBAJALES DE ALBA		10,26 %		17,95 %		2,56 %	2,56 %		25,64 %	
CARBALLEDA		15,18 %		14,14 %	1,05 %	12,04 %	5,76 %		13,61 %	
CARBONERO		20,95 %		23,34 %		19,10 %	1,59 %		21,49 %	
CARRION DE LOS CONDES		36,58 %	1,56 %	25,29 %		4,67 %	4,67 %	0,39 %	18,29 %	
CASA DEL BARCO		36,02 %		23,29 %		2,17 %	3,11 %		23,60 %	
CEBREROS		11,16 %		13,95 %		5,58 %	2,33 %		44,65 %	
CENTRO-GAMAZO		19,31 %	0,34 %	16,21 %		5,86 %	8,28 %	0,34 %	25,86 %	
CERVERA DE PISUERGA		38,35 %	0,75 %	21,05 %	0,75 %	2,26 %	0,75 %	0,75 %	21,05 %	
CIGALES		29,91 %		28,21 %		4,27 %	3,42 %	0,85 %	17,09 %	
CIRCULAR		16,80 %		19,78 %		8,13 %	2,98 %		29,27 %	
CIRCUNVALACION		48,54 %		14,96 %			2,92 %		22,63 %	
CISTIERRA		18,25 %		27,01 %		5,84 %	1,46 %		27,74 %	
CIUDAD RODRIGO		29,74 %		23,37 %		1,37 %	4,86 %	0,15 %	30,35 %	
CONDADO DE TREVIÑO		21,28 %	2,13 %	42,55 %					25,53 %	
CONDESA		18,13 %		21,98 %		10,44 %	2,47 %	0,82 %	22,80 %	0,27 %
CORRALES		33,97 %		13,46 %		8,33 %	2,56 %		23,72 %	0,64 %
CRISTOBAL ACOSTA		16,92 %	0,43 %	21,41 %		2,78 %	8,35 %		43,25 %	0,21 %
CRUCERO		26,96 %		14,73 %		5,02 %	1,57 %	0,31 %	27,59 %	
CUELLAR		12,06 %		35,68 %		2,01 %	3,52 %		32,91 %	
CUENCA DEL BERNESGA		21,49 %		14,03 %		5,88 %	3,62 %	0,23 %	34,62 %	0,23 %
DELICIAS I		24,65 %	0,47 %	14,60 %		1,57 %	3,77 %	0,16 %	34,85 %	
DELICIAS II		14,76 %	0,30 %	11,14 %	0,30 %	3,31 %	10,84 %		40,66 %	
DESCONOCIDO				60,00 %					20,00 %	
EL EJIDO		24,91 %	0,36 %	12,91 %		8,55 %	4,73 %	0,36 %	28,73 %	
EL ESPINAR		19,18 %		14,16 %		6,39 %	5,48 %	0,46 %	33,79 %	
ERAS DEL BOSQUE		12,48 %		20,79 %		1,70 %	9,26 %	0,38 %	32,51 %	0,19 %
ESGUEVILLAS		19,57 %		26,09 %		15,22 %	4,35 %		15,22 %	

	12,73 %		
	15,19 %		
	28,14 %		
	28,87 %		
	11,63 %		
	20,43 %		
	17,09 %		
	6,97 %		
	24,86 %		
	18,35 %		
0,17 %	24,28 %		0,17 %
	29,31 %		
	8,05 %		
	14,48 %		
	8,78 %		
	25,47 %		
	28,17 %		
	22,04 %		0,33 %
	37,63 %		
	8,66 %		
	21,17 %		
	20,30 %		
	9,01 %		
	18,60 %		
	41,72 %		
	13,90 %		
	11,89 %		
	8,61 %		
	41,03 %		
	38,22 %		
	13,53 %		
	8,56 %		
	11,80 %		
	22,33 %		
	23,79 %		
	14,29 %		
	16,24 %		
	23,04 %		
	10,95 %		
	19,71 %		
	10,17 %		
	8,51 %		
	23,08 %		
	17,31 %		
	6,64 %		
	23,82 %		
	13,82 %		
	19,91 %		
	19,78 %	0,16 %	
	18,67 %		
	20,00 %		
	19,45 %		
	20,55 %		
	22,68 %		
	19,57 %		

ESPINOSA DE LOS MONTEF		13,67 %			22,30 %		1,44 %	2,16 %		41,01 %	
FABERO		24,71 %			19,39 %		9,13 %	0,38 %		23,95 %	
FONTIVEROS	0,68 %	21,62 %			18,92 %		20,27 %	4,73 %		8,78 %	
FROMISTA		11,97 %	0,85 %		38,46 %		1,71 %	5,98 %	1,71 %	17,95 %	
FUENTEGUINALDO		3,13 %			25,00 %		12,50 %	3,13 %		46,88 %	
FUENTESAUCO		47,73 %			11,36 %					31,82 %	
FUENTES DE OÑORO		25,58 %			18,60 %		8,14 %			24,42 %	
GAMONAL-ANTIGUA	0,16 %	27,88 %	0,32 %		31,44 %		0,32 %	8,91 %		21,72 %	
GARCIA LORCA		27,48 %	0,19 %		21,12 %		0,93 %	18,13 %		20,37 %	
GARRIDO NORTE		19,69 %			15,66 %		15,44 %	4,47 %		35,57 %	
GARRIDO SUR		15,43 %	0,18 %	0,18 %	13,65 %		12,77 %	7,45 %	0,18 %	32,62 %	
GOMARA		31,82 %			18,18 %		15,91 %			22,73 %	
GREDOS		61,22 %			4,08 %					18,37 %	
GUARDO	0,22 %	18,12 %			19,00 %		3,06 %	2,40 %	0,22 %	25,76 %	
GUAREÑA		18,67 %			34,94 %		0,60 %	4,22 %		21,69 %	
GUIJUELO		12,25 %			19,09 %		17,66 %	7,41 %	0,28 %	21,94 %	
HERRERA DE PISUERGA		15,04 %			16,37 %		11,95 %	2,21 %		24,78 %	
HUERTA DEL REY		31,99 %	0,37 %		19,01 %	0,18 %	4,20 %	1,83 %	0,37 %	24,86 %	0,18 %
HUERTA DE REY		35,94 %			14,06 %			7,81 %		25,00 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ	0,21 %	30,56 %	0,21 %		16,88 %		0,43 %	17,52 %		23,08 %	
ISCAR		10,35 %			31,61 %		5,45 %	7,08 %		17,98 %	0,27 %
JARDINILLOS		29,95 %	0,26 %		22,92 %		4,17 %	6,51 %	0,26 %	19,53 %	
JOSE AGUADO		15,25 %	0,12 %		15,01 %		11,69 %	2,58 %		31,98 %	0,12 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		25,24 %	0,78 %		17,81 %		1,76 %	13,31 %	0,20 %	28,18 %	
LA ALAMEDILLA		20,98 %	0,45 %		13,84 %		13,84 %	8,93 %	0,45 %	23,66 %	
LA ALBERCA		38,74 %			8,11 %		9,01 %	0,90 %	1,80 %	14,41 %	
LA CABRERA		6,06 %			16,67 %					39,39 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN		17,90 %			20,99 %		9,26 %	3,70 %		29,01 %	
LAGUNA DE DUERO		23,65 %	0,17 %	0,17 %	19,93 %		2,36 %	5,24 %		27,70 %	
LA MAGDALENA		39,60 %			15,44 %		10,07 %	0,67 %		20,13 %	
LANZAHITA		26,61 %			9,17 %		14,68 %	7,34 %	0,92 %	24,77 %	
LA PALOMERA	0,14 %	30,42 %			12,39 %		7,32 %	2,96 %	0,28 %	26,48 %	0,28 %
LA PUEBLA		19,71 %	0,18 %		17,13 %	0,18 %	11,05 %	9,39 %	0,18 %	23,76 %	0,18 %
LAS HUELGAS		17,51 %	0,34 %		28,62 %		3,70 %	11,78 %		26,60 %	
LA SIERRA		20,59 %			22,06 %			1,47 %	1,47 %	44,12 %	
LAS NAVAS DEL MARQUES		29,70 %			9,74 %	0,23 %	0,46 %	2,55 %	0,23 %	38,28 %	
LAS TORRES		23,71 %	0,34 %		29,90 %		0,69 %	7,22 %		27,49 %	
LA VICTORIA		20,68 %			28,53 %		6,02 %	2,36 %		22,25 %	
LEDESMA		14,58 %			11,11 %		9,72 %	2,08 %		36,81 %	
LERMA		30,99 %	0,28 %		15,77 %		1,13 %	10,42 %	0,28 %	26,48 %	
LINARES DE RIOFRIO		22,40 %			7,20 %		12,80 %	12,80 %		20,00 %	
LOS COMUNEROS		15,79 %	0,84 %		17,68 %		0,42 %	20,21 %	0,21 %	33,47 %	
LOS CUBOS		23,61 %			20,28 %		1,67 %	11,11 %		30,56 %	
LUMBRALES		13,22 %			19,01 %		4,13 %	2,48 %		40,50 %	
MADRIGAL ALTAS TORRES		23,44 %			34,38 %		1,56 %	7,81 %		9,38 %	
MAGDALENA		25,77 %			11,86 %		1,55 %	5,67 %		42,78 %	
MANSILLA DE LAS MULAS		23,65 %			25,62 %		3,94 %	2,96 %		21,67 %	
MATALLANA DE TORIO		29,41 %			14,71 %		5,88 %		2,94 %	41,18 %	
MATILLA DE LOS CAÑOS		6,98 %			27,91 %		2,33 %			39,53 %	
MAYORGAS DE CAMPOS		14,69 %			37,76 %		5,59 %	2,10 %		6,99 %	0,70 %
MEDINA DEL CAMPO RURAL		27,09 %	0,51 %		21,01 %		6,84 %	3,54 %	0,25 %	16,20 %	0,25 %
MEDINA DEL CAMPO URBANO		33,92 %			14,20 %		6,10 %	2,58 %	0,35 %	12,91 %	0,12 %
MEDINA DE POMAR		31,91 %			33,33 %		2,13 %	2,84 %		9,22 %	
MEDINA DE RIOSECO		31,63 %			19,53 %		2,79 %	6,98 %	0,47 %	17,21 %	
MELGAR DE FERNAMENTAL		14,21 %			33,33 %		8,74 %	13,66 %		17,49 %	

19,42 %		
22,43 %		
25,00 %		
21,37 %		
9,38 %		
9,09 %		
23,26 %		
9,24 %		
11,78 %		
8,95 %	0,22 %	
17,20 %	0,18 %	0,18 %
11,36 %		
16,33 %		
31,22 %		
19,88 %		
21,37 %		
29,65 %		
17,00 %		
17,19 %		
10,90 %		0,21 %
27,25 %		
16,41 %		
23,25 %		
12,52 %		0,20 %
17,86 %		
27,03 %		
37,88 %		
19,14 %		
20,61 %		0,17 %
14,09 %		
16,51 %		
19,72 %		
18,05 %		0,18 %
11,45 %		
10,29 %		
18,33 %	0,23 %	0,23 %
10,65 %		
20,16 %		
25,69 %		
14,65 %		
24,80 %		
10,95 %		0,42 %
12,78 %		
20,66 %		
23,44 %		
12,37 %		
22,17 %		
5,88 %		
23,26 %		
32,17 %		
24,30 %		
29,81 %		
20,57 %		
21,40 %		
12,57 %		

MIGUEL ARMijo		18,33 %	0,83 %		23,33 %		5,83 %	6,67 %		35,00 %	
MIRANDA DEL CASTAÑAR		6,02 %			19,28 %		7,23 %	13,25 %		42,17 %	
MIRANDA ESTE		25,72 %	0,18 %		29,14 %	0,18 %	6,29 %	4,14 %		30,40 %	
MIRANDA OESTE		26,36 %			22,38 %	0,26 %	8,48 %	9,93 %		26,49 %	
MOMBELTRAN		22,52 %			6,62 %		7,28 %	6,62 %		31,13 %	
MOTA DEL MARQUES		27,08 %			39,58 %		6,25 %			20,83 %	
MUÑANA		27,17 %			19,57 %		1,09 %			27,17 %	
MUñICO		5,26 %	5,26 %		7,89 %		7,89 %			26,32 %	
NAVA DE LA ASUNCION		20,00 %	1,02 %		17,97 %		3,05 %	3,05 %		32,88 %	
OLMEDO		52,41 %			11,03 %		2,07 %	4,14 %		15,17 %	
OLVEGA		33,49 %			24,53 %			1,89 %	0,94 %	29,72 %	
OSORNO		34,92 %			28,57 %		1,59 %	3,97 %		19,05 %	0,79 %
PALENCIA RURAL	0,41 %	18,26 %			12,86 %		0,83 %	15,77 %		32,37 %	
PAMPLIEGA		24,73 %			25,81 %		5,38 %	6,45 %		24,73 %	
PARADA DE MOLINO		14,58 %			17,65 %		3,84 %	13,55 %		35,29 %	
PAREDES DE NAVA		19,79 %			19,79 %		2,08 %	9,38 %		21,88 %	
PARQUESOL		17,50 %			14,00 %		1,17 %	4,00 %	0,17 %	43,17 %	0,17 %
PEDROSILLO EL RALO		10,75 %			24,73 %		3,23 %	3,23 %		39,78 %	
PEÑAFIEL		24,43 %			19,08 %		2,29 %	1,53 %		29,26 %	
PEÑARANDA DE BRACAMO		22,22 %			13,89 %		10,47 %	3,63 %	1,28 %	27,78 %	
PERIURBANA NORTE		10,33 %			18,24 %	0,22 %	8,57 %	3,74 %	0,22 %	37,58 %	0,22 %
PERIURBANA SUR		23,94 %			21,69 %		6,20 %	0,85 %	0,28 %	38,87 %	0,28 %
PIEDRAHITA		20,00 %			31,43 %		4,76 %	1,90 %		18,10 %	
PILARICA		32,31 %	0,31 %		21,54 %		2,77 %	4,31 %		24,00 %	
PINALES-COVALEDA		33,68 %			7,37 %		11,58 %	5,79 %		31,58 %	
PINTOR OLIVA	0,22 %	14,29 %	0,45 %		21,88 %	0,22 %	4,69 %	8,93 %		23,44 %	0,45 %
PISUERGA		27,69 %			30,29 %		1,95 %	4,89 %		18,24 %	
PIZARRALES		7,98 %			31,92 %		6,10 %	10,80 %		30,99 %	
PLAZA DEL EJERCITO		33,75 %	0,21 %		14,70 %		3,31 %	2,90 %		30,64 %	
PONFERRADA I		12,56 %			26,32 %	0,30 %	11,35 %	1,82 %	0,15 %	22,84 %	
PONFERRADA II		14,39 %			23,82 %	0,24 %	5,66 %	1,18 %		27,12 %	
PONFERRADA III		20,26 %			27,67 %		6,10 %	1,09 %		18,30 %	
PONFERRADA IV		7,84 %			28,38 %		4,32 %	1,08 %		28,38 %	
PORTILLO		22,43 %			28,66 %		6,85 %	5,30 %	0,31 %	19,00 %	
PUEBLA DE SANABRIA	0,77 %	20,77 %			23,08 %		3,85 %	0,77 %		33,85 %	
PUENTE DOMINGO FLOREZ		20,43 %			31,18 %		2,15 %			8,60 %	
PUERTA NUEVA		26,32 %	0,29 %		17,25 %		4,39 %	2,92 %		32,46 %	
QUINTANAR DE LA SIERRA		10,14 %			21,62 %		5,41 %	16,22 %		30,41 %	
RIAÑO		12,35 %			9,88 %		11,11 %	2,47 %		32,10 %	
RIAZA		27,46 %			30,33 %	0,41 %	1,64 %	1,64 %	0,82 %	21,72 %	0,41 %
RIBERA DEL ESLA		25,00 %			20,27 %		6,76 %	3,38 %		22,97 %	
RIBERA DEL ORBIGO		32,15 %	0,93 %		18,32 %		2,62 %	3,55 %	0,19 %	23,93 %	0,19 %
ROA		27,99 %			38,06 %		1,49 %	5,60 %		12,31 %	
ROBLEDA		21,37 %			15,38 %		1,71 %	11,11 %	0,85 %	27,35 %	
RONDILLA I		22,92 %			18,58 %		3,56 %	8,70 %	0,40 %	27,67 %	0,40 %
RONDILLA II		27,94 %			22,06 %		3,19 %	5,88 %	0,25 %	25,00 %	
SACRAMENIA		20,00 %			44,00 %		4,00 %	4,00 %		4,00 %	
SAHAGUN		11,17 %			15,32 %		1,30 %	3,64 %	0,26 %	29,09 %	
SALAS DE LOS INFANTES		15,49 %			15,49 %		14,08 %	8,45 %		28,87 %	
SALDAÑA		34,30 %			21,26 %		0,97 %	0,97 %		23,19 %	
SAN AGUSTIN		21,39 %	1,03 %		19,17 %		0,88 %	12,54 %	0,15 %	34,22 %	
SAN ANDRES DEL RABANE		16,22 %	0,53 %		21,39 %		4,99 %	6,60 %	0,71 %	28,34 %	
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		25,14 %			20,00 %		12,00 %	2,29 %	0,57 %	25,14 %	
SAN ILDEFONSO		27,72 %			22,85 %		10,49 %	5,99 %	0,75 %	18,73 %	
SAN JOSE		25,70 %			14,46 %		2,41 %	9,24 %	0,40 %	22,49 %	

	9,58 %	0,42 %	
	12,05 %		
	3,78 %		0,18 %
	6,09 %		
	25,83 %		
	6,25 %		
	25,00 %		
	47,37 %		
	22,03 %		
0,69 %	14,48 %		
	9,43 %		
	11,11 %		
	19,50 %		
	12,90 %		
	15,09 %		
	27,08 %		
	19,67 %		0,17 %
	18,28 %		
	23,16 %		0,25 %
	20,73 %		
	20,88 %		
	7,89 %		
	23,81 %		
	14,77 %		
	10,00 %		
	25,45 %		
	16,94 %		
	12,21 %		
	14,49 %		
	24,66 %		
	27,59 %		
	26,58 %		
	30,00 %		
	17,45 %		
	16,92 %		
	37,63 %		
	16,08 %		0,29 %
	16,22 %		
	32,10 %		
	15,57 %		
	21,62 %		
	18,13 %		
	14,55 %		
	22,22 %		
	17,79 %		
	15,69 %		
	24,00 %		
	39,22 %		
	17,61 %		
	18,84 %		0,48 %
	10,62 %		
	21,21 %		
	14,86 %		
	13,48 %		
	25,30 %		

SAN JUAN		14,52 %		17,10 %		6,45 %	10,97 %		31,61 %	
SAN LEONARDO DE YAGUE		25,81 %	0,54 %	13,44 %			8,60 %		20,43 %	
SAN PABLO		22,74 %		25,86 %		0,62 %	8,41 %		23,05 %	
SAN PEDRO DEL ARROYO		45,87 %		8,26 %		3,67 %	0,92 %		23,85 %	
SAN PEDRO MANRIQUE		8,57 %		14,29 %		20,00 %	11,43 %		34,29 %	
SANTA CLARA		13,83 %		18,69 %		4,85 %	17,23 %	0,24 %	30,34 %	
SANTA ELENA		33,83 %		19,17 %		4,89 %	7,89 %	0,38 %	25,19 %	
SANTA MARIA		12,38 %	0,24 %	16,75 %		6,55 %	6,55 %	0,24 %	29,85 %	0,24 %
SANTA MARTA		13,05 %		19,58 %		5,47 %	4,84 %	0,21 %	41,68 %	
SAYAGO		21,76 %		26,94 %		4,66 %	2,07 %	1,04 %	25,91 %	
SEDANO		5,88 %		11,76 %					41,18 %	
SEGOVIA I		37,33 %		13,65 %		3,62 %	3,62 %	0,28 %	27,02 %	0,56 %
SEGOVIA II		24,19 %		15,81 %		3,02 %	2,33 %	6,51 %	32,33 %	
SEGOVIA III		37,10 %		14,93 %		1,36 %	2,71 %	0,45 %	23,53 %	
SEGOVIA RURAL		20,63 %		27,14 %		3,53 %	3,72 %	0,37 %	28,25 %	0,37 %
SEPULVEDA		25,78 %		32,81 %		1,56 %	1,56 %		17,19 %	
SERRADA		19,15 %		14,18 %	0,71 %	11,35 %	5,67 %	1,42 %	20,57 %	
SORIA NORTE		32,18 %		18,45 %	0,16 %	7,10 %	3,63 %	0,16 %	22,71 %	
SORIA RURAL		29,41 %	0,25 %	15,44 %	0,25 %	14,46 %	2,45 %	0,74 %	21,08 %	
SORIA SUR		29,10 %	0,49 %	16,87 %		8,56 %	2,93 %	0,24 %	16,14 %	
SORIA TARDE		47,11 %		14,05 %		10,74 %	0,83 %		21,49 %	
SOTILLO DE LA ADRADA		15,14 %		15,95 %		5,14 %	4,05 %	1,08 %	33,51 %	
SUR		32,30 %	1,86 %	15,53 %		1,86 %	5,28 %	0,31 %	23,29 %	
TABARA		17,77 %		7,11 %	0,51 %	12,18 %	2,54 %		31,47 %	
TAMAMES		8,14 %		38,37 %		2,33 %	1,16 %		26,74 %	
TEJARES		16,56 %		17,20 %		1,91 %	16,56 %		28,66 %	
TORDESILLAS		16,44 %		18,84 %		2,05 %	1,37 %	0,34 %	23,63 %	
TORENO		31,13 %		34,44 %		6,62 %	1,32 %		15,89 %	0,66 %
TORO		11,29 %		28,71 %		7,06 %	6,59 %		18,59 %	
TORQUEMADA		42,70 %		20,22 %		4,49 %	16,85 %		11,24 %	
TORTOLA		39,50 %		15,99 %		5,96 %	3,13 %		25,08 %	
TROBAJO DEL CAMINO - VA		17,01 %		19,10 %		5,14 %	5,30 %	0,16 %	32,74 %	
TUDELA		23,29 %	0,25 %	21,27 %		1,77 %	5,32 %	0,25 %	24,30 %	0,25 %
UNIVERSIDAD CENTRO		22,65 %		14,92 %		4,97 %	7,18 %	0,55 %	36,46 %	
VALDERAS		15,94 %	0,72 %	13,77 %		8,70 %	7,25 %		17,39 %	
VALENCIA DE DON JUAN		13,89 %		12,84 %		5,68 %	3,16 %	0,42 %	30,95 %	0,21 %
VALLADOLID RURAL I	0,59 %	30,00 %		23,53 %		2,35 %	2,94 %	0,59 %	17,06 %	
VALLADOLID RURAL II		18,52 %		13,89 %		1,85 %	1,85 %	0,93 %	36,11 %	
VALLE DE LOSA		57,14 %		14,29 %					21,43 %	
VALLE DE MENA		6,99 %		39,16 %		0,70 %	9,79 %		16,78 %	
VALLE DE TOBALINA		5,26 %		26,32 %					52,63 %	
VALLE DE VALDEBEZANA		14,29 %		40,48 %		9,52 %	11,90 %		14,29 %	
VENTA DE BAÑOS		23,66 %		18,54 %	0,24 %	2,20 %	5,37 %	0,73 %	26,10 %	
VIDRIALES		14,89 %		30,85 %		9,57 %	2,13 %		21,28 %	
VILLABLINO		16,00 %	0,36 %	17,09 %		6,18 %		0,36 %	18,91 %	
VILLACASTIN		34,85 %		10,61 %		10,61 %	6,06 %		21,21 %	
VILLADA		16,67 %		19,44 %		22,22 %	2,78 %		5,56 %	
VILLADIEGO		24,14 %		11,49 %			17,24 %		31,03 %	
VILLAFRANCA		9,36 %		24,63 %		2,96 %	0,99 %		17,24 %	
VILLAFRECHOS		33,33 %		10,83 %		7,50 %	2,50 %		29,17 %	
VILLALON DE CAMPOS		27,73 %		26,05 %		5,88 %	1,68 %		13,45 %	
VILLALPANDO		13,33 %		15,76 %		3,64 %	1,82 %		22,42 %	
VILLAMURIEL		20,81 %		10,74 %		2,01 %	6,04 %		36,91 %	
VILLARCAYO		21,21 %	1,01 %	30,30 %		6,06 %			15,15 %	
VILLARRAMIEL		22,08 %		16,88 %			3,90 %		33,77 %	

	19,03 %		0,32 %
	31,18 %		
	19,31 %		
	17,43 %		
	11,43 %		
	14,81 %		
	8,65 %		
	27,18 %		
	14,74 %	0,21 %	0,21 %
	17,62 %		
	41,18 %		
	13,93 %		
	15,81 %		
	19,91 %		
	15,80 %		0,19 %
	21,09 %		
	26,24 %		0,71 %
	15,62 %		
	15,93 %		
	25,67 %		
	4,96 %		0,83 %
	25,14 %		
0,31 %	19,25 %		
	28,43 %		
	23,26 %		
	19,11 %		
	37,33 %		
	9,93 %		
	27,76 %		
	4,49 %		
	10,34 %		
	20,39 %		0,16 %
	23,29 %		
	13,26 %		
	36,23 %		
	32,63 %	0,21 %	
	22,94 %		
	25,93 %	0,93 %	
	7,14 %		
	26,57 %		
	15,79 %		
	9,52 %		
	23,17 %		
	21,28 %		
	40,73 %		0,36 %
	16,67 %		
	33,33 %		
	16,09 %		
	44,33 %		0,49 %
	16,67 %		
	25,21 %		
	43,03 %		
	23,49 %		
	26,26 %		
	23,38 %		

VILLORIA		22,64 %			11,32 %		19,34 %	2,83 %	0,94 %	28,77 %	
VIRGEN CONCHA		27,57 %	0,35 %		17,28 %	0,17 %	2,09 %	2,44 %	0,17 %	32,11 %	
VITIGUDINO		9,91 %			26,13 %		1,35 %	8,56 %		33,33 %	
ZAMORA NORTE		14,59 %			18,82 %	0,21 %	17,55 %	4,23 %		20,51 %	
ZAMORA SUR		24,01 %	0,26 %		15,57 %		9,76 %	2,90 %	0,53 %	22,96 %	
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	0,14 %	0,01 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %

	14,15 %		
	17,80 %		
	20,72 %		
	24,10 %		
	24,01 %		
0,01 %	19,35 %	0,01 %	0,04 %

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AGREDA	306	83,15 %	368									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AGREDA	78,69 %	84,62 %	88,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA	25,42 %	21,51 %	0,84 %	8,38 %	3,35 %	36,59 %	0,28 %	3,63 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,01 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AGUILAR DE CAMPOO	454	67,66 %	671									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AGUILAR DE CAMPOO	64,62 %	70,63 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	283	66,43 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	191	79,06 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	258	52,71 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	733	67,66 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGUILAR DE CAMPOO	0,19 %	17,11 %	21,43 %	1,32 %	5,08 %	0,19 %	41,17 %	13,53 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ALAEJOS	137	66,50 %	206									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALAEJOS	64,52 %	71,11 %	64,79 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	82	60,98 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	89	73,03 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	43	53,49 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	216	66,50 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALAEJOS	16,88 %	8,75 %	16,88 %	9,38 %	26,25 %	21,88 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
ALBA DE TORMES	322	74,19 %	434	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				84	66,67 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				3	66,67 %		
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				288	80,21 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				69	55,07 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				444	74,19 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALBA DE TORMES	71,68 %	71,43 %	78,23 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALBA DE TORMES	31,45 %	13,71 %	11,02 %	1,08 %	20,43 %	0,27 %	21,77 %	0,27 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ALDEADAVILA DE LA RIBER	145	75,92 %	191									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALDEADAVILA DE LA RIBER	63,83 %	79,31 %	80,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	44	52,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	80	88,75 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	78	73,08 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	203	75,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALDEADAVILA DE LA RIBER	7,43 %	21,71 %	4,00 %	1,14 %	30,29 %	35,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ALISTE	220	67,69 %	325									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALISTE	62,82 %	67,69 %	69,35 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	110	63,64 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	72	75,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	159	62,89 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	347	67,69 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALISTE	18,56 %	11,74 %	7,58 %	7,95 %	28,79 %	0,38 %	25,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ALMAZAN	228	65,71 %	347									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALMAZAN	62,89 %	62,12 %	69,60 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALMAZAN	30,38 %	28,46 %	10,00 %	1,92 %	13,46 %	15,38 %	0,38 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ALTA SANABRIA	19	65,52 %	29									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ALTA SANABRIA	90,00 %	100,00 %	47,06 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	57,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	8	62,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	31	65,52 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALTA SANABRIA	9,52 %	14,29 %	23,81 %	52,38 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ANTONIO GUTIERREZ	817	63,48 %	1287									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ANTONIO GUTIERREZ	62,66 %	62,66 %	64,23 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	464	61,42 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	447	69,13 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	412	55,83 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	1.328	63,48 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	24,66 %	0,68 %	16,40 %	6,56 %	1,58 %	0,23 %	28,96 %	20,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARANDA NORTE	369	62,44 %	591									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARANDA NORTE	59,32 %	61,76 %	66,29 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	231	52,38 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	186	78,49 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	202	55,94 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	624	62,44 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA NORTE	0,24 %	15,61 %	0,49 %	20,73 %	2,44 %	12,20 %	0,49 %	35,85 %	11,95 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
ARANDA RURAL	265	70,29 %	377	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				132	59,09 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				4	100,00 %		
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				102	91,18 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				170	61,76 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				408	70,29 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARANDA RURAL	57,48 %	66,67 %	79,56 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA RURAL	10,26 %	20,86 %	2,98 %	12,58 %	0,66 %	38,41 %	14,24 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARANDA SUR	349	68,30 %	511									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARANDA SUR	62,89 %	69,52 %	74,68 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA SUR	7,94 %	0,25 %	23,08 %	4,96 %	11,17 %	0,50 %	39,95 %	12,16 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,01 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARCOS DE JALON	85	74,56 %	114									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARCOS DE JALON	79,49 %	70,00 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	19,00 %	10,00 %	14,00 %	3,00 %	31,00 %	1,00 %	22,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARENAS DE SAN PEDRO	330	70,66 %	467									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARENAS DE SAN PEDRO	66,67 %	72,28 %	73,84 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	282	71,63 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	45	75,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	173	61,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	504	70,66 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARENAS DE SAN PEDRO	10,97 %	8,88 %	0,52 %	3,39 %	5,74 %	47,00 %	23,50 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AREVALO	551	71,10 %	775									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AREVALO	66,08 %	72,07 %	77,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	298	72,82 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	206	78,16 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	334	59,28 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	846	71,10 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
AREVALO	29,79 %	18,86 %	8,23 %	3,29 %	22,01 %	17,66 %	0,15 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARMUNIA	409	67,05 %	610									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARMUNIA	66,88 %	65,04 %	68,42 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	206	66,99 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	42,86 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	118	77,12 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	312	59,62 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	643	67,05 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARMUNIA	0,22 %	14,10 %	13,66 %	4,63 %	7,27 %	0,44 %	35,24 %	24,45 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ARTURO EYRIES	250	59,81 %	418									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ARTURO EYRIES	54,84 %	63,10 %	66,10 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	130	51,54 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	217	66,82 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	79	53,16 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	428	59,81 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARTURO EYRIES	21,38 %	23,19 %	3,62 %	4,71 %	27,17 %	19,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ASTORGA I	411	60,89 %	675									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ASTORGA I	60,06 %	61,19 %	61,26 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	100,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	226	59,73 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	120	67,50 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	356	56,18 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	706	60,89 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	11,53 %	7,98 %	2,88 %	3,77 %	0,44 %	37,69 %	35,70 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ASTORGA II	206	73,31 %	281									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ASTORGA II	71,84 %	71,93 %	73,98 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	9,96 %	9,13 %	2,07 %	8,30 %	35,27 %	35,27 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AVILA ESTACION	322	69,40 %	464									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AVILA ESTACION	65,13 %	74,51 %	75,49 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	154	66,88 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	195	76,41 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	132	58,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	484	69,40 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA ESTACION	43,15 %	13,99 %	2,04 %	6,41 %	18,08 %	16,03 %	0,29 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AVILA NORTE	221	60,05 %	368									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AVILA NORTE	55,31 %	62,14 %	66,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	144	61,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	120	72,50 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	112	41,96 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	379	60,05 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	34,30 %	19,42 %	0,41 %	7,02 %	2,48 %	21,90 %	14,46 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
AVILA RURAL	217	64,97 %	334	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				111	64,86 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				120	72,50 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				110	57,27 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				341	64,97 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AVILA RURAL	58,27 %	61,29 %	73,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA RURAL	35,68 %	24,90 %	2,49 %	3,73 %	17,01 %	0,41 %	15,35 %	0,41 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,04 %

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AVILA SUR ESTE	341	62,00 %	550									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AVILA SUR ESTE	58,40 %	65,66 %	68,09 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	168	55,95 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	305	68,20 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	102	41,18 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	579	62,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR ESTE	25,07 %	15,83 %	9,50 %	6,33 %	0,26 %	25,33 %	17,68 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
AVILA SUR OESTE	244	63,71 %	383									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
AVILA SUR OESTE	54,46 %	75,64 %	74,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	113	63,72 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	211	65,40 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	77	49,35 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	403	63,71 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURAN
AVILA SUR OESTE	44,16 %	0,36 %	20,80 %	0,36 %	3,65 %	3,28 %	0,36 %	14,23 %	12,41 %	0,36 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,01 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BABIA	51	61,45 %	83									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BABIA	58,33 %	66,67 %	59,09 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BABIA	20,00 %	34,55 %	10,91 %	3,64 %	18,18 %	12,73 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BALTANAS	126	84,56 %	149									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BALTANAS	84,85 %	85,29 %	83,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BALTANAS	27,22 %	6,96 %	19,62 %	19,62 %	11,39 %	15,19 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BAÑEZA I	477	71,41 %	668									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BAÑEZA I	72,64 %	68,18 %	71,15 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	236	69,07 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	181	78,45 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	286	64,34 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	707	71,41 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	19,32 %	19,51 %	0,19 %	4,13 %	1,13 %	27,58 %	28,14 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BAÑEZA II	402	71,15 %	565									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BAÑEZA II	76,53 %	67,00 %	69,12 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	149	67,79 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	239	78,66 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	204	60,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	593	71,15 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	15,71 %	18,26 %	7,01 %	4,03 %	0,42 %	25,69 %	28,87 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BARCO DE AVILA	115	56,65 %	203									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BARCO DE AVILA	45,78 %	51,43 %	69,41 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	74	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	76	67,11 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	63	52,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	214	56,65 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	20,16 %	23,26 %	7,75 %	2,33 %	34,88 %	11,63 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

BARRIO ESPAÑA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BARRIO ESPAÑA	211	50,12 %	421									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BARRIO ESPAÑA	44,81 %	54,41 %	63,10 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	73	49,32 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	330	48,48 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	49	46,94 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	454	50,12 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARRIO ESPAÑA	42,61 %	14,35 %	2,17 %	3,04 %	17,39 %	20,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BEJAR	417	65,67 %	635									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BEJAR	61,92 %	69,12 %	67,08 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	283	63,60 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	88,89 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	142	67,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	235	63,40 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	669	65,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	21,79 %	16,03 %	3,63 %	9,19 %	0,21 %	32,05 %	17,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BELORADO	173	72,08 %	240									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BELORADO	62,64 %	70,59 %	79,21 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	118	67,80 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	71	78,87 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	59	72,88 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	250	72,08 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BELORADO	34,33 %	17,91 %	11,94 %	6,97 %	0,50 %	21,39 %	6,97 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BEMBIBRE	479	55,83 %	858									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BEMBIBRE	53,85 %	56,54 %	57,31 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	333	59,76 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	134	66,42 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	432	46,99 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	904	55,83 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEMBIBRE	13,73 %	28,76 %	0,74 %	4,82 %	0,19 %	26,53 %	0,37 %	24,86 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BENAVENTE NORTE	369	68,21 %	541									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BENAVENTE NORTE	68,66 %	68,38 %	66,25 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	219	68,04 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	136	81,62 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	216	57,87 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	573	68,21 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE NORTE	0,47 %	13,65 %	18,35 %	0,24 %	4,71 %	7,06 %	37,18 %	18,35 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BENAVENTE SUR	507	64,26 %	789									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BENAVENTE SUR	59,10 %	63,77 %	71,04 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	300	57,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	168	81,55 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	362	57,73 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	834	64,26 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE SUR	12,82 %	0,34 %	17,71 %	0,17 %	3,54 %	3,71 %	37,10 %	0,17 %	24,28 %	0,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,01 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,01 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BERLANGA DE DUERO	52	72,22 %	72									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BERLANGA DE DUERO	61,29 %	69,23 %	85,71 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BERLANGA DE DUERO	22,41 %	12,07 %	1,72 %	34,48 %	29,31 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BOÑAR	80	60,15 %	133									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BOÑAR	43,14 %	57,58 %	79,59 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	66	63,64 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	24	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	44	47,73 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	135	60,15 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BOÑAR	28,74 %	28,74 %	6,90 %	4,60 %	22,99 %	8,05 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BRIVIESCA	322	68,51 %	470									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BRIVIESCA	65,52 %	66,67 %	75,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	153	64,05 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	231	71,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	103	60,19 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	491	68,51 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	18,03 %	24,32 %	1,37 %	12,84 %	0,82 %	28,14 %	14,48 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BURGO DE OSMA	128	63,37 %	202									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BURGO DE OSMA	61,80 %	63,41 %	64,86 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	48	56,25 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	45	82,22 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	117	57,26 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	211	63,37 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGO DE OSMA	25,00 %	14,86 %	16,89 %	2,70 %	31,76 %	8,78 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BURGOHONDO	144	62,88 %	229									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BURGOHONDO	47,30 %	67,44 %	70,18 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	89	62,92 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	48	68,75 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	100	55,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	239	62,88 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	12,42 %	16,77 %	1,24 %	3,73 %	0,62 %	39,75 %	25,47 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BURGOS RURAL NORTE	192	54,70 %	351									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BURGOS RURAL NORTE	51,72 %	57,89 %	63,49 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	109	75,23 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	208	44,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	37	48,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	360	54,70 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL NORTE	7,51 %	15,96 %	1,41 %	14,08 %	32,86 %	28,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
BURGOS RURAL SUR	272	61,82 %	440									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
BURGOS RURAL SUR	56,08 %	65,22 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	173	61,85 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	214	64,49 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	72	45,83 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	462	61,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGOS RURAL SUR	9,54 %	15,79 %	1,32 %	18,42 %	32,57 %	22,04 %	0,33 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CACABELOS	360	63,49 %	567									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CACABELOS	61,15 %	65,18 %	65,36 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	208	71,63 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	82	76,83 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	300	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	592	63,49 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CACABELOS	11,87 %	23,48 %	3,54 %	1,01 %	1,77 %	20,71 %	37,63 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CALZADA DE VALDUNCIEL	112	68,71 %	163									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CALZADA DE VALDUNCIEL	66,25 %	59,46 %	72,55 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CALZADA DE VALDUNCIEL	6,30 %	29,13 %	4,72 %	8,66 %	42,52 %	8,66 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

CAMARZANA DE TERA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CAMARZANA DE TERA	120	59,41 %	202									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CAMARZANA DE TERA	62,69 %	55,56 %	59,34 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMARZANA DE TERA	26,28 %	24,09 %	1,46 %	4,38 %	22,63 %	21,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

CAMPOS LAMPREANA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CAMPOS LAMPREANA	116	74,36 %	156									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CAMPOS LAMPREANA	67,35 %	82,05 %	73,91 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMPOS LAMPREANA	18,80 %	20,30 %	7,52 %	1,50 %	31,58 %	20,30 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	106	61,99 %	171									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	60,81 %	55,56 %	67,21 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	27,93 %	15,32 %	5,41 %	13,51 %	0,90 %	27,93 %	9,01 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CANDELEDA	277	77,81 %	356									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CANDELEDA	69,92 %	75,64 %	84,81 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	224	79,46 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	66	89,39 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	98	63,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	389	77,81 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	0,29 %	31,10 %	11,63 %	0,29 %	1,45 %	13,95 %	22,67 %	18,60 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CANTALAPIEDRA	142	85,54 %	166									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CANTALAPIEDRA	88,89 %	85,37 %	83,33 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	88	85,23 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	18	72,22 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	70	84,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	179	85,54 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALAPIEDRA	7,98 %	5,52 %	8,59 %	1,84 %	0,61 %	33,74 %	41,72 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CANTALEJO	255	75,89 %	336									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CANTALEJO	71,95 %	80,95 %	78,18 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	214	71,96 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	65	90,77 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	84	65,48 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	366	75,89 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALEJO	21,02 %	26,10 %	1,36 %	2,71 %	3,73 %	31,19 %	13,90 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CANTERAC	167	53,87 %	310									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CANTERAC	42,64 %	58,33 %	63,64 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	100,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	99	51,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	131	59,54 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	86	46,51 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	318	53,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTERAC	30,27 %	21,62 %	4,86 %	10,81 %	0,54 %	20,00 %	11,89 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
CAPUCHINOS	223	70,13 %	318	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				85	65,88 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				1			
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				152	76,32 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				95	56,84 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				333	70,13 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CAPUCHINOS	71,04 %	59,68 %	76,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAPUCHINOS	30,74 %	0,41 %	13,11 %	9,43 %	9,02 %	28,69 %	8,61 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
CARBAJALES DE ALBA	32	80,00 %	40	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				13	92,31 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				21	61,90 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				12	75,00 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				46	80,00 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CARBAJALES DE ALBA	90,00 %	66,67 %	79,17 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBAJALES DE ALBA	10,26 %	17,95 %	2,56 %	2,56 %	25,64 %	41,03 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CARBALLEDA	161	75,23 %	214									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CARBALLEDA	74,24 %	78,79 %	74,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	39	71,79 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	99	84,85 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	88	62,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	227	75,23 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	15,18 %	14,14 %	1,05 %	12,04 %	5,76 %	13,61 %	38,22 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CARBONERO	328	80,79 %	406									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CARBONERO	74,68 %	78,57 %	86,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	141	71,63 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	172	86,05 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	112	78,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	426	80,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	20,95 %	23,34 %	19,10 %	1,59 %	21,49 %	13,53 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CARRION DE LOS CONDES	224	57,14 %	392									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CARRION DE LOS CONDES	44,09 %	54,55 %	76,06 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	116	66,38 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	233	52,79 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	81	37,04 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	433	57,14 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARRION DE LOS CONDES	36,58 %	1,56 %	25,29 %	4,67 %	4,67 %	0,39 %	18,29 %	8,56 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CASA DEL BARCO	281	53,22 %	528									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CASA DEL BARCO	45,88 %	60,19 %	59,88 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	184	54,89 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	247	51,01 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	111	48,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	546	53,22 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CASA DEL BARCO	36,02 %	23,29 %	2,17 %	3,11 %	23,60 %	11,80 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CEBREROS	195	53,87 %	362									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CEBREROS	51,03 %	51,61 %	59,63 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	131	61,83 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	134	46,27 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	116	49,14 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	382	53,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CEBREROS	11,16 %	13,95 %	5,58 %	2,33 %	44,65 %	22,33 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CENTRO-GAMAZO	258	68,07 %	379									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CENTRO-GAMAZO	64,29 %	65,63 %	72,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	195	70,26 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	94	72,34 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	110	54,55 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	402	68,07 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CENTRO-GAMAZO	19,31 %	0,34 %	16,21 %	5,86 %	8,28 %	0,34 %	25,86 %	23,79 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CERVERA DE PISUERGA	119	59,80 %	199									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CERVERA DE PISUERGA	51,06 %	54,17 %	77,97 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	69	60,87 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	70	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	70	34,29 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		209	59,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CERVERA DE PISUERGA	38,35 %	0,75 %	21,05 %	0,75 %	2,26 %	0,75 %	0,75 %	21,05 %	14,29 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CIGALES	103	44,98 %	229									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CIGALES	34,85 %	53,57 %	60,87 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	83	51,81 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	127	39,37 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	25	40,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	237	44,98 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIGALES	29,91 %	28,21 %	4,27 %	3,42 %	0,85 %	17,09 %	16,24 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CIRCULAR	332	71,86 %	462									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CIRCULAR	67,44 %	77,91 %	74,23 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	150	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	254	75,59 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	77	62,34 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	482	71,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	16,80 %	19,78 %	8,13 %	2,98 %	29,27 %	23,04 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CIRCUNVALACION	247	56,78 %	435									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CIRCUNVALACION	54,48 %	56,79 %	62,92 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	100,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	160	59,38 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	153	65,36 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	126	42,06 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	441	56,78 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCUNVALACION	48,54 %	14,96 %	2,92 %	22,63 %	10,95 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CISTIERRA	132	55,00 %	240									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CISTIERRA	59,43 %	37,50 %	58,62 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CISTIERRA	18,25 %	27,01 %	5,84 %	1,46 %	27,74 %	19,71 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CIUDAD RODRIGO	567	74,61 %	760									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CIUDAD RODRIGO	76,03 %	72,22 %	72,84 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	167	63,47 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	510	78,63 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	119	63,03 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	799	74,61 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIUDAD RODRIGO	29,74 %	23,37 %	1,37 %	4,86 %	0,15 %	30,35 %	10,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

CONDADO DE TREVIÑO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CONDADO DE TREVIÑO	42	56,76 %	74									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CONDADO DE TREVIÑO	50,00 %	57,14 %	78,57 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDADO DE TREVIÑO	21,28 %	2,13 %	42,55 %	25,53 %	8,51 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CONDESA	326	67,08 %	486									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CONDESA	63,89 %	67,92 %	69,82 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	171	61,99 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	120	76,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	219	60,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	514	67,08 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDESA	18,13 %	21,98 %	10,44 %	2,47 %	0,82 %	22,80 %	0,27 %	23,08 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CORRALES	136	83,44 %	163									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CORRALES	78,95 %	87,10 %	85,33 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CORRALES	33,97 %	13,46 %	8,33 %	2,56 %	23,72 %	0,64 %	17,31 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CRISTOBAL ACOSTA	421	68,01 %	619									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CRISTOBAL ACOSTA	65,88 %	67,46 %	70,94 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	99	69,70 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	60,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	426	68,08 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	101	61,39 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	631	68,01 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRISTOBAL ACOSTA	16,92 %	0,43 %	21,41 %	2,78 %	8,35 %	43,25 %	0,21 %	6,64 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CRUCERO	287	59,05 %	486									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CRUCERO	58,11 %	63,16 %	56,77 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	199	63,32 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	10	30,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	132	70,45 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	164	43,90 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	505	59,05 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	26,96 %	14,73 %	5,02 %	1,57 %	0,31 %	27,59 %	23,82 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CUELLAR	340	63,08 %	539									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CUELLAR	53,67 %	60,67 %	75,50 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	193	61,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	205	74,63 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	158	45,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	559	63,08 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	12,06 %	35,68 %	2,01 %	3,52 %	32,91 %	13,82 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

CUENCA DEL BERNESGA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
CUENCA DEL BERNESGA	387	69,98 %	553									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
CUENCA DEL BERNESGA	66,43 %	76,15 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	250	70,40 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	80,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	198	67,17 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	131	63,36 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	584	69,98 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUENCA DEL BERNESGA	21,49 %	14,03 %	5,88 %	3,62 %	0,23 %	34,62 %	0,23 %	19,91 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
DELICIAS I	555	61,80 %	898									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
DELICIAS I	61,61 %	69,29 %	57,02 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	259	58,69 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	253	74,31 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	437	52,86 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	953	61,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
DELICIAS I	24,65 %	0,47 %	14,60 %	1,57 %	3,77 %	0,16 %	34,85 %	19,78 %	0,16 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
DELICIAS II	295	59,72 %	494									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
DELICIAS II	57,78 %	60,61 %	61,72 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	170	57,65 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	72	55,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	268	59,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	514	59,72 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	14,76 %	0,30 %	11,14 %	0,30 %	3,31 %	10,84 %	40,66 %	18,67 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,01 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.

2025-12

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
DESCONOCIDO	5	71,43 %	7
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819

% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	65 a74	= o+75
DESCONOCIDO	60,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	66,13 %	70,48 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		7	71,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DESCONOCIDO	60,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
EL EJIDO	511	65,01 %	786									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
EL EJIDO	68,05 %	60,37 %	61,29 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	264	56,82 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	80,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	267	68,16 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	284	65,14 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	820	65,01 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL EJIDO	24,91 %	0,36 %	12,91 %	8,55 %	4,73 %	0,36 %	28,73 %	19,45 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
EL ESPINAR	195	70,40 %	277									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
EL ESPINAR	65,38 %	70,00 %	78,38 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL ESPINAR	19,18 %	14,16 %	6,39 %	5,48 %	0,46 %	33,79 %	20,55 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ERAS DEL BOSQUE	454	63,85 %	711									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ERAS DEL BOSQUE	62,47 %	62,89 %	64,60 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	300	65,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	202	60,40 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	259	61,39 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	765	63,85 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ERAS DEL BOSQUE	12,48 %	20,79 %	1,70 %	9,26 %	0,38 %	32,51 %	0,19 %	22,68 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ESGUEVILLAS	39	59,09 %	66									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ESGUEVILLAS	63,16 %	37,50 %	65,63 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	37	48,65 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	85,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	27	62,96 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	72	59,09 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESGUEVILLAS	19,57 %	26,09 %	15,22 %	4,35 %	15,22 %	19,57 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ESPINOSA DE LOS MONTER	125	77,16 %	162									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ESPINOSA DE LOS MONTEF	73,68 %	72,73 %	81,94 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTEF	13,67 %	22,30 %	1,44 %	2,16 %	41,01 %	19,42 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FABERO	232	61,38 %	378									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FABERO	60,37 %	61,54 %	61,11 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	24,71 %	19,39 %	9,13 %	0,38 %	23,95 %	22,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FONTIVEROS	122	80,26 %	152									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FONTIVEROS	77,36 %	81,82 %	80,77 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	37	81,08 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	53	90,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	68	67,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	159	80,26 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FONTIVEROS	0,68 %	21,62 %	18,92 %	20,27 %	4,73 %	8,78 %	25,00 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FROMISTA	105	62,87 %	167									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FROMISTA	59,26 %	64,58 %	65,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	11,97 %	0,85 %	38,46 %	1,71 %	5,98 %	1,71 %	17,95 %	21,37 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FUENTEGUINALDO	29	82,86 %	35									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FUENTEGUINALDO	71,43 %	100,00 %	83,33 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTEGUINALDO	3,13 %	25,00 %	12,50 %	3,13 %	46,88 %	9,38 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FUENTESAUCO	42	56,00 %	75									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FUENTESAUCO	72,73 %	41,18 %	51,35 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	8	62,50 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	85,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	65	47,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	82	56,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTESAUCO	47,73 %	11,36 %	31,82 %	9,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

FUENTES DE OÑORO
Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
FUENTES DE OÑORO	70	76,92 %	91									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
FUENTES DE OÑORO	80,49 %	78,57 %	72,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	23	78,26 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	17	94,12 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	53	69,81 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	94	76,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTES DE OÑORO	25,58 %	18,60 %	8,14 %	24,42 %	23,26 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GAMONAL-ANTIGUA	539	70,18 %	768									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GAMONAL-ANTIGUA	66,75 %	69,23 %	74,49 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	294	69,39 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	356	71,35 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	153	64,71 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	805	70,18 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAMONAL-ANTIGUA	0,16 %	27,88 %	0,32 %	31,44 %	0,32 %	8,91 %	21,72 %	9,24 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GARCIA LORCA	469	68,67 %	683									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GARCIA LORCA	66,86 %	70,86 %	69,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARCIA LORCA	27,48 %	0,19 %	21,12 %	0,93 %	18,13 %	20,37 %	11,78 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GARRIDO NORTE	396	57,98 %	683									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GARRIDO NORTE	48,20 %	62,50 %	66,93 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	241	63,07 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	367	56,13 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	92	45,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	702	57,98 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO NORTE	19,69 %	15,66 %	15,44 %	4,47 %	35,57 %	8,95 %	0,22 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GARRIDO SUR	506	58,56 %	864									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GARRIDO SUR	56,60 %	56,25 %	62,12 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	252	55,56 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	477	62,26 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	173	45,66 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	908	58,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANÓ	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO SUR	15,43 %	0,18 %	0,18 %	13,65 %	12,77 %	7,45 %	0,18 %	32,62 %	17,20 %	0,18 %	0,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	0,01 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GOMARA	40	78,43 %	51									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GOMARA	68,42 %	91,67 %	80,95 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GOMARA	31,82 %	18,18 %	15,91 %	22,73 %	11,36 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GREDOS	46	54,12 %	85									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GREDOS	45,71 %	57,14 %	59,46 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GREDOS	61,22 %	4,08 %	18,37 %	16,33 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GUARDO	396	63,97 %	619									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GUARDO	59,16 %	72,26 %	64,97 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	231	67,97 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	62,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	155	84,52 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	259	46,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	654	63,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUARDO	0,22 %	18,12 %	19,00 %	3,06 %	2,40 %	0,22 %	25,76 %	31,22 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GUAREÑA	139	64,95 %	214									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GUAREÑA	54,29 %	65,96 %	72,16 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	82	57,32 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	104	71,15 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	38	57,89 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	225	64,95 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	18,67 %	34,94 %	0,60 %	4,22 %	21,69 %	19,88 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
GUIJUELO	303	72,66 %	417									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
GUIJUELO	74,11 %	68,92 %	70,49 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	12,25 %	19,09 %	17,66 %	7,41 %	0,28 %	21,94 %	21,37 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
HERRERA DE PISUERGA	192	66,67 %	288									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
HERRERA DE PISUERGA	63,16 %	76,36 %	66,02 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HERRERA DE PISUERGA	15,04 %	16,37 %	11,95 %	2,21 %	24,78 %	29,65 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
HUERTA DEL REY	481	56,79 %	847									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
HUERTA DEL REY	52,05 %	56,69 %	64,96 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	292	60,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	439	55,35 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	153	48,37 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	890	56,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DEL REY	31,99 %	0,37 %	19,01 %	0,18 %	4,20 %	1,83 %	0,37 %	24,86 %	0,18 %	17,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
HUERTA DE REY	52	68,42 %	76									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
HUERTA DE REY	69,23 %	68,75 %	68,18 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DE REY	35,94 %	14,06 %	7,81 %	25,00 %	17,19 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
IGNACIO LOPEZ SAIZ	403	62,87 %	641									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
IGNACIO LOPEZ SAIZ	56,07 %	59,69 %	74,16 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	104	60,58 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	506	63,83 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	35	54,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	649	62,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	0,21 %	30,56 %	0,21 %	16,88 %	0,43 %	17,52 %	23,08 %	10,90 %	0,21 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ISCAR	323	68,43 %	472									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ISCAR	69,81 %	70,87 %	60,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	199	72,86 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	131	83,21 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	161	48,45 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	493	68,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ISCAR	10,35 %	31,61 %	5,45 %	7,08 %	17,98 %	0,27 %	27,25 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
JARDINILLOS	334	60,18 %	555									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
JARDINILLOS	54,51 %	50,00 %	70,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	288	67,01 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	133	45,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	145	57,24 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	569	60,18 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JARDINILLOS	29,95 %	0,26 %	22,92 %	4,17 %	6,51 %	0,26 %	19,53 %	16,41 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
JOSE AGUADO	737	69,33 %	1063									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
JOSE AGUADO	67,47 %	71,49 %	70,33 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	328	69,21 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	315	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	463	68,47 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	1.112	69,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSE AGUADO	15,25 %	0,12 %	15,01 %	11,69 %	2,58 %	31,98 %	0,12 %	23,25 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	452	60,11 %	752									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	56,16 %	56,48 %	73,86 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	154	72,73 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	458	57,21 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	157	53,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	770	60,11 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	25,24 %	0,78 %	17,81 %	1,76 %	13,31 %	0,20 %	28,18 %	12,52 %	0,20 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA ALAMEDILLA	204	53,68 %	380									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA ALAMEDILLA	51,52 %	50,00 %	56,95 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	124	48,39 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	157	63,69 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	110	43,64 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	394	53,68 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALAMEDILLA	20,98 %	0,45 %	13,84 %	13,84 %	8,93 %	0,45 %	23,66 %	17,86 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA ALBERCA	98	60,49 %	162									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA ALBERCA	62,30 %	68,97 %	54,79 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	57	54,39 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	47	59,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	67	62,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	174	60,49 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	38,74 %	8,11 %	9,01 %	0,90 %	1,80 %	14,41 %	27,03 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA CABRERA	58	71,60 %	81									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA CABRERA	75,76 %	77,27 %	59,26 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	21	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	57	75,44 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	86	71,60 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA CABRERA	6,06 %	16,67 %	39,39 %	37,88 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA FUENTE SAN ESTEBAN	133	84,18 %	158									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA FUENTE SAN ESTEBAN	73,08 %	82,14 %	92,31 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	17,90 %	20,99 %	9,26 %	3,70 %	29,01 %	19,14 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LAGUNA DE DUERO	531	63,82 %	832									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LAGUNA DE DUERO	59,31 %	69,64 %	69,46 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	252	60,32 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	359	69,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	254	53,94 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	871	63,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAGUNA DE DUERO	23,65 %	0,17 %	0,17 %	19,93 %	2,36 %	5,24 %	27,70 %	20,61 %	0,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	0,01 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
LA MAGDALENA	133	70,74 %	188	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				78	66,67 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				75	82,67 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				43	53,49 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				196	70,74 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA MAGDALENA	69,12 %	61,29 %	74,44 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	39,60 %	15,44 %	10,07 %	0,67 %	20,13 %	14,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LANZAHITA	102	68,00 %	150									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LANZAHITA	64,71 %	66,67 %	70,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	82	68,29 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	45,45 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	62	69,35 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	160	68,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LANZAHITA	26,61 %	9,17 %	14,68 %	7,34 %	0,92 %	24,77 %	16,51 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA PALOMERA	646	65,92 %	980									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA PALOMERA	65,89 %	66,13 %	64,98 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	351	69,23 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	295	55,25 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	377	67,11 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	1.025	65,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PALOMERA	0,14 %	30,42 %	12,39 %	7,32 %	2,96 %	0,28 %	26,48 %	0,28 %	19,72 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA PUEBLA	487	61,26 %	795									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA PUEBLA	60,34 %	58,85 %	63,42 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	346	62,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	60,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	264	62,88 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	242	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	857	61,26 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA PUEBLA	19,71 %	0,18 %	17,13 %	0,18 %	11,05 %	9,39 %	0,18 %	23,76 %	0,18 %	18,05 %	0,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,04 %

LAS HUELGAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LAS HUELGAS	254	65,97 %	385									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LAS HUELGAS	59,62 %	85,37 %	77,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	103	76,70 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	209	63,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	81	59,26 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	395	65,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUELGAS	17,51 %	0,34 %	28,62 %	3,70 %	11,78 %	26,60 %	11,45 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA SIERRA	62	70,45 %	88									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA SIERRA	68,75 %	73,91 %	69,70 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA SIERRA	20,59 %	22,06 %	1,47 %	1,47 %	44,12 %	10,29 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LAS NAVAS DEL MARQUES	377	71,27 %	529									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LAS NAVAS DEL MARQUES	69,87 %	65,49 %	77,50 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	279	72,04 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	80,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	132	60,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	161	67,70 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	577	71,27 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS NAVAS DEL MARQUES	29,70 %	9,74 %	0,23 %	0,46 %	2,55 %	0,23 %	38,28 %	18,33 %	0,23 %	0,23 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LAS TORRES	262	66,16 %	396									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LAS TORRES	66,38 %	61,19 %	67,65 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	170	67,65 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	174	65,52 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	64	59,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	410	66,16 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	23,71 %	0,34 %	29,90 %	0,69 %	7,22 %	27,49 %	10,65 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LA VICTORIA	341	56,46 %	604									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LA VICTORIA	52,51 %	58,77 %	62,34 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	271	55,35 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	270	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	85	40,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	628	56,46 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	20,68 %	28,53 %	6,02 %	2,36 %	22,25 %	20,16 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LEDESMA	118	71,08 %	166									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LEDESMA	70,83 %	65,63 %	73,26 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	60	65,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	77	89,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	40	35,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	178	71,08 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LEDESMA	14,58 %	11,11 %	9,72 %	2,08 %	36,81 %	25,69 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
LERMA	310	74,34 %	417	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				97	68,04 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				3	100,00 %		
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				259	81,47 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				84	51,19 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				443	74,34 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LERMA	78,02 %	61,90 %	72,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	30,99 %	0,28 %	15,77 %	1,13 %	10,42 %	0,28 %	26,48 %	14,65 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LINARES DE RIOFRIO	105	71,43 %	147									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LINARES DE RIOFRIO	79,07 %	48,57 %	76,06 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	37	48,65 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	86	87,21 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	31	51,61 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	155	71,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LINARES DE RIOFRIO	22,40 %	7,20 %	12,80 %	12,80 %	20,00 %	24,80 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

LOS COMUNEROS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LOS COMUNEROS	425	67,57 %	629									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LOS COMUNEROS	70,35 %	59,86 %	68,42 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	194	65,98 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	80,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	297	74,41 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	151	54,97 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	647	67,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LOS COMUNEROS	15,79 %	0,84 %	17,68 %	0,42 %	20,21 %	0,21 %	33,47 %	10,95 %	0,42 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LOS CUBOS	303	69,02 %	439									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LOS CUBOS	66,79 %	63,33 %	78,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	114	58,77 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	251	74,90 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	83	61,45 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	449	69,02 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	23,61 %	20,28 %	1,67 %	11,11 %	30,56 %	12,78 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
LUMBRALES	102	69,86 %	146									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
LUMBRALES	65,00 %	58,33 %	75,61 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	35	45,71 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	75	86,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	41	53,66 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	153	69,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LUMBRALES	13,22 %	19,01 %	4,13 %	2,48 %	40,50 %	20,66 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MADRIGAL ALTAS TORRES	57	54,29 %	105									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MADRIGAL ALTAS TORRES	50,00 %	66,67 %	51,28 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	53	56,60 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	45,45 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	43	53,49 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	110	54,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MADRIGAL ALTAS TORRES	23,44 %	34,38 %	1,56 %	7,81 %	9,38 %	23,44 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MAGDALENA	173	65,78 %	263									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MAGDALENA	58,42 %	65,28 %	73,63 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAGDALENA	25,77 %	11,86 %	1,55 %	5,67 %	42,78 %	12,37 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MANSILLA DE LAS MULAS	181	58,20 %	311									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MANSILLA DE LAS MULAS	58,91 %	56,45 %	57,38 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	123	65,04 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	31	61,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	177	51,98 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	332	58,20 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MANSILLA DE LAS MULAS	23,65 %	25,62 %	3,94 %	2,96 %	21,67 %	22,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MATALLANA DE TORIO	31	41,89 %	74									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MATALLANA DE TORIO	41,03 %	37,50 %	45,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATALLANA DE TORIO	29,41 %	14,71 %	5,88 %	2,94 %	41,18 %	5,88 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

MATILLA DE LOS CAÑOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MATILLA DE LOS CAÑOS	41	65,08 %	63									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MATILLA DE LOS CAÑOS	51,43 %	92,86 %	66,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	6,98 %	27,91 %	2,33 %	39,53 %	23,26 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MAYORGA DE CAMPOS	126	76,83 %	164									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MAYORGA DE CAMPOS	75,86 %	81,25 %	75,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAYORGA DE CAMPOS	14,69 %	37,76 %	5,59 %	2,10 %	6,99 %	0,70 %	32,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MEDINA DEL CAMPO RURAL	351	68,55 %	512									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MEDINA DEL CAMPO RURAL	71,30 %	61,46 %	68,09 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	162	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	303	70,96 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	67	53,73 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	535	68,55 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	27,09 %	0,51 %	21,01 %	6,84 %	3,54 %	0,25 %	16,20 %	0,25 %	24,30 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MEDINA DEL CAMPO URBAN	752	68,55 %	1097									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MEDINA DEL CAMPO URBA	65,61 %	70,08 %	72,35 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBA	33,92 %	14,20 %	6,10 %	2,58 %	0,35 %	12,91 %	0,12 %	29,81 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MEDINA DE POMAR	121	69,54 %	174									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MEDINA DE POMAR	64,56 %	52,94 %	83,87 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	71	78,87 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	73	68,49 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	30	53,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	178	69,54 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE POMAR	31,91 %	33,33 %	2,13 %	2,84 %	9,22 %	20,57 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MEDINA DE RIOSECO	181	58,20 %	311									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MEDINA DE RIOSECO	52,83 %	66,67 %	61,29 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	120	54,17 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	115	61,74 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	90	51,11 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	327	58,20 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE RIOSECO	31,63 %	19,53 %	2,79 %	6,98 %	0,47 %	17,21 %	21,40 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MELGAR DE FERNAMENTAL	158	82,72 %	191									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MELGAR DE FERNAMENTAL	84,72 %	90,00 %	77,50 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	73	80,82 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	38	84,21 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	90	82,22 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	202	82,72 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTAL	14,21 %	33,33 %	8,74 %	13,66 %	17,49 %	12,57 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MIGUEL ARMIJO	217	56,36 %	385									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MIGUEL ARMIJO	56,81 %	50,00 %	57,14 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	125	46,40 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	187	60,96 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	82	58,54 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	396	56,36 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
MIGUEL ARMIJO	18,33 %	0,83 %	23,33 %	5,83 %	6,67 %	35,00 %	9,58 %	0,42 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MIRANDA DEL CASTAÑAR	69	60,53 %	114									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MIRANDA DEL CASTAÑAR	57,50 %	54,55 %	64,15 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	6,02 %	19,28 %	7,23 %	13,25 %	42,17 %	12,05 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MIRANDA ESTE	492	63,57 %	774									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MIRANDA ESTE	100,00 %	59,90 %	61,11 %	70,78 %								
TOTAL GAP	100,00 %	62,44 %	66,13 %	70,48 %								

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA ESTE	25,72 %	0,18 %	29,14 %	0,18 %	6,29 %	4,14 %	30,40 %	3,78 %	0,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MIRANDA OESTE	652	67,99 %	959									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MIRANDA OESTE	63,75 %	68,93 %	75,69 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	419	63,96 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	408	77,21 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	185	46,49 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	1.014	67,99 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA OESTE	26,36 %	22,38 %	0,26 %	8,48 %	9,93 %	26,49 %	6,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MOMBELTRAN	136	70,83 %	192									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MOMBELTRAN	73,13 %	86,11 %	61,70 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOMBELTRAN	22,52 %	6,62 %	7,28 %	6,62 %	31,13 %	25,83 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MOTA DEL MARQUES	43	82,69 %	52									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MOTA DEL MARQUES	84,62 %	78,57 %	76,92 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	30	76,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	16	87,50 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	77,78 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		55	82,69 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	27,08 %	39,58 %	6,25 %	20,83 %	6,25 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MUÑANA	82	70,69 %	116									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MUÑANA	70,00 %	76,00 %	67,74 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑANA	27,17 %	19,57 %	1,09 %	27,17 %	25,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
MUÑICO	28	60,87 %	46									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
MUÑICO	75,00 %	50,00 %	52,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑICO	5,26 %	5,26 %	7,89 %	7,89 %	26,32 %	47,37 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
NAVA DE LA ASUNCION	246	70,29 %	350	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				186	70,97 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				2			
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				87	74,71 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				88	62,50 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				363	70,29 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
NAVA DE LA ASUNCION	65,54 %	71,64 %	76,85 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
NAVA DE LA ASUNCION	20,00 %	1,02 %	17,97 %	3,05 %	3,05 %	32,88 %	22,03 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
OLMEDO	133	61,29 %	217									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
OLMEDO	50,91 %	63,89 %	75,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	52,41 %	11,03 %	2,07 %	4,14 %	15,17 %	0,69 %	14,48 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,01 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
OLVEGA	192	68,09 %	282									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
OLVEGA	62,42 %	81,25 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	33,49 %	24,53 %	1,89 %	0,94 %	29,72 %	9,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
OSORNO	109	75,69 %	144									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
OSORNO	69,23 %	83,33 %	77,42 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OSORNO	34,92 %	28,57 %	1,59 %	3,97 %	19,05 %	0,79 %	11,11 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PALENCIA RURAL	227	79,37 %	286									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PALENCIA RURAL	79,75 %	78,72 %	77,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	110	70,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	137	86,13 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	59	64,41 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	308	79,37 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PALENCIA RURAL	0,41 %	18,26 %	12,86 %	0,83 %	15,77 %	32,37 %	19,50 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PAMPLIEGA	80	76,19 %	105									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PAMPLIEGA	58,54 %	84,21 %	86,96 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	63,64 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	66	86,36 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	29	51,72 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	107	76,19 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	24,73 %	25,81 %	5,38 %	6,45 %	24,73 %	12,90 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PARADA DE MOLINO	349	63,80 %	547									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PARADA DE MOLINO	61,89 %	63,64 %	66,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	147	55,10 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	319	68,34 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	105	55,24 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	572	63,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARADA DE MOLINO	14,58 %	17,65 %	3,84 %	13,55 %	35,29 %	15,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PAREDES DE NAVA	82	64,06 %	128									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PAREDES DE NAVA	66,10 %	46,15 %	66,07 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	64	57,81 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	41	70,73 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	28	64,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	134	64,06 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	19,79 %	19,79 %	2,08 %	9,38 %	21,88 %	27,08 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PARQUESOL	525	65,30 %	804									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PARQUESOL	61,68 %	66,51 %	71,34 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	266	63,91 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	395	70,63 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	166	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	832	65,30 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PARQUESOL	17,50 %	14,00 %	1,17 %	4,00 %	0,17 %	43,17 %	0,17 %	19,67 %	0,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,04 %


Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.

2025-10

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDIATRIA DE AREA ESTE			1
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			1



total de los diagnosticados
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-11	
CGF AP		Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF			2
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819

% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64
PEDIATRIA DE AREA ZAMO	
TOTAL GAP	62,44 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			2

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PEDROSILLO EL RALO	83	60,14 %	138									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PEDROSILLO EL RALO	60,53 %	47,62 %	60,98 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	41	56,10 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	71	66,20 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	28	53,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	141	60,14 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	10,75 %	24,73 %	3,23 %	3,23 %	39,78 %	18,28 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PEÑAFIEL	350	76,42 %	458									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PEÑAFIEL	74,11 %	86,25 %	74,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	136	74,26 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	173	84,97 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	178	65,17 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	490	76,42 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑAFIEL	24,43 %	19,08 %	2,29 %	1,53 %	29,26 %	23,16 %	0,25 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PEÑARANDA DE BRACAMO	404	72,79 %	555									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PEÑARANDA DE BRACAMO	70,08 %	68,00 %	77,89 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	92	60,87 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	414	79,47 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	79	36,71 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	589	72,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑARANDA DE BRACAMO	22,22 %	13,89 %	10,47 %	3,63 %	1,28 %	27,78 %	20,73 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

PERIURBANA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PERIURBANA NORTE	400	60,98 %	656									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PERIURBANA NORTE	57,42 %	72,73 %	62,99 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	176	68,18 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	36,36 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	322	61,18 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	168	51,79 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	677	60,98 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA NORTE	10,33 %	18,24 %	0,22 %	8,57 %	3,74 %	0,22 %	37,58 %	0,22 %	20,88 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PERIURBANA SUR	322	72,04 %	447									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PERIURBANA SUR	68,25 %	71,05 %	81,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	130	71,54 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	237	74,68 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	98	59,18 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	467	72,04 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA SUR	23,94 %	21,69 %	6,20 %	0,85 %	0,28 %	38,87 %	0,28 %	7,89 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PIEDRAHITA	95	65,97 %	144									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PIEDRAHITA	57,14 %	61,11 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	57	61,40 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	70	75,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	39,13 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	151	65,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIEDRAHITA	20,00 %	31,43 %	4,76 %	1,90 %	18,10 %	23,81 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PILARICA	291	51,78 %	562									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PILARICA	47,54 %	45,83 %	59,61 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	32,31 %	0,31 %	21,54 %	2,77 %	4,31 %	24,00 %	14,77 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PINARES-COVALEDA	159	74,30 %	214									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PINARES-COVALEDA	66,67 %	70,59 %	80,20 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	90	71,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	25	68,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	106	76,42 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	222	74,30 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINARES-COVALEDA	33,68 %	7,37 %	11,58 %	5,79 %	31,58 %	10,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PINTOR OLIVA	403	57,99 %	695									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PINTOR OLIVA	56,98 %	57,03 %	59,63 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	304	59,54 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	194	61,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	232	46,98 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	735	57,99 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	0,22 %	14,29 %	0,45 %	21,88 %	0,22 %	4,69 %	8,93 %	23,44 %	0,45 %	25,45 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PISUERGA	274	60,22 %	455									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PISUERGA	55,44 %	61,25 %	72,34 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	176	60,80 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	177	69,49 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	120	40,83 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	475	60,22 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	27,69 %	30,29 %	1,95 %	4,89 %	18,24 %	16,94 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PIZARRALES	188	66,67 %	282									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PIZARRALES	66,88 %	68,42 %	63,38 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	94	67,02 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	91	65,93 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	102	62,75 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	289	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIZARRALES	7,98 %	31,92 %	6,10 %	10,80 %	30,99 %	12,21 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PLAZA DEL EJERCITO	422	61,70 %	684									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PLAZA DEL EJERCITO	57,36 %	61,48 %	67,24 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	277	56,32 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	348	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	87	47,13 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	717	61,70 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PLAZA DEL EJERCITO	33,75 %	0,21 %	14,70 %	3,31 %	2,90 %	30,64 %	14,49 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PONFERRADA I	585	63,73 %	918									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PONFERRADA I	61,36 %	63,27 %	66,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	305	67,87 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	212	70,28 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	439	54,21 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	961	63,73 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA I	12,56 %	26,32 %	0,30 %	11,35 %	1,82 %	0,15 %	22,84 %	24,66 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PONFERRADA II	384	58,27 %	659									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PONFERRADA II	55,18 %	64,24 %	57,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	266	57,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	155	65,81 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	263	50,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	685	58,27 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA II	14,39 %	23,82 %	0,24 %	5,66 %	1,18 %	27,12 %	27,59 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PONFERRADA III	408	68,34 %	597									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PONFERRADA III	66,47 %	66,97 %	72,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	187	69,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	284	75,70 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	152	46,71 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	625	68,34 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA III	20,26 %	27,67 %	6,10 %	1,09 %	18,30 %	26,58 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PONFERRADA IV	321	64,46 %	498									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PONFERRADA IV	58,67 %	62,22 %	75,71 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	163	66,26 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	193	72,54 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	178	48,88 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	536	64,46 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA IV	7,84 %	28,38 %	4,32 %	1,08 %	28,38 %	30,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PORILLO	277	63,53 %	436									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PORILLO	59,28 %	60,00 %	71,15 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	103	59,22 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	207	75,85 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	138	47,10 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	449	63,53 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PORILLO	22,43 %	28,66 %	6,85 %	5,30 %	0,31 %	19,00 %	17,45 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
PUEBLA DE SANABRIA	114	63,33 %	180	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				84	58,33 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				1	100,00 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				29	82,76 %		
PUEBLA DE SANABRIA	62,20 %	57,89 %	67,21 %	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				75	54,67 %		
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %		TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				189	63,33 %		

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	0,77 %	20,77 %	23,08 %	3,85 %	0,77 %	33,85 %	16,92 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PUENTE DOMINGO FLOREZ	80	57,97 %	138									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PUENTE DOMINGO FLOREZ	54,24 %	55,56 %	63,64 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	20,43 %	31,18 %	2,15 %	8,60 %	37,63 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
PUERTA NUEVA	311	59,58 %	522									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
PUERTA NUEVA	58,84 %	65,06 %	58,14 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	157	59,87 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	247	67,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	132	39,39 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	540	59,58 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PUERTA NUEVA	26,32 %	0,29 %	17,25 %	4,39 %	2,92 %	32,46 %	16,08 %	0,29 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
QUINTANAR DE LA SIERRA	119	74,84 %	159									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
QUINTANAR DE LA SIERRA	63,93 %	80,00 %	81,08 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	10,14 %	21,62 %	5,41 %	16,22 %	30,41 %	16,22 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RIAÑO	67	75,28 %	89									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RIAÑO	71,43 %	83,33 %	73,33 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	55	87,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	12	83,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	26	42,31 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	94	75,28 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAÑO	12,35 %	9,88 %	11,11 %	2,47 %	32,10 %	32,10 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RIAZA	213	79,48 %	268									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RIAZA	73,98 %	81,40 %	82,86 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	87	64,37 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	128	82,81 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	71	78,87 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	287	79,48 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	27,46 %	30,33 %	0,41 %	1,64 %	1,64 %	0,82 %	21,72 %	0,41 %	15,57 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RIBERA DEL ESLA	126	77,30 %	163									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RIBERA DEL ESLA	70,77 %	86,49 %	79,03 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ESLA	25,00 %	20,27 %	6,76 %	3,38 %	22,97 %	21,62 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RIBERA DEL ORBIGO	472	64,92 %	727									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RIBERA DEL ORBIGO	66,45 %	59,03 %	65,83 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	213	61,03 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	166	67,47 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	372	62,10 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	759	64,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ORBIGO	32,15 %	0,93 %	18,32 %	2,62 %	3,55 %	0,19 %	23,93 %	0,19 %	18,13 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ROA	234	76,22 %	307									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ROA	68,03 %	80,43 %	84,35 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	27,99 %	38,06 %	1,49 %	5,60 %	12,31 %	14,55 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ROBLEDA	104	79,39 %	131									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ROBLEDA	82,50 %	73,33 %	76,56 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROBLEDA	21,37 %	15,38 %	1,71 %	11,11 %	0,85 %	27,35 %	22,22 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RONDILLA I	227	68,79 %	330									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RONDILLA I	65,87 %	75,93 %	69,09 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	107	65,42 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	130	74,62 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	101	62,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	340	68,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA I	22,92 %	18,58 %	3,56 %	8,70 %	0,40 %	27,67 %	0,40 %	17,79 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
RONDILLA II	366	68,67 %	533									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
RONDILLA II	66,54 %	58,82 %	74,48 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	152	71,05 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	326	72,09 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	76	43,42 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	557	68,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA II	27,94 %	22,06 %	3,19 %	5,88 %	0,25 %	25,00 %	15,69 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis								
SACRAMENIA	22	75,86 %	29								
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819								
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75								
SACRAMENIA	85,71 %	60,00 %	76,47 %								
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %								

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SACRAMENIA	20,00 %	44,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	24,00 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAHAGUN	323	81,57 %	396									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAHAGUN	81,56 %	79,27 %	81,88 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	85	65,88 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	237	88,19 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	105	72,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	428	81,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	11,17 %	15,32 %	1,30 %	3,64 %	0,26 %	29,09 %	39,22 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

SALAS DE LOS INFANTES
Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SALAS DE LOS INFANTES	119	82,07 %	145									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SALAS DE LOS INFANTES	77,59 %	85,19 %	85,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	36	63,89 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	90	90,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	73,91 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	150	82,07 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALAS DE LOS INFANTES	15,49 %	15,49 %	14,08 %	8,45 %	28,87 %	17,61 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SALDAÑA	182	61,28 %	297									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SALDAÑA	53,00 %	61,82 %	66,90 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	84	53,57 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	112	72,32 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	126	49,21 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	323	61,28 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SALDAÑA	34,30 %	21,26 %	0,97 %	0,97 %	23,19 %	18,84 %	0,48 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN AGUSTIN	599	72,78 %	823									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN AGUSTIN	69,33 %	77,50 %	75,93 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	242	64,05 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	474	77,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	123	67,48 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	842	72,78 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN AGUSTIN	21,39 %	1,03 %	19,17 %	0,88 %	12,54 %	0,15 %	34,22 %	10,62 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN ANDRES DEL RABANE	503	65,75 %	765									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN ANDRES DEL RABANE	66,25 %	60,26 %	67,91 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	100,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	261	59,39 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	294	71,09 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	227	62,11 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	784	65,75 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABANE	16,22 %	0,53 %	21,39 %	4,99 %	6,60 %	0,71 %	28,34 %	21,21 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP												
	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	152	71,70 %	212									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	68,89 %	66,67 %	77,11 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	76	71,05 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	46	80,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	93	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	216	71,70 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	25,14 %	20,00 %	12,00 %	2,29 %	0,57 %	25,14 %	14,86 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN ILDEFONSO	217	76,14 %	285									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN ILDEFONSO	65,35 %	78,72 %	87,39 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	113	76,99 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	104	81,73 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	82	56,10 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	311	76,14 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ILDEFONSO	27,72 %	22,85 %	10,49 %	5,99 %	0,75 %	18,73 %	13,48 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN JOSE	222	64,91 %	342									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN JOSE	59,78 %	65,79 %	73,03 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	78	41,03 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	125	76,80 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	152	64,47 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	359	64,91 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	25,70 %	14,46 %	2,41 %	9,24 %	0,40 %	22,49 %	25,30 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN JUAN	268	68,89 %	389									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN JUAN	58,72 %	79,73 %	75,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	119	65,55 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	175	73,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	102	63,73 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	401	68,89 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JUAN	14,52 %	17,10 %	6,45 %	10,97 %	31,61 %	19,03 %	0,32 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN LEONARDO DE YAGUE	154	70,64 %	218									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN LEONARDO DE YAGUE	66,67 %	65,38 %	77,65 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGUE	25,81 %	0,54 %	13,44 %	8,60 %	20,43 %	31,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN PABLO	286	72,04 %	397									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN PABLO	65,44 %	73,53 %	76,17 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	157	71,97 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	154	75,32 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	98	62,24 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	410	72,04 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	22,74 %	25,86 %	0,62 %	8,41 %	23,05 %	19,31 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN PEDRO DEL ARROYO	100	70,42 %	142									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN PEDRO DEL ARROYO	66,67 %	68,97 %	74,07 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO DEL ARROYO	45,87 %	8,26 %	3,67 %	0,92 %	23,85 %	17,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAN PEDRO MANRIQUE	29	60,42 %	48									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAN PEDRO MANRIQUE	44,00 %	66,67 %	85,71 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	57,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	35	65,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	53	60,42 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO MANRIQUE	8,57 %	14,29 %	20,00 %	11,43 %	34,29 %	11,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SANTA CLARA	369	68,08 %	542									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SANTA CLARA	67,14 %	62,20 %	72,46 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	180	68,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	228	68,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	151	62,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	562	68,08 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA CLARA	13,83 %	18,69 %	4,85 %	17,23 %	0,24 %	30,34 %	14,81 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SANTA ELENA	240	60,91 %	394									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SANTA ELENA	52,58 %	72,94 %	69,70 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA ELENA	33,83 %	19,17 %	4,89 %	7,89 %	0,38 %	25,19 %	8,65 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SANTA MARIA	357	73,76 %	484									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SANTA MARIA	70,49 %	85,19 %	70,62 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	177	73,45 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	44	81,82 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	281	69,75 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	508	73,76 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARIA	12,38 %	0,24 %	16,75 %	6,55 %	6,55 %	0,24 %	29,85 %	0,24 %	27,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,01 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SANTA MARTA	429	69,87 %	614									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SANTA MARTA	66,06 %	66,67 %	77,84 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	199	67,84 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	209	74,16 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	230	63,91 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	641	69,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANÓ	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA MARTA	13,05 %	19,58 %	5,47 %	4,84 %	0,21 %	41,68 %	14,74 %	0,21 %	0,21 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SAYAGO	165	66,53 %	248									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SAYAGO	51,16 %	76,47 %	72,17 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	68	61,76 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	134	66,42 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	53	67,92 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	257	66,53 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAYAGO	21,76 %	26,94 %	4,66 %	2,07 %	1,04 %	25,91 %	17,62 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEDANO	15	75,00 %	20									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEDANO	78,57 %	75,00 %	50,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEDANO	5,88 %	11,76 %	41,18 %	41,18 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEGOVIA I	328	68,48 %	479									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEGOVIA I	62,77 %	72,73 %	72,55 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	246	65,85 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	83	74,70 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	166	64,46 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	497	68,48 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	37,33 %	13,65 %	3,62 %	3,62 %	0,28 %	27,02 %	0,56 %	13,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEGOVIA II	371	70,80 %	524									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEGOVIA II	68,79 %	73,21 %	73,28 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	275	67,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	62,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	109	75,23 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	172	66,28 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	564	70,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA II	24,19 %	15,81 %	3,02 %	2,33 %	6,51 %	32,33 %	15,81 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEGOVIA III	199	68,86 %	289									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEGOVIA III	67,12 %	59,68 %	77,11 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	97	67,01 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	90	75,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	104	63,46 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	297	68,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA III	37,10 %	14,93 %	1,36 %	2,71 %	0,45 %	23,53 %	19,91 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEGOVIA RURAL	484	73,56 %	658									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEGOVIA RURAL	68,77 %	67,33 %	83,19 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	168	60,71 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	323	85,76 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	188	59,04 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	681	73,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA RURAL	20,63 %	27,14 %	3,53 %	3,72 %	0,37 %	28,25 %	0,37 %	15,80 %	0,19 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SEPULVEDA	112	76,19 %	147									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SEPULVEDA	67,47 %	84,21 %	86,96 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	60	78,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	46	80,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	53	62,26 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	160	76,19 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	25,78 %	32,81 %	1,56 %	1,56 %	17,19 %	21,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SERRADA	126	43,60 %	289									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SERRADA	32,24 %	49,06 %	60,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	121	47,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	115	29,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	62	58,06 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	301	43,60 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SERRADA	19,15 %	14,18 %	0,71 %	11,35 %	5,67 %	1,42 %	20,57 %	26,24 %	0,71 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SORIA NORTE	557	65,38 %	852									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SORIA NORTE	59,47 %	70,91 %	69,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	259	66,41 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	468	70,73 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	170	42,35 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	901	65,38 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	32,18 %	18,45 %	0,16 %	7,10 %	3,63 %	0,16 %	22,71 %	15,62 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SORIA RURAL	360	58,63 %	614									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SORIA RURAL	55,20 %	53,33 %	67,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	120	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	60,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	399	53,13 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	134	61,19 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	658	58,63 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	29,41 %	0,25 %	15,44 %	0,25 %	14,46 %	2,45 %	0,74 %	21,08 %	15,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SORIA SUR	367	61,47 %	597									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SORIA SUR	60,54 %	58,12 %	64,71 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	203	65,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	246	68,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	169	42,60 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	627	61,47 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA SUR	29,10 %	0,49 %	16,87 %	8,56 %	2,93 %	0,24 %	16,14 %	25,67 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SORIA TARDE	112	75,68 %	148									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SORIA TARDE	76,38 %	63,64 %	80,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	19	63,16 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	116	80,17 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	14	42,86 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	150	75,68 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA TARDE	47,11 %	14,05 %	10,74 %	0,83 %	21,49 %	4,96 %	0,83 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SOTILLO DE LA ADRADA	325	65,92 %	493									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SOTILLO DE LA ADRADA	65,49 %	57,30 %	69,48 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	263	63,50 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	10	70,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	113	71,68 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	132	61,36 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	518	65,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	15,14 %	15,95 %	5,14 %	4,05 %	1,08 %	33,51 %	25,14 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
SUR	298	56,55 %	527									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
SUR	51,50 %	56,38 %	67,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	1	100,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	209	55,98 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	206	66,02 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	117	38,46 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	538	56,55 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	32,30 %	1,86 %	15,53 %	1,86 %	5,28 %	0,31 %	23,29 %	0,31 %	19,25 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,01 %	19,35 %

TABARA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
TABARA	175	80,28 %	218	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				42	71,43 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				108	86,11 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				78	69,23 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				228	80,28 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TABARA	87,50 %	78,95 %	74,51 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TABARA	17,77 %	7,11 %	0,51 %	12,18 %	2,54 %	31,47 %	28,43 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TAMAMES	78	75,00 %	104									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TAMAMES	70,83 %	70,59 %	77,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TAMAMES	8,14 %	38,37 %	2,33 %	1,16 %	26,74 %	23,26 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TEJARES	124	54,39 %	228									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TEJARES	50,81 %	57,58 %	56,76 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	81	39,51 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	54	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	103	55,34 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	241	54,39 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TEJARES	16,56 %	17,20 %	1,91 %	16,56 %	28,66 %	19,11 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TORDESILLAS	268	64,11 %	418									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TORDESILLAS	61,81 %	62,92 %	65,22 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	129	61,24 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	83,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	176	64,20 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	130	58,46 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	441	64,11 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	16,44 %	18,84 %	2,05 %	1,37 %	0,34 %	23,63 %	37,33 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TORENO	134	64,11 %	209									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TORENO	51,09 %	75,00 %	73,24 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORENO	31,13 %	34,44 %	6,62 %	1,32 %	15,89 %	0,66 %	9,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TORO	364	66,79 %	545									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TORO	61,26 %	74,77 %	68,98 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	138	53,62 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	79	77,22 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	345	68,99 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	563	66,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORO	11,29 %	28,71 %	7,06 %	6,59 %	18,59 %	27,76 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TORQUEMADA	82	62,12 %	132									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TORQUEMADA	60,87 %	70,37 %	56,76 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORQUEMADA	42,70 %	20,22 %	4,49 %	16,85 %	11,24 %	4,49 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TORTOLA	289	63,10 %	458									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TORTOLA	61,40 %	68,25 %	63,10 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	198	63,13 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	174	69,54 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	107	47,66 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	480	63,10 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	39,50 %	15,99 %	5,96 %	3,13 %	25,08 %	10,34 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TROBAJO DEL CAMINO - VA	556	68,73 %	809									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TROBAJO DEL CAMINO - VA	68,31 %	72,11 %	65,61 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	215	64,19 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	445	74,83 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	177	55,93 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	839	68,73 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TROBAJO DEL CAMINO - VA	17,01 %	19,10 %	5,14 %	5,30 %	0,16 %	32,74 %	20,39 %	0,16 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
TUDELA	345	61,83 %	558									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
TUDELA	51,88 %	60,22 %	78,74 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	202	61,88 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	228	53,51 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	155	70,32 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	588	61,83 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TUDELA	23,29 %	0,25 %	21,27 %	1,77 %	5,32 %	0,25 %	24,30 %	0,25 %	23,29 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
UNIVERSIDAD CENTRO	159	68,24 %	233									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
UNIVERSIDAD CENTRO	71,05 %	70,21 %	64,60 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	63	68,25 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	124	76,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	49	44,90 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	240	68,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
UNIVERSIDAD CENTRO	22,65 %	14,92 %	4,97 %	7,18 %	0,55 %	36,46 %	13,26 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALDERAS	122	70,93 %	172									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALDERAS	67,61 %	66,67 %	75,68 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALDERAS	15,94 %	0,72 %	13,77 %	8,70 %	7,25 %	17,39 %	36,23 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALENCIA DE DON JUAN	407	77,97 %	522									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALENCIA DE DON JUAN	77,33 %	69,41 %	82,38 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	141	71,63 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	145	82,76 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	263	74,52 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	554	77,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
VALENCIA DE DON JUAN	13,89 %	12,84 %	5,68 %	3,16 %	0,42 %	30,95 %	0,21 %	32,63 %	0,21 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	0,05 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLADOLID RURAL I	154	60,87 %	253									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLADOLID RURAL I	54,11 %	72,22 %	65,45 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	80	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	85	61,18 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	95	66,32 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	261	60,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL I	0,59 %	30,00 %	23,53 %	2,35 %	2,94 %	0,59 %	17,06 %	22,94 %
TOTAL GAP	0,02 %	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLADOLID RURAL II	98	48,51 %	202									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLADOLID RURAL II	43,80 %	45,16 %	60,78 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	102	38,24 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	29	62,07 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	76	56,58 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	208	48,51 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
VALLADOLID RURAL II	18,52 %	13,89 %	1,85 %	1,85 %	0,93 %	36,11 %	25,93 %	0,93 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLE DE LOSA	13	68,42 %	19									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLE DE LOSA	60,00 %	100,00 %	71,43 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE LOSA	57,14 %	14,29 %	21,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLE DE MENA	129	72,07 %	179									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLE DE MENA	70,89 %	74,29 %	71,21 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE MENA	6,99 %	39,16 %	0,70 %	9,79 %	16,78 %	26,57 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLE DE TOBALINA	19	26,76 %	71									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLE DE TOBALINA	17,65 %	30,77 %	37,50 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE TOBALINA	5,26 %	26,32 %	52,63 %	15,79 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VALLE DE VALDEBEZANA	37	80,43 %	46									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VALLE DE VALDEBEZANA	75,00 %	100,00 %	79,17 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	23	82,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	21	71,43 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		47	80,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE VALDEBEZANA	14,29 %	40,48 %	9,52 %	11,90 %	14,29 %	9,52 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

VENTA DE BAÑOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VENTA DE BAÑOS	343	59,24 %	579									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VENTA DE BAÑOS	57,09 %	56,72 %	63,91 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	229	55,46 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	294	65,99 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	100	38,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	625	59,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	23,66 %	18,54 %	0,24 %	2,20 %	5,37 %	0,73 %	26,10 %	23,17 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VIDRIALES	80	81,63 %	98									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VIDRIALES	76,92 %	84,21 %	83,02 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIDRIALES	14,89 %	30,85 %	9,57 %	2,13 %	21,28 %	21,28 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLABLINO	247	57,31 %	431									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLABLINO	56,82 %	57,94 %	58,10 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	105	40,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	117	61,54 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	225	61,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	449	57,31 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLABLINO	16,00 %	0,36 %	17,09 %	6,18 %	0,36 %	18,91 %	40,73 %	0,36 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLACASTIN	62	60,19 %	103									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLACASTIN	54,39 %	70,59 %	64,52 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLACASTIN	34,85 %	10,61 %	10,61 %	6,06 %	21,21 %	16,67 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLADA	93	81,58 %	114									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLADA	72,97 %	62,50 %	94,44 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	36	69,44 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	83	84,34 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	124	81,58 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	16,67 %	19,44 %	22,22 %	2,78 %	5,56 %	33,33 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLADIEGO	76	72,38 %	105									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLADIEGO	75,56 %	79,17 %	63,89 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	25	72,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	53	73,58 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	28	71,43 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	108	72,38 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADIEGO	24,14 %	11,49 %	17,24 %	31,03 %	16,09 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLAFRANCA	183	63,99 %	286									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLAFRANCA	60,00 %	59,32 %	72,12 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLAFRANCA	9,36 %	24,63 %	2,96 %	0,99 %	17,24 %	44,33 %	0,49 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %	0,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
VILLAFRECHOS	103	72,03 %	143	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				60	86,67 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				46	52,17 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				43	65,12 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				149	72,03 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLAFRECHOS	66,67 %	72,41 %	80,49 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRECHOS	33,33 %	10,83 %	7,50 %	2,50 %	29,17 %	16,67 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLALON DE CAMPOS	104	68,87 %	151									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLALON DE CAMPOS	58,62 %	73,81 %	70,91 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALON DE CAMPOS	27,73 %	26,05 %	5,88 %	1,68 %	13,45 %	25,21 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLALPANDO	153	66,23 %	231									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLALPANDO	53,33 %	72,50 %	69,17 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	65	63,08 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	92	60,87 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	83	68,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	242	66,23 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALPANDO	13,33 %	15,76 %	3,64 %	1,82 %	22,42 %	43,03 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
VILLAMURIEL	137	62,27 %	220	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				84	69,05 %		
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				56	76,79 %		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				86	41,86 %		
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				226	62,27 %		
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLAMURIEL	60,99 %	58,70 %	67,57 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAMURIEL	20,81 %	10,74 %	2,01 %	6,04 %	36,91 %	23,49 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLARCAYO	93	60,39 %	154									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLARCAYO	53,95 %	63,16 %	67,80 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	65	60,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	41	75,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	56	44,64 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	163	60,39 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARCAYO	21,21 %	1,01 %	30,30 %	6,06 %	15,15 %	26,26 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLARRAMIEL	68	61,26 %	111									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLARRAMIEL	57,50 %	77,27 %	58,00 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARRAMIEL	22,08 %	16,88 %	3,90 %	33,77 %	23,38 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VILLORIA	184	72,16 %	255									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VILLORIA	73,95 %	58,70 %	76,67 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	61	65,57 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	92	82,61 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	111	63,06 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	268	72,16 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLORIA	22,64 %	11,32 %	19,34 %	2,83 %	0,94 %	28,77 %	14,15 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VIRGEN CONCHA	512	64,40 %	795									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VIRGEN CONCHA	65,01 %	57,74 %	66,79 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	214	54,21 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	525	66,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	93	60,22 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	835	64,40 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIRGEN CONCHA	27,57 %	0,35 %	17,28 %	0,17 %	2,09 %	2,44 %	0,17 %	32,11 %	17,80 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
VITIGUDINO	193	72,56 %	266									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
VITIGUDINO	67,74 %	69,84 %	77,48 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	84	67,86 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	128	77,34 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	68	58,82 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	282	72,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VITIGUDINO	9,91 %	26,13 %	1,35 %	8,56 %	33,33 %	20,72 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ZAMORA NORTE	404	78,45 %	515									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ZAMORA NORTE	70,56 %	81,61 %	82,07 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.1	J20.1 Bronquitis aguda por Haemophilus influenzae	2	50,00 %
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	181	80,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	249	80,32 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	110	69,09 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	543	78,45 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA NORTE	14,59 %	18,82 %	0,21 %	17,55 %	4,23 %	20,51 %	24,10 %
TOTAL GAP	22,17 %	19,43 %	0,05 %	5,39 %	5,57 %	27,40 %	19,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis									
ZAMORA SUR	324	55,86 %	580									
TOTAL GAP	61.104	65,98 %	92.819									
% de Pacientes con J01 por Grupo de Edad	14 a 64	65 a74	= o+75									
ZAMORA SUR	49,35 %	64,36 %	61,02 %									
TOTAL GAP	62,44 %	66,13 %	70,48 %									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	133	62,41 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	393	56,49 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	79	37,97 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	606	55,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA SUR	24,01 %	0,26 %	15,57 %	9,76 %	2,90 %	0,53 %	22,96 %	24,01 %
TOTAL GAP	22,17 %	0,14 %	19,43 %	5,39 %	5,57 %	0,26 %	27,40 %	19,35 %