

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|---------|
| Gerencia AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo | Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | | | | | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 | |
| GAP ÁVILA | 1.720 | 68,55 % | 2.509 | J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | | | | | 8.168 | 40,55 % | |
| GAP BURGOS | 3.789 | 64,04 % | 5.917 | J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | | | | | 12.403 | 82,88 % | |
| GAP LEÓN | 2.645 | 58,71 % | 4.505 | J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | | | | | 699 | 16,74 % | |
| GAP EL BIERZO | 1.124 | 71,55 % | 1.571 | J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | | | | | 19.451 | 54,52 % | |
| GAP PALENCIA | 2.229 | 71,56 % | 3.115 | J36 | J36 Absceso periamigdalino | | | | | 17 | 76,47 % | |
| GAP SALAMANCA | 2.496 | 60,06 % | 4.156 | TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | 40.738 | 62,31 % | | | | | | |
| GAP SEGOVIA | 1.349 | 61,10 % | 2.208 | Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | | 0 a 13 | | | | | | |
| GAP SORIA | 960 | 64,73 % | 1.483 | GAP ÁVILA | 68,55 % | | | | | | | |
| GAP VALLADOLID OESTE | 2.750 | 56,15 % | 4.898 | GAP BURGOS | 64,04 % | | | | | | | |
| GAP VALLADOLID ESTE | 2.666 | 60,43 % | 4.412 | GAP LEÓN | 58,71 % | | | | | | | |
| GAP ZAMORA | 1.444 | 59,23 % | 2.438 | GAP EL BIERZO | 71,55 % | | | | | | | |
| TOTAL GRS | 23.172 | 62,31 % | 37.212 | GAP PALENCIA | 71,56 % | | | | | | | |
| | | | | GAP SALAMANCA | 60,06 % | | | | | | | |
| | | | | GAP SEGOVIA | 61,10 % | | | | | | | |
| | | | | GAP SORIA | 64,73 % | | | | | | | |
| | | | | GAP VALLADOLID OESTE | 56,15 % | | | | | | | |
| | | | | GAP VALLADOLID ESTE | 60,43 % | | | | | | | |
| | | | | GAP ZAMORA | 59,23 % | | | | | | | |
| | | | | TOTAL GRS | 62,31 % | | | | | | | |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| GAP ÁVILA | 59,08 % | 13,17 % | 11,59 % | 0,16 % | 0,52 % | 2,89 % | | 12,54 % | 0,05 % | |
| GAP BURGOS | 54,32 % | 26,55 % | 8,19 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,34 % | | 10,39 % | 0,02 % | |
| GAP LEÓN | 59,56 % | 19,39 % | 8,28 % | 0,10 % | 0,79 % | 0,93 % | 0,07 % | 10,77 % | 0,07 % | 0,03 % |
| GAP EL BIERZO | 61,56 % | 5,35 % | 14,11 % | | 1,30 % | 2,76 % | | 14,84 % | | 0,08 % |
| GAP PALENCIA | 44,00 % | 34,33 % | 6,19 % | 0,08 % | 0,27 % | 0,63 % | | 14,46 % | 0,04 % | |
| GAP SALAMANCA | 70,67 % | 10,27 % | 9,25 % | 0,15 % | 0,45 % | 0,23 % | | 8,99 % | | |
| GAP SEGOVIA | 71,51 % | 6,22 % | 10,54 % | | 0,35 % | 0,49 % | 1,40 % | 9,50 % | | |
| GAP SORIA | 64,93 % | 9,29 % | 11,00 % | 0,09 % | 0,19 % | 1,33 % | | 13,18 % | | |
| GAP VALLADOLID OESTE | 46,97 % | 43,07 % | 4,20 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,03 % | 5,21 % | 0,07 % | 0,03 % |
| GAP VALLADOLID ESTE | 56,25 % | 29,67 % | 5,56 % | 0,03 % | 0,21 % | 0,14 % | | 8,10 % | 0,03 % | |
| GAP ZAMORA | 66,94 % | 6,85 % | 11,46 % | 0,12 % | 1,25 % | 0,44 % | 0,19 % | 12,70 % | 0,06 % | |
| TOTAL GRS | 57,86 % | 21,96 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,74 % | 0,10 % | 10,42 % | 0,04 % | 0,01 % |

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AGREDA | 73 | 85,88 % | 85 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 86 | 68,80 % | 125 |
| ALBA DE TORMES | 89 | 66,92 % | 133 |
| ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 20 | 83,33 % | 24 |
| ALISTE | 51 | 78,46 % | 65 |
| ALMAZAN | 71 | 42,01 % | 169 |
| ALTA SANABRIA | 3 | 60,00 % | 5 |
| ANTONIO GUTIERREZ | 230 | 49,36 % | 466 |
| ARANDA NORTE | 284 | 70,12 % | 405 |
| ARANDA RURAL | 116 | 72,96 % | 159 |
| ARANDA SUR | 274 | 64,32 % | 426 |
| ARCOS DE JALON | 43 | 68,25 % | 63 |
| ARENAS DE SAN PEDRO | 171 | 85,93 % | 199 |
| AREVALO | 173 | 57,67 % | 300 |
| ARMUNIA | 81 | 57,04 % | 142 |
| ARTURO EYRIES | 87 | 32,58 % | 267 |
| ASTORGA I | 81 | 66,39 % | 122 |
| ASTORGA II | 95 | 67,86 % | 140 |
| AVILA ESTACION | 137 | 56,38 % | 243 |
| AVILA NORTE | 87 | 66,41 % | 131 |
| AVILA RURAL | 74 | 77,89 % | 95 |
| AVILA SUR ESTE | 202 | 64,95 % | 311 |
| AVILA SUR OESTE | 94 | 68,61 % | 137 |
| BABIA | 8 | 100,00 % | 8 |
| BALTANAS | 48 | 85,71 % | 56 |
| BAÑEZA I | 149 | 69,30 % | 215 |
| BAÑEZA II | 126 | 64,62 % | 195 |
| BARCO DE AVILA | 66 | 84,62 % | 78 |
| BARRIO ESPAÑA | 34 | 53,97 % | 63 |
| BEJAR | 113 | 60,11 % | 188 |
| BELORADO | 45 | 73,77 % | 61 |
| BEMBIBRE | 102 | 67,11 % | 152 |
| BENAVENTE NORTE | 143 | 72,96 % | 196 |
| BENAVENTE SUR | 135 | 74,18 % | 182 |
| BERLANGA DE DUERO | 11 | 84,62 % | 13 |
| BOÑAR | 16 | 80,00 % | 20 |
| BRIVIESCA | 68 | 59,65 % | 114 |
| BURGO DE OSMA | 83 | 76,15 % | 109 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8.168 | 40,55 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12.403 | 82,88 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 699 | 16,74 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 19.451 | 54,52 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 17 | 76,47 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 40.738 |
| | | | 62,31 % |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------|-----|
| BURGOHONDO | 70 | 68,63 % | 102 |
| BURGOS RURAL NORTE | 95 | 61,29 % | 155 |
| BURGOS RURAL SUR | 149 | 74,87 % | 199 |
| CACABELOS | 119 | 77,78 % | 153 |
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 25 | 75,76 % | 33 |
| CAMARZANA DE TERA | 23 | 69,70 % | 33 |
| CAMPOS LAMPREANA | 14 | 56,00 % | 25 |
| CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS | 29 | 60,42 % | 48 |
| CANDELEDA | 116 | 83,45 % | 139 |
| CANTALAPIEDRA | 15 | 78,95 % | 19 |
| CANTALEJO | 51 | 62,20 % | 82 |
| CANTERAC | 82 | 40,80 % | 201 |
| CAPUCHINOS | 59 | 56,73 % | 104 |
| CARBAJALES DE ALBA | 9 | 81,82 % | 11 |
| CARBALLEDA | 22 | 91,67 % | 24 |
| CARBONERO | 70 | 55,56 % | 126 |
| CARRION DE LOS CONDES | 47 | 67,14 % | 70 |
| CASA DEL BARCO | 25 | 75,76 % | 33 |
| CEBREROS | 155 | 73,81 % | 210 |
| CENTRO-GAMAZO | 65 | 69,89 % | 93 |
| CERVERA DE PISUERGA | 38 | 63,33 % | 60 |
| CIGALES | 102 | 77,86 % | 131 |
| CIRCULAR | 110 | 69,62 % | 158 |
| CIRCUNVALACION | 264 | 56,65 % | 466 |
| CISTIERTNA | 2 | 100,00 % | 2 |
| CIUDAD RODRIGO | 209 | 72,32 % | 289 |
| CONDADO DE TREVIÑO | 17 | 65,38 % | 26 |
| CONDESA | 54 | 45,00 % | 120 |
| CORRALES | 22 | 75,86 % | 29 |
| CRISTOBAL ACOSTA | 177 | 54,29 % | 326 |
| CRUCERO | 132 | 39,29 % | 336 |
| CUELLAR | 86 | 52,44 % | 164 |
| CUENCA DEL BERNESGA | 57 | 79,17 % | 72 |
| DELICIAS I | 460 | 77,31 % | 595 |
| DELICIAS II | 321 | 55,92 % | 574 |
| EL EJIDO | 146 | 55,73 % | 262 |
| EL ESPINAR | 61 | 62,24 % | 98 |
| ERAS DEL BOSQUE | 521 | 83,76 % | 622 |
| ESGUEVILLAS | 4 | 40,00 % | 10 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 22 | 78,57 % | 28 |
| FABERO | 24 | 63,16 % | 38 |
| FONTIVEROS | 16 | 64,00 % | 25 |
| FROMISTA | 25 | 58,14 % | 43 |

| | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| FUENTEGUINALDO | 11 | 91,67 % | 12 |
| FUENTESAUCO | 17 | 80,95 % | 21 |
| FUENTES DE OÑORO | 15 | 83,33 % | 18 |
| GAMONAL-ANTIGUA | 150 | 55,56 % | 270 |
| GARCIA LORCA | 74 | 53,24 % | 139 |
| GARRIDO NORTE | 55 | 62,50 % | 88 |
| GARRIDO SUR | 218 | 46,68 % | 467 |
| GOMARA | 4 | 57,14 % | 7 |
| GREDOS | 12 | 70,59 % | 17 |
| GUARDO | 149 | 83,71 % | 178 |
| GUAREÑA | 26 | 63,41 % | 41 |
| GUIJUELO | 67 | 63,81 % | 105 |
| HERRERA DE PISUERGA | 65 | 65,66 % | 99 |
| HUERTA DEL REY | 294 | 71,88 % | 409 |
| HUERTA DE REY | 27 | 69,23 % | 39 |
| IGNACIO LOPEZ SAIZ | 102 | 46,79 % | 218 |
| ISCAR | 227 | 69,42 % | 327 |
| JARDINILLOS | 172 | 60,35 % | 285 |
| JOSE AGUADO | 335 | 62,97 % | 532 |
| JOSÉ LUIS SANTAMARIA | 284 | 60,68 % | 468 |
| LA ALAMEDILLA | 99 | 53,80 % | 184 |
| LA ALBERCA | 39 | 86,67 % | 45 |
| LA CABRERA | 7 | 70,00 % | 10 |
| LA FUENTE SAN ESTEBAN | 44 | 70,97 % | 62 |
| LAGUNA DE DUERO | 206 | 55,08 % | 374 |
| LA MAGDALENA | 17 | 70,83 % | 24 |
| LANZAHITA | 27 | 54,00 % | 50 |
| LA PALOMERA | 149 | 62,08 % | 240 |
| LA PUEBLA | 212 | 63,66 % | 333 |
| LAS HUELGAS | 70 | 53,85 % | 130 |
| LA SIERRA | 7 | 46,67 % | 15 |
| LAS NAVAS DEL MARQUES | 79 | 79,00 % | 100 |
| LAS TORRES | 102 | 60,36 % | 169 |
| LA VICTORIA | 154 | 58,33 % | 264 |
| LEDESMA | 46 | 83,64 % | 55 |
| LERMA | 82 | 75,93 % | 108 |
| LINARES DE RIOFRIO | 22 | 66,67 % | 33 |
| LOS COMUNEROS | 115 | 58,38 % | 197 |
| LOS CUBOS | 182 | 62,12 % | 293 |
| LUMBRALES | 35 | 74,47 % | 47 |
| MADRIGAL ALTAS TORRES | 16 | 66,67 % | 24 |
| MAGDALENA | 17 | 35,42 % | 48 |
| MANSILLA DE LAS MULAS | 49 | 53,26 % | 92 |
| MATALLANA DE TORIO | 6 | 75,00 % | 8 |
| MATILLA DE LOS CAÑOS | 15 | 78,95 % | 19 |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------|-----|
| MAYORGA DE CAMPOS | 23 | 88,46 % | 26 |
| MEDINA DEL CAMPO RURAL | 13 | 72,22 % | 18 |
| MEDINA DEL CAMPO URBANO | 390 | 73,58 % | 530 |
| MEDINA DE POMAR | 36 | 65,45 % | 55 |
| MEDINA DE RIOSECO | 81 | 54,00 % | 150 |
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 48 | 72,73 % | 66 |
| MIGUEL ARMIJO | 103 | 57,22 % | 180 |
| MIRANDA DEL CASTAÑAR | 8 | 57,14 % | 14 |
| MIRANDA ESTE | 327 | 78,42 % | 417 |
| MIRANDA OESTE | 283 | 63,17 % | 448 |
| MOMBELTRAN | 18 | 64,29 % | 28 |
| MOTA DEL MARQUES | 8 | 61,54 % | 13 |
| MUÑANA | 23 | 88,46 % | 26 |
| MUÑICO | 5 | 100,00 % | 5 |
| NAVA DE LA ASUNCION | 140 | 65,42 % | 214 |
| OLMEDO | | | 1 |
| OLVEGA | 53 | 80,30 % | 66 |
| OSORNO | 16 | 61,54 % | 26 |
| PALENCIA RURAL | 43 | 63,24 % | 68 |
| PAMPLIEGA | 13 | 68,42 % | 19 |
| PARADA DE MOLINO | 173 | 61,57 % | 281 |
| PAREDES DE NAVA | 48 | 78,69 % | 61 |
| PARQUESOL | 241 | 56,18 % | 429 |
| PEDIATRIA DE AREA ESTE | 337 | 53,32 % | 632 |
| PEDIATRIA DE AREA LEON | 212 | 62,91 % | 337 |
| PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA | 76 | 67,26 % | 113 |
| PEDIATRIA DE AREA ZAMORA | 51 | 66,23 % | 77 |
| PEDROSILLO EL RALO | 23 | 76,67 % | 30 |
| PEÑAFIEL | 127 | 69,78 % | 182 |
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 140 | 80,46 % | 174 |
| PERIURBANA NORTE | 166 | 61,71 % | 269 |
| PERIURBANA SUR | 151 | 49,03 % | 308 |
| PIEDRAHITA | 45 | 71,43 % | 63 |
| PILARICA | 147 | 62,03 % | 237 |
| PINARES-COVALEDA | 50 | 84,75 % | 59 |
| PINTOR OLIVA | 360 | 73,92 % | 487 |
| PISUERGA | 490 | 56,45 % | 868 |
| PIZARRALES | 117 | 61,58 % | 190 |
| PLAZA DEL EJERCITO | 61 | 27,23 % | 224 |
| PONFERRADA I | 277 | 73,47 % | 377 |

| | | | |
|-------------------------|-----|----------|-----|
| PONFERRADA II | 196 | 68,06 % | 288 |
| PONFERRADA III | 113 | 70,63 % | 160 |
| PONFERRADA IV | 141 | 70,15 % | 201 |
| PORTILLO | 28 | 53,85 % | 52 |
| PUENTE DOMINGO FLOREZ | 9 | 81,82 % | 11 |
| PUERTA NUEVA | 211 | 55,38 % | 381 |
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 47 | 78,33 % | 60 |
| RIAÑO | 13 | 68,42 % | 19 |
| RIAZA | 46 | 68,66 % | 67 |
| RIBERA DEL ESLA | 15 | 75,00 % | 20 |
| RIBERA DEL ORBIGO | 149 | 47,15 % | 316 |
| ROA | 94 | 72,87 % | 129 |
| ROBLEDA | 16 | 84,21 % | 19 |
| RONDILLA I | 45 | 60,81 % | 74 |
| RONDILLA II | 65 | 61,90 % | 105 |
| SACRAMENIA | 1 | 20,00 % | 5 |
| SAHAGUN | 67 | 72,83 % | 92 |
| SALAS DE LOS INFANTES | 28 | 63,64 % | 44 |
| SALDAÑA | 100 | 80,00 % | 125 |
| SAN AGUSTIN | 208 | 54,88 % | 379 |
| SAN ANDRES DEL RABANEDO | 189 | 62,58 % | 302 |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 69 | 71,13 % | 97 |
| SAN ILDEFONSO | 1 | 50,00 % | 2 |
| SAN JOSE | 71 | 46,71 % | 152 |
| SAN JUAN | 57 | 57,58 % | 99 |
| SAN LEONARDO DE YAGUE | 62 | 72,09 % | 86 |
| SAN PABLO | 62 | 72,09 % | 86 |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | 11 | 57,89 % | 19 |
| SAN PEDRO MANRIQUE | 17 | 73,91 % | 23 |
| SANTA CLARA | 144 | 65,75 % | 219 |
| SANTA ELENA | 138 | 71,50 % | 193 |
| SANTA MARIA | 93 | 72,09 % | 129 |
| SANTA MARTA | 132 | 62,86 % | 210 |
| SAYAGO | 27 | 58,70 % | 46 |
| SEDANO | 2 | 100,00 % | 2 |
| SEGOVIA I | 214 | 65,24 % | 328 |
| SEGOVIA II | 176 | 53,33 % | 330 |
| SEGOVIA III | 149 | 55,81 % | 267 |
| SEGOVIA RURAL | 189 | 64,73 % | 292 |
| SEPULVEDA | 47 | 82,46 % | 57 |
| SERRADA | | | 1 |
| SORIA NORTE | 163 | 56,99 % | 286 |
| SORIA RURAL | 83 | 61,94 % | 134 |
| SORIA SUR | 136 | 60,71 % | 224 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|
| SORIA TARDE | 43 | 68,25 % | 63 |
| SOTILLO DE LA ADRADA | 124 | 58,77 % | 211 |
| SUR | 161 | 45,10 % | 357 |
| TABARA | 31 | 73,81 % | 42 |
| TAMAMES | 11 | 84,62 % | 13 |
| TEJARES | 134 | 44,67 % | 300 |
| TORDESILLAS | 72 | 47,06 % | 153 |
| TORENO | 19 | 73,08 % | 26 |
| TORO | 96 | 24,12 % | 398 |
| TORQUEMADA | 28 | 42,42 % | 66 |
| TORTOLA | 91 | 45,05 % | 202 |
| TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN | 63 | 63,00 % | 100 |
| TUDELA | 148 | 53,05 % | 279 |
| UNIVERSIDAD CENTRO | 69 | 77,53 % | 89 |
| VALDERAS | 43 | 58,90 % | 73 |
| VALENCIA DE DON JUAN | 64 | 53,78 % | 119 |
| VALLADOLID RURAL I | 156 | 60,00 % | 260 |
| VALLADOLID RURAL II | 155 | 45,59 % | 340 |
| VALLE DE MENA | 73 | 94,81 % | 77 |
| VALLE DE TOBALINA | 1 | 50,00 % | 2 |
| VALLE DE VALDEBEZANA | 3 | 75,00 % | 4 |
| VENTA DE BAÑOS | 137 | 64,32 % | 213 |
| VIDRIALES | 31 | 83,78 % | 37 |
| VILLABLINO | 81 | 77,14 % | 105 |
| VILLACASTIN | 20 | 66,67 % | 30 |
| VILLADA | 28 | 93,33 % | 30 |
| VILLADIEGO | 15 | 71,43 % | 21 |
| VILLAFRANCA | 43 | 68,25 % | 63 |
| VILLAFRECHOS | 25 | 67,57 % | 37 |
| VILLALON DE CAMPOS | 41 | 74,55 % | 55 |
| VILLALPANDO | 23 | 62,16 % | 37 |
| VILLAMURIEL | 103 | 64,78 % | 159 |
| VILLARCAYO | 35 | 64,81 % | 54 |
| VILLARRAMIEL | 7 | 46,67 % | 15 |
| VILLORIA | 58 | 81,69 % | 71 |
| VIRGEN CONCHA | 122 | 65,59 % | 186 |
| VITIGUDINO | 19 | 26,39 % | 72 |
| ZAMORA NORTE | 47 | 74,60 % | 63 |
| ZAMORA SUR | 48 | 53,33 % | 90 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| AGREDA | 60,24 % | 1,20 % | 25,30 % | | | 1,20 % | | 12,05 % | | |
| AGUILAR DE CAMPOO | 58,70 % | 16,30 % | 9,78 % | | | | | 15,22 % | | |
| ALBA DE TORMES | 72,00 % | 23,00 % | 4,00 % | | | | | 1,00 % | | |
| ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 46,15 % | | 42,31 % | | | | | 11,54 % | | |
| ALISTE | 71,67 % | | 13,33 % | | 1,67 % | | | 13,33 % | | |
| ALMAZAN | 60,26 % | 14,10 % | 6,41 % | | | | | 19,23 % | | |
| ALTA SANABRIA | 66,67 % | | | | | | | 33,33 % | | |
| ANTONIO GUTIERREZ | 68,05 % | 24,07 % | 2,49 % | | 0,41 % | | | 4,98 % | | |
| ARANDA NORTE | 60,82 % | 8,78 % | 10,03 % | | 0,63 % | | | 19,75 % | | |
| ARANDA RURAL | 53,97 % | 6,35 % | 7,94 % | | | | | 31,75 % | | |
| ARANDA SUR | 47,10 % | 8,39 % | 12,90 % | | | | | 31,61 % | | |
| ARCOS DE JALON | 48,15 % | | 7,41 % | | | | | 44,44 % | | |
| ARENAS DE SAN PEDRO | 56,50 % | 0,50 % | 18,50 % | | | 8,50 % | | 16,00 % | | |
| AREVALO | 42,79 % | 22,89 % | 9,45 % | | 1,00 % | | | 23,38 % | 0,50 % | |
| ARMUNIA | 61,36 % | 31,82 % | 2,27 % | | | | | 4,55 % | | |
| ARTURO EYRIES | 43,96 % | 43,96 % | 5,49 % | | 1,10 % | | | 5,49 % | | |
| ASTORGA I | 47,19 % | 16,85 % | 11,24 % | | | | | 24,72 % | | |
| ASTORGA II | 59,43 % | 4,72 % | 15,09 % | 0,94 % | 1,89 % | 0,94 % | | 16,98 % | | |
| AVILA ESTACION | 41,38 % | 50,34 % | 4,83 % | | | | | 3,45 % | | |
| AVILA NORTE | 58,70 % | 34,78 % | 4,35 % | | 2,17 % | | | | | |
| AVILA RURAL | 67,11 % | 2,63 % | 10,53 % | | | | | 19,74 % | | |
| AVILA SUR ESTE | 64,84 % | 16,89 % | 13,70 % | | 0,46 % | | | 4,11 % | | |
| AVILA SUR OESTE | 70,30 % | 18,81 % | 4,95 % | | | 1,98 % | | 3,96 % | | |
| BABIA | 75,00 % | | 25,00 % | | | | | | | |
| BALTANAS | 75,00 % | 5,36 % | 7,14 % | | 1,79 % | 1,79 % | | 8,93 % | | |
| BAÑEZA I | 53,57 % | 7,14 % | 10,12 % | | 0,60 % | 4,76 % | | 23,21 % | | 0,60 % |
| BAÑEZA II | 56,94 % | 7,64 % | 18,75 % | | | 6,25 % | | 10,42 % | | |
| BARCO DE AVILA | 68,83 % | | 10,39 % | | 1,30 % | | | 19,48 % | | |
| BARRIO ESPAÑA | 40,00 % | 35,00 % | 12,50 % | | | | | 12,50 % | | |
| BEJAR | 70,73 % | 11,38 % | 15,45 % | | | | | 2,44 % | | |
| BELORADO | 50,00 % | 25,00 % | 12,50 % | | | 2,08 % | | 10,42 % | | |
| BEMBIBRE | 76,99 % | 6,19 % | 7,96 % | | | 0,88 % | | 7,96 % | | |
| BENAVENTE NORTE | 59,38 % | 18,13 % | 12,50 % | | | | | 10,00 % | | |
| BENAVENTE SUR | 62,84 % | 8,78 % | 14,19 % | | 0,68 % | 0,68 % | | 12,84 % | | |
| BERLANGA DE DUERO | 72,73 % | | | | | | | 27,27 % | | |
| BOÑAR | 52,38 % | 28,57 % | 9,52 % | | | 4,76 % | | 4,76 % | | |
| BRIVIESCA | 63,64 % | 19,48 % | 14,29 % | | | | | 2,60 % | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| BURGO DE OSMA | 58,95 % | 24,21 % | 11,58 % | | | 2,11 % | | 3,16 % | | |
| BURGOHONDO | 65,33 % | 5,33 % | 21,33 % | | | | | 8,00 % | | |
| BURGOS RURAL NORTE | 61,17 % | 23,30 % | 6,80 % | | | | | 8,74 % | | |
| BURGOS RURAL SUR | 51,25 % | 29,38 % | 12,50 % | | | | | 6,88 % | | |
| CACABELOS | 56,15 % | 1,54 % | 26,92 % | | | 0,77 % | | 14,62 % | | |
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 81,48 % | 3,70 % | 3,70 % | | 3,70 % | | | 7,41 % | | |
| CAMARZANA DE TERA | 66,67 % | | 25,00 % | | | | | 8,33 % | | |
| CAMPOS LAMPREANA | 80,00 % | | 6,67 % | | | | | 13,33 % | | |
| CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS | 90,00 % | | 6,67 % | | | | | 3,33 % | | |
| CANDELEDA | 39,60 % | 4,70 % | 8,72 % | 2,01 % | | 22,82 % | | 22,15 % | | |
| CANTALAPIEDRA | 42,11 % | | 26,32 % | | | | | 31,58 % | | |
| CANTALEJO | 79,25 % | | 5,66 % | | | | 7,55 % | 7,55 % | | |
| CANTERAC | 49,43 % | 41,38 % | 4,60 % | | | | | 4,60 % | | |
| CAPUCHINOS | 85,25 % | 4,92 % | 3,28 % | | | | | 6,56 % | | |
| CARBAJALES DE ALBA | 40,00 % | | 30,00 % | | 20,00 % | | | 10,00 % | | |
| CARBALLEDA | 57,14 % | | 10,71 % | | | | | 32,14 % | | |
| CARBONERO | 56,00 % | 4,00 % | 21,33 % | | | | 1,33 % | 17,33 % | | |
| CARRION DE LOS CONDES | 46,00 % | 48,00 % | | | | | | 6,00 % | | |
| CASA DEL BARCO | 46,15 % | 34,62 % | 3,85 % | | | | | 15,38 % | | |
| CEBREROS | 77,30 % | 3,68 % | 7,36 % | | 0,61 % | | | 11,04 % | | |
| CENTRO-GAMAZO | 80,00 % | 8,57 % | 4,29 % | | 1,43 % | | | 5,71 % | | |
| CERVERA DE PISUERGA | 48,84 % | 25,58 % | 6,98 % | | | | | 18,60 % | | |
| CIGALES | 37,04 % | 59,26 % | 0,93 % | 0,93 % | | | | 1,85 % | | |
| CIRCULAR | 69,84 % | 15,87 % | 4,76 % | | | 0,79 % | | 7,94 % | 0,79 % | |
| CIRCUNVALACION | 50,69 % | 28,97 % | 3,10 % | | | | | 17,24 % | | |
| CISTIERRA | 33,33 % | 66,67 % | | | | | | | | |
| CIUDAD RODRIGO | 51,05 % | 35,56 % | 5,02 % | | | | | 8,37 % | | |
| CONDADO DE TREVIÑO | 76,47 % | | 23,53 % | | | | | | | |
| CONDESA | 58,62 % | 20,69 % | 10,34 % | | | | 1,72 % | 8,62 % | | |
| CORRALES | 69,23 % | 3,85 % | 15,38 % | | | | | 11,54 % | | |
| CRISTOBAL ACOSTA | 67,01 % | 12,89 % | 8,76 % | | | 1,03 % | | 10,31 % | | |
| CRUCERO | 60,00 % | 7,14 % | 10,00 % | | | 0,71 % | | 22,14 % | | |
| CUELLAR | 64,04 % | 4,49 % | 24,72 % | | 1,12 % | | | 5,62 % | | |
| CUENCA DEL BERNESGA | 44,78 % | 35,82 % | 1,49 % | | 1,49 % | 2,99 % | | 13,43 % | | |
| DELICIAS I | 67,07 % | 23,69 % | 4,22 % | | | | | 5,02 % | | |
| DELICIAS II | 54,00 % | 38,29 % | 2,57 % | | 0,29 % | 0,29 % | | 4,57 % | | |
| EL EJIDO | 70,25 % | 15,82 % | 8,86 % | | | | 0,63 % | 4,43 % | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| EL ESPINAR | 71,21 % | 7,58 % | 12,12 % | | | | | 9,09 % | | |
| ERAS DEL BOSQUE | 30,34 % | 49,44 % | 3,05 % | | | | | 17,01 % | 0,16 % | |
| ESGUEVILLAS | 25,00 % | | 25,00 % | | 25,00 % | | | 25,00 % | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 100,00 % | | | | | | | | | |
| FABERO | 42,31 % | 7,69 % | 34,62 % | | 7,69 % | | | 7,69 % | | |
| FONTIVEROS | 52,94 % | 23,53 % | 17,65 % | | | | | 5,88 % | | |
| FROMISTA | 65,38 % | 19,23 % | 7,69 % | | | | | 7,69 % | | |
| FUENTEGUINALDO | 45,45 % | | 36,36 % | | | | | 18,18 % | | |
| FUENTESAUCO | 94,12 % | | | | | | | 5,88 % | | |
| FUENTES DE OÑORO | 66,67 % | | 33,33 % | | | | | | | |
| GAMONAL-ANTIGUA | 55,56 % | 37,65 % | 1,23 % | | | | | 5,56 % | | |
| GARCIA LORCA | 41,56 % | 51,95 % | 2,60 % | | | | | 3,90 % | | |
| GARRIDO NORTE | 85,96 % | 3,51 % | 3,51 % | | | | | 7,02 % | | |
| GARRIDO SUR | 72,77 % | 1,34 % | 4,46 % | 1,34 % | | | | 20,09 % | | |
| GOMARA | 100,00 % | | | | | | | | | |
| GREDOS | 73,33 % | 6,67 % | 20,00 % | | | | | | | |
| GUARDO | 57,87 % | 14,04 % | 14,04 % | | 0,56 % | | | 13,48 % | | |
| GUAREÑA | 59,26 % | 3,70 % | 14,81 % | | | | 3,70 % | 18,52 % | | |
| GUIJUELO | 84,29 % | 1,43 % | 12,86 % | | 1,43 % | | | | | |
| HERRERA DE PISUERGA | 56,76 % | 28,38 % | 1,35 % | | | | | 13,51 % | | |
| HUERTA DEL REY | 42,22 % | 43,81 % | 2,54 % | | | | 0,32 % | 10,79 % | 0,32 % | |
| HUERTA DE REY | 46,67 % | 3,33 % | 43,33 % | | | | | 6,67 % | | |
| IGNACIO LOPEZ SAIZ | 43,86 % | 50,00 % | 3,51 % | 0,88 % | | | | 1,75 % | | |
| ISCAR | 38,31 % | 43,55 % | 11,29 % | | | | | 6,85 % | | |
| JARDINILLOS | 19,58 % | 67,72 % | 5,82 % | | 0,53 % | | | 6,35 % | | |
| JOSE AGUADO | 57,26 % | 36,29 % | 2,69 % | 0,54 % | | | | 3,23 % | | |
| JOSÉ LUIS SANTAMARIA | 66,01 % | 20,92 % | 5,56 % | | | 0,33 % | | 7,19 % | | |
| LA ALAMEDILLA | 71,57 % | 18,63 % | 4,90 % | | 0,98 % | 0,98 % | | 2,94 % | | |
| LA ALBERCA | 78,57 % | | 11,90 % | | | | | 9,52 % | | |
| LA CABRERA | 42,86 % | | 14,29 % | | | | | 42,86 % | | |
| LA FUENTE SAN ESTEBAN | 80,85 % | | 17,02 % | | | | | 2,13 % | | |
| LAGUNA DE DUERO | 14,29 % | 80,80 % | 1,34 % | 0,45 % | | | | 2,68 % | 0,45 % | |
| LA MAGDALENA | 57,14 % | 9,52 % | 4,76 % | | | 4,76 % | | 23,81 % | | |
| LANZAHITA | 44,83 % | 3,45 % | 3,45 % | | | | | 48,28 % | | |
| LA PALOMERA | 41,21 % | 43,03 % | 3,64 % | | 0,61 % | | | 10,91 % | 0,61 % | |
| LA PUEBLA | 36,60 % | 53,62 % | 7,23 % | | 0,43 % | | | 2,13 % | | |
| LAS HUELGAS | 43,59 % | 33,33 % | 14,10 % | | | | | 8,97 % | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| LA SIERRA | 85,71 % | | 14,29 % | | | | | | | |
| LAS NAVAS DEL MARQUES | 80,00 % | 3,53 % | 10,59 % | | | | | 5,88 % | | |
| LAS TORRES | 66,67 % | 20,37 % | 5,56 % | | | | | 7,41 % | | |
| LA VICTORIA | 19,88 % | 77,02 % | 0,62 % | | | | | 2,48 % | | |
| LEDESMA | 52,00 % | 2,00 % | 8,00 % | | 2,00 % | | | 36,00 % | | |
| LERMA | 61,86 % | 12,37 % | 12,37 % | | | | | 13,40 % | | |
| LINALES DE RIOFRIO | 56,00 % | | 20,00 % | | | | | 24,00 % | | |
| LOS COMUNEROS | 31,67 % | 62,50 % | 3,33 % | | | | | 2,50 % | | |
| LOS CUBOS | 67,18 % | 23,08 % | 3,59 % | | | | | 6,15 % | | |
| LUMBRALES | 72,22 % | | 22,22 % | | | | | 5,56 % | | |
| MADRIGAL ALTAS TORRES | 82,35 % | | 17,65 % | | | | | | | |
| MAGDALENA | 35,29 % | 29,41 % | 11,76 % | | | 5,88 % | | 17,65 % | | |
| MANSILLA DE LAS MULAS | 62,26 % | 5,66 % | 15,09 % | | | 1,89 % | | 15,09 % | | |
| MATALLANA DE TORIO | 42,86 % | 42,86 % | 14,29 % | | | | | | | |
| MATILLA DE LOS CAÑOS | 60,00 % | | 26,67 % | | | | | 13,33 % | | |
| MAYORGA DE CAMPOS | 62,50 % | 12,50 % | 12,50 % | | | | | 12,50 % | | |
| MEDINA DEL CAMPO RURAL | 68,75 % | 18,75 % | 6,25 % | | | | | 6,25 % | | |
| MEDINA DEL CAMPO URBANO | 74,77 % | 14,49 % | 5,84 % | | 0,47 % | | | 4,44 % | | |
| MEDINA DE POMAR | 68,42 % | 18,42 % | 2,63 % | | | | | 10,53 % | | |
| MEDINA DE RIOSECO | 55,06 % | 33,71 % | 7,87 % | | 1,12 % | | | 2,25 % | | |
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 64,91 % | 12,28 % | 3,51 % | | | 8,77 % | | 10,53 % | | |
| MIGUEL ARMijo | 84,11 % | 0,93 % | 7,48 % | 0,93 % | | | | 6,54 % | | |
| MIRANDA DEL CASTAÑAR | 62,50 % | | 37,50 % | | | | | | | |
| MIRANDA ESTE | 35,89 % | 51,51 % | 8,49 % | | | | | 4,11 % | | |
| MIRANDA OESTE | 73,03 % | 16,45 % | 3,62 % | 0,33 % | 0,66 % | | | 5,59 % | 0,33 % | |
| MOMBELTRAN | 63,16 % | | 31,58 % | | | | | 5,26 % | | |
| MOTA DEL MARQUES | 75,00 % | 12,50 % | 12,50 % | | | | | | | |
| MUÑANA | 76,00 % | 8,00 % | 4,00 % | | | | | 12,00 % | | |
| MUñICO | 71,43 % | 14,29 % | 14,29 % | | | | | | | |
| NAVA DE LA ASUNCION | 69,80 % | | 11,41 % | | 2,01 % | 1,34 % | 0,67 % | 14,77 % | | |
| OLVEGA | 57,14 % | 5,36 % | 21,43 % | | | | | 16,07 % | | |
| OSORNO | 56,25 % | 6,25 % | 31,25 % | | | | | 6,25 % | | |
| PALENCIA RURAL | 68,89 % | 17,78 % | 11,11 % | | | | | 2,22 % | | |
| PAMPLIEGA | 78,57 % | | 7,14 % | | | | | 14,29 % | | |
| PARADA DE MOLINO | 54,08 % | 3,57 % | 10,20 % | 0,51 % | 0,51 % | 1,02 % | | 30,10 % | | |
| PAREDES DE NAVA | 66,04 % | 16,98 % | 5,66 % | | | | | 11,32 % | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| PARQUESOL | 34,87 % | 58,62 % | 3,45 % | | | | | 3,07 % | | |
| PEDIATRIA DE AREA ESTE | 65,08 % | 18,25 % | 6,88 % | | 0,26 % | | | 9,52 % | | |
| PEDIATRIA DE AREA LEON | 62,93 % | 18,97 % | 7,33 % | | | | | 10,78 % | | |
| PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA | 64,37 % | 6,90 % | 21,84 % | | 1,15 % | | 2,30 % | 3,45 % | | |
| PEDIATRIA DE AREA ZAMORA | 70,69 % | 10,34 % | 5,17 % | | 3,45 % | | 1,72 % | 8,62 % | | |
| PEDROSILLO EL RALO | 57,14 % | | 28,57 % | | 3,57 % | 3,57 % | | 7,14 % | | |
| PEÑAFIEL | 69,01 % | 2,82 % | 7,75 % | | 0,70 % | | | 19,72 % | | |
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 72,67 % | 3,33 % | 10,67 % | | 4,00 % | | | 9,33 % | | |
| PERIURBANA NORTE | 68,02 % | 16,28 % | 9,30 % | | | 0,58 % | | 5,81 % | | |
| PERIURBANA SUR | 94,16 % | | 3,25 % | | | 0,65 % | | 1,95 % | | |
| PIEDRAHITA | 75,51 % | 6,12 % | 8,16 % | | | | | 10,20 % | | |
| PILARICA | 68,59 % | 17,95 % | 8,97 % | | | 1,28 % | | 3,21 % | | |
| PINALES-COVALEDA | 66,10 % | 16,95 % | 1,69 % | | 1,69 % | 8,47 % | | 5,08 % | | |
| PINTOR OLIVA | 35,51 % | 23,13 % | 3,74 % | 0,47 % | 0,47 % | 3,50 % | | 33,18 % | | |
| PISUERGA | 46,02 % | 42,05 % | 5,30 % | 0,19 % | | 0,38 % | | 6,06 % | | |
| PIZARRALES | 42,40 % | 46,40 % | 4,80 % | | 0,80 % | | | 5,60 % | | |
| PLAZA DEL EJERCITO | 25,00 % | 64,06 % | 6,25 % | | | | | 4,69 % | | |
| PONFERRADA I | 79,52 % | 0,34 % | 8,87 % | | 1,37 % | 0,34 % | | 9,56 % | | |
| PONFERRADA II | 50,47 % | 5,14 % | 19,63 % | | 1,87 % | 11,68 % | | 11,21 % | | |
| PONFERRADA III | 56,67 % | 5,00 % | 13,33 % | | 3,33 % | 1,67 % | | 19,17 % | | 0,83 % |
| PONFERRADA IV | 51,59 % | 10,19 % | 14,01 % | | 0,64 % | 2,55 % | | 21,02 % | | |
| PORTILLO | 54,84 % | 25,81 % | 16,13 % | | | | | 3,23 % | | |
| PUENTE DOMINGO FLOREZ | 53,85 % | 15,38 % | 7,69 % | | | | | 23,08 % | | |
| PUERTA NUEVA | 71,13 % | 9,62 % | 7,95 % | | 3,77 % | 0,42 % | | 7,11 % | | |
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 52,54 % | 1,69 % | 11,86 % | | | 6,78 % | | 27,12 % | | |
| RIAÑO | 42,86 % | 14,29 % | 7,14 % | | 7,14 % | | | 28,57 % | | |
| RIAZA | 61,22 % | 2,04 % | 22,45 % | | | | 4,08 % | 10,20 % | | |
| RIBERA DEL ESLA | 42,11 % | 10,53 % | 10,53 % | | 5,26 % | 5,26 % | | 26,32 % | | |
| RIBERA DEL ORBIGO | 71,79 % | 5,13 % | 17,31 % | | | | | 5,77 % | | |
| ROA | 61,40 % | 16,67 % | 10,53 % | | | 0,88 % | | 10,53 % | | |
| ROBLEDA | 58,82 % | | 35,29 % | | | | | 5,88 % | | |
| RONDILLA I | 50,00 % | 41,30 % | 2,17 % | | | | | 6,52 % | | |
| RONDILLA II | 58,82 % | 30,88 % | 4,41 % | | | | | 5,88 % | | |
| SACRAMENIA | | | 100,00 % | | | | | | | |
| SAHAGUN | 52,63 % | 3,95 % | 10,53 % | | 3,95 % | 1,32 % | | 27,63 % | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| SALAS DE LOS INFANTES | 74,19 % | | 12,90 % | | | | | 12,90 % | | |
| SALDAÑA | 43,70 % | 41,18 % | 7,56 % | | | | | 7,56 % | | |
| SAN AGUSTIN | 35,87 % | 56,50 % | 5,38 % | 0,45 % | | | | 1,79 % | | |
| SAN ANDRES DEL RABANEDO | 76,26 % | 15,15 % | 2,53 % | | 1,52 % | | | 4,55 % | | |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 31,65 % | 12,66 % | 10,13 % | | 1,27 % | 1,27 % | | 43,04 % | | |
| SAN ILDEFONSO | | | 100,00 % | | | | | | | |
| SAN JOSE | 66,22 % | 21,62 % | 9,46 % | | | 1,35 % | | 1,35 % | | |
| SAN JUAN | 75,81 % | 11,29 % | 11,29 % | | | | | 1,61 % | | |
| SAN LEONARDO DE YAGUE | 39,44 % | 5,63 % | 19,72 % | | | 1,41 % | | 33,80 % | | |
| SAN PABLO | 55,22 % | 17,91 % | 1,49 % | | | | | 25,37 % | | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | 75,00 % | 8,33 % | 8,33 % | | | 8,33 % | | | | |
| SAN PEDRO MANRIQUE | 47,62 % | | 19,05 % | | | | | 33,33 % | | |
| SANTA CLARA | 23,93 % | 67,48 % | 4,91 % | | | | | 3,68 % | | |
| SANTA ELENA | 86,21 % | 3,45 % | 4,83 % | | 0,69 % | | | 4,83 % | | |
| SANTA MARIA | 67,35 % | 7,14 % | 10,20 % | | 2,04 % | | | 13,27 % | | |
| SANTA MARTA | 74,29 % | 2,14 % | 15,00 % | | | | | 8,57 % | | |
| SAYAGO | 65,52 % | 3,45 % | 27,59 % | | | | | 3,45 % | | |
| SEDANO | 50,00 % | | 50,00 % | | | | | | | |
| SEGOVIA I | 81,53 % | 4,05 % | 4,95 % | | | 1,35 % | 0,45 % | 7,66 % | | |
| SEGOVIA II | 71,89 % | 7,03 % | 6,49 % | | | | 4,86 % | 9,73 % | | |
| SEGOVIA III | 62,73 % | 21,74 % | 7,45 % | | | | | 8,07 % | | |
| SEGOVIA RURAL | 75,88 % | 6,03 % | 4,02 % | | | 1,01 % | | 13,07 % | | |
| SEPULVEDA | 76,92 % | 1,92 % | 17,31 % | | | | | 3,85 % | | |
| SORIA NORTE | 78,61 % | 10,98 % | 8,67 % | 0,58 % | | 0,58 % | | 0,58 % | | |
| SORIA RURAL | 84,09 % | 3,41 % | 6,82 % | | | 2,27 % | | 3,41 % | | |
| SORIA SUR | 79,86 % | 8,63 % | 9,35 % | | | 0,72 % | | 1,44 % | | |
| SORIA TARDE | 88,64 % | 4,55 % | 4,55 % | | | | | 2,27 % | | |
| SOTILLO DE LA ADRADA | 49,25 % | 5,97 % | 22,39 % | | 2,24 % | 0,75 % | | 19,40 % | | |
| SUR | 33,14 % | 63,37 % | 1,74 % | | | | | 1,74 % | | |
| TABARA | 48,78 % | | 24,39 % | | 4,88 % | | | 21,95 % | | |
| TAMAMES | 50,00 % | | 8,33 % | | | | | 41,67 % | | |
| TEJARES | 73,19 % | 0,72 % | 2,90 % | | | | | 23,19 % | | |
| TORDESILLAS | 53,75 % | 22,50 % | 15,00 % | | 1,25 % | 1,25 % | | 5,00 % | | 1,25 % |
| TORENO | 85,00 % | 10,00 % | 5,00 % | | | | | | | |
| TORO | 74,26 % | 0,99 % | 13,86 % | | | 0,99 % | | 9,90 % | | |
| TORQUEMADA | 80,65 % | 9,68 % | 9,68 % | | | | | | | |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACROLÍDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| TORTOLA | 36,17 % | 62,77 % | | | | | | 1,06 % | | |
| TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN | 53,73 % | 35,82 % | 4,48 % | | 1,49 % | | | 2,99 % | 1,49 % | |
| TUDELA | 53,94 % | 35,76 % | 5,45 % | | | | | 4,85 % | | |
| UNIVERSIDAD CENTRO | 91,30 % | 1,45 % | 2,90 % | | | | | 4,35 % | | |
| VALDERAS | 52,73 % | 7,27 % | 1,82 % | | 10,91 % | 1,82 % | | 25,45 % | | |
| VALENCIA DE DON JUAN | 42,03 % | 23,19 % | 31,88 % | | | | | 2,90 % | | |
| VALLADOLID RURAL I | 54,65 % | 34,30 % | 3,49 % | | | | | 7,56 % | | |
| VALLADOLID RURAL II | 47,37 % | 46,20 % | 2,34 % | | | | | 4,09 % | | |
| VALLE DE MENA | 56,63 % | 6,02 % | 18,07 % | | 1,20 % | | | 18,07 % | | |
| VALLE DE TOBALINA | | | 100,00 % | | | | | | | |
| VALLE DE VALDEBEZANA | 50,00 % | | | | | | | 50,00 % | | |
| VENTA DE BAÑOS | 65,10 % | 13,42 % | 14,09 % | | | | | 7,38 % | | |
| VIDRIALES | 56,76 % | | 24,32 % | | | | | 18,92 % | | |
| VILLABLINO | 40,00 % | 14,00 % | 7,00 % | | 1,00 % | | | 38,00 % | | |
| VILLACASTIN | 95,00 % | | | | | | | 5,00 % | | |
| VILLADA | 78,57 % | 10,71 % | | | | | | 10,71 % | | |
| VILLADIEGO | 42,11 % | 31,58 % | 21,05 % | | | | | 5,26 % | | |
| VILLAFRANCA | 72,34 % | 6,38 % | 12,77 % | | | | | 8,51 % | | |
| VILLAFRECHOS | 85,19 % | | 7,41 % | | | | | 7,41 % | | |
| VILLALON DE CAMPOS | 70,21 % | 12,77 % | 10,64 % | | 2,13 % | 2,13 % | | 2,13 % | | |
| VILLALPANDO | 53,85 % | 11,54 % | 19,23 % | | | 3,85 % | | 11,54 % | | |
| VILLAMURIEL | 72,32 % | 16,07 % | 4,46 % | | 0,89 % | | | 6,25 % | | |
| VILLARCAYO | 74,36 % | 5,13 % | 17,95 % | | | | | 2,56 % | | |
| VILLARRAMIEL | 85,71 % | 14,29 % | | | | | | | | |
| VILLORIA | 66,67 % | 1,52 % | 13,64 % | | | 1,52 % | | 16,67 % | | |
| VIRGEN CONCHA | 71,11 % | 12,59 % | 5,93 % | 0,74 % | 0,74 % | | | 8,15 % | 0,74 % | |
| VITIGUDINO | 76,19 % | | 9,52 % | | | | | 14,29 % | | |
| ZAMORA NORTE | 82,00 % | | 8,00 % | | | | | 10,00 % | | |
| ZAMORA SUR | 66,00 % | 6,00 % | 16,00 % | | | 2,00 % | 2,00 % | 8,00 % | | |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,74 % | 0,10 % | 10,41 % | 0,04 % | 0,01 % |

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AGREDA | 73 | 85,88 % | 85 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 60,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 62 | 93,55 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 12 | 75,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 89 | 85,88 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| AGREDA | 60,24 % | 1,20 % | 25,30 % | 1,20 % | 12,05 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AGUILAR DE CAMPOO | 86 | 68,80 % | 125 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 30 | 43,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 52 | 80,77 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 53 | 64,15 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 135 | 68,80 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| AGUILAR DE CAMPOO | 58,70 % | 16,30 % | 9,78 % | 15,22 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ALBA DE TORMES | 89 | 66,92 % | 133 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 26 | 26,92 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 15 | 93,33 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 100 | 73,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 143 | 66,92 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ALBA DE TORMES | 72,00 % | 23,00 % | 4,00 % | 1,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 20 | 83,33 % | 24 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 5 | 60,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 25 | 83,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 46,15 % | 42,31 % | 11,54 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ALISTE | 51 | 78,46 % | 65 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 9 | 22,22 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 34 | 79,41 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 4 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 28 | 85,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 75 78,46 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--|--------------------|
| ALISTE | 71,67 % | 13,33 % | 1,67 % | 13,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ALMAZAN | 71 | 42,01 % | 169 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 15,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 15 | 93,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 145 | 38,62 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| | TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | 181 | 42,01 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ALMAZAN | 60,26 % | 14,10 % | 6,41 % | 19,23 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-04 | 2025-06 | 2025-08 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ALTA SANABRIA | 3 | 60,00 % | 5 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|---|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 5 | 60,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 5 60,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--------------------|
| ALTA SANABRIA | 66,67 % | 33,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 10,41 % |

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ANTONIO GUTIERREZ | 230 | 49,36 % | 466 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 96 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 140 | 72,86 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 254 | 40,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 491 | 49,36 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| ANTONIO GUTIERREZ | 68,05 % | 24,07 % | 2,49 % | 0,41 % | 4,98 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

ARANDA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARANDA NORTE | 284 | 70,12 % | 405 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 73 | 36,99 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 185 | 87,57 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 8 | 12,50 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 192 | 56,25 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 458 | 70,12 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| ARANDA NORTE | 60,82 % | 8,78 % | 10,03 % | 0,63 % | 19,75 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARANDA RURAL | 116 | 72,96 % | 159 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 46 | 54,35 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 69 | 85,51 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 4 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 62 | 61,29 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 181 72,96 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ARANDA RURAL | 53,97 % | 6,35 % | 7,94 % | 31,75 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARANDA SUR | 274 | 64,32 % | 426 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 57 | 29,82 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 152 | 86,18 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 272 | 54,04 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 484 | 64,32 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ARANDA SUR | 47,10 % | 8,39 % | 12,90 % | 31,61 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARCOS DE JALON | 43 | 68,25 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 41 | 60,98 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 90,48 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 42,86 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 70 68,25 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| ARCOS DE JALON | 48,15 % | 7,41 % | 44,44 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARENAS DE SAN PEDRO | 171 | 85,93 % | 199 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 67 | 56,72 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 78 | 91,03 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 88 | 92,05 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 235 | 85,93 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| ARENAS DE SAN PEDRO | 56,50 % | 0,50 % | 18,50 % | 8,50 % | 16,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AREVALO | 173 | 57,67 % | 300 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 74 | 41,89 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 64 | 79,69 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 197 | 50,76 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 339 57,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| AREVALO | 42,79 % | 22,89 % | 9,45 % | 1,00 % | 23,38 % | 0,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % | 0,04 % |

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARMUNIA | 81 | 57,04 % | 142 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 24 | 62,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 40 | 82,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 89 | 43,82 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 155 | 57,04 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ARMUNIA | 61,36 % | 31,82 % | 2,27 % | 4,55 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ARTURO EYRIES | 87 | 32,58 % | 267 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 99 | 23,23 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 45 | 80,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 4 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 141 | 22,70 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 289 | 32,58 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| ARTURO EYRIES | 43,96 % | 43,96 % | 5,49 % | 1,10 % | 5,49 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ASTORGA I | 81 | 66,39 % | 122 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 62,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 31 | 83,87 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 87 | 60,92 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 126 | 66,39 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ASTORGA I | 47,19 % | 16,85 % | 11,24 % | 24,72 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ASTORGA II | 95 | 67,86 % | 140 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 22 | 90,91 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 58 | 89,66 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 72 | 40,28 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 152 | 67,86 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|
| ASTORGA II | 59,43 % | 4,72 % | 15,09 % | 0,94 % | 1,89 % | 0,94 % | 16,98 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AVILA ESTACION | 137 | 56,38 % | 243 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 35 | 22,86 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 53 | 86,79 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 167 | 50,90 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 258 | 56,38 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| AVILA ESTACION | 41,38 % | 50,34 % | 4,83 % | 3,45 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

AVILA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AVILA NORTE | 87 | 66,41 % | 131 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 30 | 20,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 74 | 85,14 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 30 | 60,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 134 | 66,41 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN |
|--|---|---|---|--|
| AVILA NORTE | 58,70 % | 34,78 % | 4,35 % | 2,17 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % |

AVILA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AVILA RURAL | 74 | 77,89 % | 95 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 28 | 57,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 45 | 84,44 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 32 | 78,13 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 106 | 77,89 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| AVILA RURAL | 67,11 % | 2,63 % | 10,53 % | 19,74 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AVILA SUR ESTE | 202 | 64,95 % | 311 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 38 | 26,32 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 115 | 86,96 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 178 | 56,18 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 334 64,95 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| AVILA SUR ESTE | 64,84 % | 16,89 % | 13,70 % | 0,46 % | 4,11 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

AVILA SUR OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| AVILA SUR OESTE | 94 | 68,61 % | 137 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 25 | 48,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 47 | 76,60 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 73 | 64,38 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 146 | 68,61 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| AVILA SUR OESTE | 70,30 % | 18,81 % | 4,95 % | 1,98 % | 3,96 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BABIA | 8 | 100,00 % | 8 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 3 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 8 | 100,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| BABIA | 75,00 % | 25,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BALTANAS | 48 | 85,71 % | 56 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 33 | 72,73 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 18 | 94,44 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 87,50 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 67 | 85,71 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| BALTANAS | 75,00 % | 5,36 % | 7,14 % | 1,79 % | 1,79 % | 8,93 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BAÑEZA I | 149 | 69,30 % | 215 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 50 | 52,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 54 | 85,19 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 129 | 65,12 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 234 | 69,30 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------------|
| BAÑEZA I | 53,57 % | 7,14 % | 10,12 % | 0,60 % | 4,76 % | 23,21 % | 0,60 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % | 0,01 % |

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BAÑEZA II | 126 | 64,62 % | 195 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 38 | 57,89 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 31 | 70,97 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 145 | 63,45 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 214 | 64,62 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| BAÑEZA II | 56,94 % | 7,64 % | 18,75 % | 6,25 % | 10,42 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BARCO DE AVILA | 66 | 84,62 % | 78 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 23 | 60,87 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 44 | 93,18 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 26 | 65,38 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 93 | 84,62 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--|--|--------------------|
| BARCO DE AVILA | 68,83 % | 10,39 % | 1,30 % | 19,48 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

BARRIO ESPAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BARRIO ESPAÑA | 34 | 53,97 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 16,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 45 | 57,78 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 67 | 53,97 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BARRIO ESPAÑA | 40,00 % | 35,00 % | 12,50 % | 12,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BEJAR | 113 | 60,11 % | 188 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 51 | 25,49 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 84 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 77 | 59,74 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 2 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 214 60,11 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BEJAR | 70,73 % | 11,38 % | 15,45 % | 2,44 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

BELORADO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BELORADO | 45 | 73,77 % | 61 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 18 | 100,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 39 | 69,23 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 70 73,77 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| BELORADO | 50,00 % | 25,00 % | 12,50 % | 2,08 % | 10,42 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

BEMBIBRE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BEMBIBRE | 102 | 67,11 % | 152 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 33 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 76 | 80,26 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 63 | 60,32 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 172 67,11 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| BEMBIBRE | 76,99 % | 6,19 % | 7,96 % | 0,88 % | 7,96 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BENAVENTE NORTE | 143 | 72,96 % | 196 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 37 | 62,16 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 80 | 76,25 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 96 | 67,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 213 | 72,96 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BENAVENTE NORTE | 59,38 % | 18,13 % | 12,50 % | 10,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

BENAVENTE SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BENAVENTE SUR | 135 | 74,18 % | 182 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 24 | 41,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 77 | 79,22 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 97 | 70,10 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 198 | 74,18 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| BENAVENTE SUR | 62,84 % | 8,78 % | 14,19 % | 0,68 % | 0,68 % | 12,84 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BERLANGA DE DUERO | 11 | 84,62 % | 13 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 6 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 4 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 16 | 84,62 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--------------------|
| BERLANGA DE DUERO | 72,73 % | 27,27 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BOÑAR | 16 | 80,00 % | 20 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 90,91 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 9 | 77,78 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 23 | 80,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| BOÑAR | 52,38 % | 28,57 % | 9,52 % | 4,76 % | 4,76 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BRIVIESCA | 68 | 59,65 % | 114 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 33 | 36,36 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 43 | 79,07 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 49 | 57,14 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 126 | 59,65 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BRIVIESCA | 63,64 % | 19,48 % | 14,29 % | 2,60 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BURGO DE OSMA | 83 | 76,15 % | 109 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 46,15 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 37 | 75,68 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 67 | 80,60 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 117 76,15 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| BURGO DE OSMA | 58,95 % | 24,21 % | 11,58 % | 2,11 % | 3,16 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BURGOHONDO | 70 | 68,63 % | 102 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 44 | 45,45 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 31 | 96,77 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 38 | 63,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 113 68,63 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BURGOHONDO | 65,33 % | 5,33 % | 21,33 % | 8,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

BURGOS RURAL NORTE
Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BURGOS RURAL NORTE | 95 | 61,29 % | 155 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 30 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 65 | 84,62 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 77 | 44,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 172 61,29 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BURGOS RURAL NORTE | 61,17 % | 23,30 % | 6,80 % | 8,74 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| BURGOS RURAL SUR | 149 | 74,87 % | 199 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 32 | 43,75 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 105 | 82,86 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 69 | 75,36 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 208 | 74,87 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| BURGOS RURAL SUR | 51,25 % | 29,38 % | 12,50 % | 6,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CACABELOS | 119 | 77,78 % | 153 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 41 | 68,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 82 | 85,37 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 42 | 69,05 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 168 | 77,78 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CACABELOS | 56,15 % | 1,54 % | 26,92 % | 0,77 % | 14,62 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

CALZADA DE VALDUNCIEL**Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico**

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 25 | 75,76 % | 33 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 14 | 57,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 15 | 86,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 9 | 77,78 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 38 | 75,76 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 81,48 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 7,41 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

CAMARZANA DE TERA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CAMARZANA DE TERA | 23 | 69,70 % | 33 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 42,86 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 85,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 17 | 64,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 38 | 69,70 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CAMARZANA DE TERA | 66,67 % | 25,00 % | 8,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

CAMPOS LAMPREANA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CAMPOS LAMPREANA | 14 | 56,00 % | 25 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 42,86 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 6 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 43,75 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 29 | 56,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CAMPOS LAMPREANA | 80,00 % | 6,67 % | 13,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS | 29 | 60,42 % | 48 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 14,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 25 | 72,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 55,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 52 | 60,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS | 90,00 % | 6,67 % | 3,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CANDELEDA | 116 | 83,45 % | 139 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 52 | 38,46 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 94 | 97,87 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 94,44 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 164 | 83,45 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| CANDELEDA | 39,60 % | 4,70 % | 8,72 % | 2,01 % | 22,82 % | 22,15 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,74 % | 10,41 % |

CANTALAPIEDRA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CANTALAPIEDRA | 15 | 78,95 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 57,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 8 | 87,50 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 70,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 25 | 78,95 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CANTALAPIEDRA | 42,11 % | 26,32 % | 31,58 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CANTALEJO | 51 | 62,20 % | 82 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 28 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 36 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 25 | 56,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 89 | 62,20 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--|--|--------------------|
| CANTALEJO | 79,25 % | 5,66 % | 7,55 % | 7,55 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CANTERAC | 82 | 40,80 % | 201 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 23 | 43,48 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 46 | 86,96 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | 33,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 149 | 24,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 221 | 40,80 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CANTERAC | 49,43 % | 41,38 % | 4,60 % | 4,60 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CAPUCHINOS | 59 | 56,73 % | 104 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 45 | 82,22 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 58 | 37,93 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 107 56,73 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CAPUCHINOS | 85,25 % | 4,92 % | 3,28 % | 6,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-04 | 2025-06 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CARBAJALES DE ALBA | 9 | 81,82 % | 11 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 5 | 40,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 3 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 80,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 13 | 81,82 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--|--|--------------------|
| CARBAJALES DE ALBA | 40,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 10,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CARBALLEDA | 22 | 91,67 % | 24 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 10 | 90,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 8 | 75,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 28 | 91,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CARBALLEDA | 57,14 % | 10,71 % | 32,14 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CARBONERO | 70 | 55,56 % | 126 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 26 | 23,08 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 37 | 89,19 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 71 | 52,11 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 134 | 55,56 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CARBONERO | 56,00 % | 4,00 % | 21,33 % | 1,33 % | 17,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CARRION DE LOS CONDES | 47 | 67,14 % | 70 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 21 | 14,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 41 | 90,24 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 4 | 25,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 43,75 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 82 | 67,14 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| CARRION DE LOS CONDES | 46,00 % | 48,00 % | 6,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 10,41 % |

CASA DEL BARCO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CASA DEL BARCO | 25 | 75,76 % | 33 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 9 | 88,89 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 65,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 33 | 75,76 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CASA DEL BARCO | 46,15 % | 34,62 % | 3,85 % | 15,38 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CEBREROS | 155 | 73,81 % | 210 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 40 | 27,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 135 | 91,11 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 48 | 54,17 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 224 | 73,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CEBREROS | 77,30 % | 3,68 % | 7,36 % | 0,61 % | 11,04 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CENTRO-GAMAZO | 65 | 69,89 % | 93 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 21 | 42,86 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 52 | 78,85 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 24 | 75,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 98 | 69,89 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CENTRO-GAMAZO | 80,00 % | 8,57 % | 4,29 % | 1,43 % | 5,71 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CERVERA DE PISUERGA | 38 | 63,33 % | 60 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 19 | 26,32 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 24 | 91,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 26 | 57,69 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 69 | 63,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CERVERA DE PISUERGA | 48,84 % | 25,58 % | 6,98 % | 18,60 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CIGALES | 102 | 77,86 % | 131 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 46,15 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 66 | 92,42 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 56 | 67,86 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 138 | 77,86 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CIGALES | 37,04 % | 59,26 % | 0,93 % | 0,93 % | 1,85 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CIRCULAR | 110 | 69,62 % | 158 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 59 | 62,71 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 50 | 84,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 10 | 20,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 57 | 64,91 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 177 69,62 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| CIRCULAR | 69,84 % | 15,87 % | 4,76 % | 0,79 % | 7,94 % | 0,79 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % | 0,04 % |

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CIRCUNVALACION | 264 | 56,65 % | 466 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 134 | 52,24 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 73 | 91,78 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 33 | 36,36 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 286 | 46,15 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 526 | 56,65 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CIRCUNVALACION | 50,69 % | 28,97 % | 3,10 % | 17,24 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CISTIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-05 | 2025-06 |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CISTIERRA | 2 | 100,00 % | 2 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 2 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 2 | 100,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|
| CISTIERRA | 33,33 % | 66,67 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % |

CIUDAD RODRIGO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CIUDAD RODRIGO | 209 | 72,32 % | 289 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 69 | 63,77 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 41 | 80,49 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 205 | 69,76 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 316 | 72,32 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CIUDAD RODRIGO | 51,05 % | 35,56 % | 5,02 % | 8,37 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CONDADO DE TREVÍNO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CONDADO DE TREVÍNO | 17 | 65,38 % | 26 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 62,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 16 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 20,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 29 | 65,38 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| CONDADO DE TREVÍNO | 76,47 % | 23,53 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

CONDESA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CONDESA | 54 | 45,00 % | 120 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 46 | 17,39 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 57,14 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 59 | 62,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 127 | 45,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CONDESA | 58,62 % | 20,69 % | 10,34 % | 1,72 % | 8,62 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CORRALES | 22 | 75,86 % | 29 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 16 | 56,25 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 8 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 70,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 34 | 75,86 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| CORRALES | 69,23 % | 3,85 % | 15,38 % | 11,54 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CRISTOBAL ACOSTA | 177 | 54,29 % | 326 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 59 | 30,51 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 64 | 81,25 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 229 | 49,34 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 2 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 354 54,29 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CRISTOBAL ACOSTA | 67,01 % | 12,89 % | 8,76 % | 1,03 % | 10,31 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CRUCERO | 132 | 39,29 % | 336 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 35,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 91,67 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 309 | 37,86 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 343 | 39,29 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CRUCERO | 60,00 % | 7,14 % | 10,00 % | 0,71 % | 22,14 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CUELLAR | 86 | 52,44 % | 164 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 32 | 31,25 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 75 | 82,67 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 65 | 24,62 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 173 | 52,44 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| CUELLAR | 64,04 % | 4,49 % | 24,72 % | 1,12 % | 5,62 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| CUENCA DEL BERNESGA | 57 | 79,17 % | 72 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 53,85 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 17 | 94,12 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 46 | 80,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 76 | 79,17 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| CUENCA DEL BERNESGA | 44,78 % | 35,82 % | 1,49 % | 1,49 % | 2,99 % | 13,43 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

DELICIAS I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| DELICIAS I | 460 | 77,31 % | 595 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 169 | 59,76 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 147 | 89,12 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 5 | 40,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 354 | 73,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 675 | 77,31 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| DELICIAS I | 67,07 % | 23,69 % | 4,22 % | 5,02 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

DELICIAS II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| DELICIAS II | 321 | 55,92 % | 574 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 76 | 55,26 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 164 | 85,98 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | 33,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 372 | 39,78 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 615 55,92 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| DELICIAS II | 54,00 % | 38,29 % | 2,57 % | 0,29 % | 0,29 % | 4,57 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

EL EJIDO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| EL EJIDO | 146 | 55,73 % | 262 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 33 | 36,36 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 51 | 74,51 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | 33,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 190 | 53,68 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 277 | 55,73 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| EL EJIDO | 70,25 % | 15,82 % | 8,86 % | 0,63 % | 4,43 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| EL ESPINAR | 61 | 62,24 % | 98 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 28 | 57,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 49 | 85,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 28 | 25,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 105 | 62,24 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| EL ESPINAR | 71,21 % | 7,58 % | 12,12 % | 9,09 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ERAS DEL BOSQUE | 521 | 83,76 % | 622 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 72 | 61,11 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 361 | 95,84 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 253 | 62,85 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 688 | 83,76 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--------------------|----------------------|
| ERAS DEL BOSQUE | 30,34 % | 49,44 % | 3,05 % | 17,01 % | 0,16 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % | 0,04 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ESGUEVILLAS | 4 | 40,00 % | 10 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 6 | 16,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 13 | 40,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--|--|--------------------|
| ESGUEVILLAS | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 22 | 78,57 % | 28 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 20 | 85,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 32 | 78,57 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO |
|--|---|
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 100,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % |

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FABERO | 24 | 63,16 % | 38 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 40,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 100,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 17 | 64,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 46 | 63,16 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| FABERO | 42,31 % | 7,69 % | 34,62 % | 7,69 % | 7,69 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FONTIVEROS | 16 | 64,00 % | 25 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 5 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 15 | 60,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 26 | 64,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| FONTIVEROS | 52,94 % | 23,53 % | 17,65 % | 5,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FROMISTA | 25 | 58,14 % | 43 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 27 | 55,56 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 13 | 46,15 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 46 | 58,14 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| FROMISTA | 65,38 % | 19,23 % | 7,69 % | 7,69 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

FUENTEGUINALDO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-08 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FUENTEGUINALDO | 11 | 91,67 % | 12 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 8 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 12 | 91,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| FUENTEGUINALDO | 45,45 % | 36,36 % | 18,18 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FUENTESAUCO | 17 | 80,95 % | 21 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 10 | 70,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 90,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 3 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 23 | 80,95 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--------------------|
| FUENTESAUCO | 94,12 % | 5,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 10,41 % |

FUENTES DE OÑORO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FUENTES DE OÑORO | 15 | 83,33 % | 18 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 90,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 57,14 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 20 | 83,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| FUENTES DE OÑORO | 66,67 % | 33,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

GAMONAL-ANTIGUA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GAMONAL-ANTIGUA | 150 | 55,56 % | 270 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 120 | 84,17 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 150 | 30,00 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | |
| | TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | 286 | 55,56 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| GAMONAL-ANTIGUA | 55,56 % | 37,65 % | 1,23 % | 5,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GARCIA LORCA | 74 | 53,24 % | 139 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 14 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 31 | 80,65 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 96 | 43,75 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 141 | 53,24 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| GARCIA LORCA | 41,56 % | 51,95 % | 2,60 % | 3,90 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GARRIDO NORTE | 55 | 62,50 % | 88 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 11 | 63,64 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 31 | 80,65 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 47 | 48,94 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 91 62,50 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| GARRIDO NORTE | 85,96 % | 3,51 % | 3,51 % | 7,02 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GARRIDO SUR | 218 | 46,68 % | 467 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 81 | 37,04 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 152 | 60,53 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 96 | 8,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 183 | 51,37 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 512 | 46,68 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| GARRIDO SUR | 72,77 % | 1,34 % | 4,46 % | 1,34 % | 20,09 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-02 | 2025-03 | 2025-08 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GOMARA | 4 | 57,14 % | 7 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 2 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 7 | 57,14 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO |
|--|---|
| GOMARA | 100,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GREDOS | 12 | 70,59 % | 17 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 9 | 77,78 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 20 | 70,59 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| GREDOS | 73,33 % | 6,67 % | 20,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GUARDO | 149 | 83,71 % | 178 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 35 | 54,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 83 | 92,77 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 96 | 72,92 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 215 | 83,71 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| GUARDO | 57,87 % | 14,04 % | 14,04 % | 0,56 % | 13,48 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GUAREÑA | 26 | 63,41 % | 41 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 26,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 13 | 76,92 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 72,22 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 46 | 63,41 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| GUAREÑA | 59,26 % | 3,70 % | 14,81 % | 3,70 % | 18,52 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| GUIJUELO | 67 | 63,81 % | 105 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 20,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 60 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 34 | 47,06 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 114 63,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN |
|--|---|---|---|--|
| GUIJUELO | 84,29 % | 1,43 % | 12,86 % | 1,43 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| HERRERA DE PISUERGA | 65 | 65,66 % | 99 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 36 | 30,56 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 49 | 87,76 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 31 | 48,39 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 116 65,66 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| HERRERA DE PISUERGA | 56,76 % | 28,38 % | 1,35 % | 13,51 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| HUERTA DEL REY | 294 | 71,88 % | 409 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 100 | 80,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 171 | 79,53 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 153 | 56,86 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| | TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | 425 | 71,88 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| HUERTA DEL REY | 42,22 % | 43,81 % | 2,54 % | 0,32 % | 10,79 % | 0,32 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % | 0,04 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| HUERTA DE REY | 27 | 69,23 % | 39 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 58,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 90,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 23 | 65,22 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 45 | 69,23 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| HUERTA DE REY | 46,67 % | 3,33 % | 43,33 % | 6,67 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

IGNACIO LOPEZ SAIZ

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| IGNACIO LOPEZ SAIZ | 102 | 46,79 % | 218 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 22 | 45,45 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 23 | 78,26 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 183 | 43,72 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 228 | 46,79 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| IGNACIO LOPEZ SAIZ | 43,86 % | 50,00 % | 3,51 % | 0,88 % | 1,75 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ISCAR | 227 | 69,42 % | 327 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 106 | 24,53 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 170 | 90,59 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 109 | 53,21 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 387 69,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| ISCAR | 38,31 % | 43,55 % | 11,29 % | 6,85 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

JARDINILLOS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| JARDINILLOS | 172 | 60,35 % | 285 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 18 | 22,22 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 166 | 79,52 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 129 | 32,56 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 313 | 60,35 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| JARDINILLOS | 19,58 % | 67,72 % | 5,82 % | 0,53 % | 6,35 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| JOSE AGUADO | 335 | 62,97 % | 532 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 117 | 50,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 72 | 81,94 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 375 | 61,07 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 566 | 62,97 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| JOSE AGUADO | 57,26 % | 36,29 % | 2,69 % | 0,54 % | 3,23 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

JOSÉ LUIS SANTAMARIA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| JOSÉ LUIS SANTAMARIA | 284 | 60,68 % | 468 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 162 | 45,06 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 119 | 94,96 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 222 | 50,45 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 503 | 60,68 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| JOSÉ LUIS SANTAMARIA | 66,01 % | 20,92 % | 5,56 % | 0,33 % | 7,19 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA ALAMEDILLA | 99 | 53,80 % | 184 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 22 | 13,64 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 60 | 71,67 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 110 | 49,09 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 193 53,80 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| LA ALAMEDILLA | 71,57 % | 18,63 % | 4,90 % | 0,98 % | 0,98 % | 2,94 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA ALBERCA | 39 | 86,67 % | 45 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 61,54 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 26 | 96,15 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 15 | 46,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 54 | 86,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| LA ALBERCA | 78,57 % | 11,90 % | 9,52 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA CABRERA | 7 | 70,00 % | 10 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 80,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 10 | 70,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| LA CABRERA | 42,86 % | 14,29 % | 42,86 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA FUENTE SAN ESTEBAN | 44 | 70,97 % | 62 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 18 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 20 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 31 | 67,74 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 69 | 70,97 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| LA FUENTE SAN ESTEBAN | 80,85 % | 17,02 % | 2,13 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LAGUNA DE DUERO | 206 | 55,08 % | 374 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 116 | 17,24 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 76 | 78,95 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 198 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 393 | 55,08 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| LAGUNA DE DUERO | 14,29 % | 80,80 % | 1,34 % | 0,45 % | 2,68 % | 0,45 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % | 0,04 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA MAGDALENA | 17 | 70,83 % | 24 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 2 | 100,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 65,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 25 70,83 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| LA MAGDALENA | 57,14 % | 9,52 % | 4,76 % | 4,76 % | 23,81 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

LANZAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LANZAHITA | 27 | 54,00 % | 50 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 31 | 25,81 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 80,95 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 80,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 58 | 54,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LANZAHITA | 44,83 % | 3,45 % | 3,45 % | 48,28 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA PALOMERA | 149 | 62,08 % | 240 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 26 | 38,46 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 79 | 79,75 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | 33,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 151 | 52,98 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 259 62,08 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| LA PALOMERA | 41,21 % | 43,03 % | 3,64 % | 0,61 % | 10,91 % | 0,61 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % | 0,04 % |

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA PUEBLA | 212 | 63,66 % | 333 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 79 | 43,04 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 92 | 81,52 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 192 | 59,90 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 363 | 63,66 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| LA PUEBLA | 36,60 % | 53,62 % | 7,23 % | 0,43 % | 2,13 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

LAS HUELGAS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LAS HUELGAS | 70 | 53,85 % | 130 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 29 | 24,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 44 | 65,91 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 62 | 54,84 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 136 53,85 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LAS HUELGAS | 43,59 % | 33,33 % | 14,10 % | 8,97 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA SIERRA | 7 | 46,67 % | 15 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 6 | 83,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 6 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 16 | 46,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| LA SIERRA | 85,71 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LAS NAVAS DEL MARQUES | 79 | 79,00 % | 100 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 16 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 57 | 91,23 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | 33,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 32 | 84,38 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 109 79,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LAS NAVAS DEL MARQUES | 80,00 % | 3,53 % | 10,59 % | 5,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LAS TORRES | 102 | 60,36 % | 169 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 18 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 28 | 92,86 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 130 | 58,46 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 178 60,36 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LAS TORRES | 66,67 % | 20,37 % | 5,56 % | 7,41 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LA VICTORIA | 154 | 58,33 % | 264 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 54 | 25,93 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 17 | 88,24 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 208 | 61,06 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 282 | 58,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LA VICTORIA | 19,88 % | 77,02 % | 0,62 % | 2,48 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

LEDESMA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LEDESMA | 46 | 83,64 % | 55 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 29 | 86,21 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 23 | 73,91 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 64 | 83,64 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| LEDESMA | 52,00 % | 2,00 % | 8,00 % | 2,00 % | 36,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LERMA | 82 | 75,93 % | 108 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 41 | 68,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 33 | 84,85 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 47 | 72,34 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 122 | 75,93 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LERMA | 61,86 % | 12,37 % | 12,37 % | 13,40 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

LINARES DE RIOFRIO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LINARES DE RIOFRIO | 22 | 66,67 % | 33 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 43,75 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 34 | 66,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| LINARES DE RIOFRIO | 56,00 % | 20,00 % | 24,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

LOS COMUNEROS
Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LOS COMUNEROS | 115 | 58,38 % | 197 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 19 | 36,84 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 33 | 84,85 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 155 | 53,55 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 207 | 58,38 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LOS COMUNEROS | 31,67 % | 62,50 % | 3,33 % | 2,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LOS CUBOS | 182 | 62,12 % | 293 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 66 | 71,21 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 81 | 92,59 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 178 | 40,45 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 325 | 62,12 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| LOS CUBOS | 67,18 % | 23,08 % | 3,59 % | 6,15 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| LUMBRALES | 35 | 74,47 % | 47 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 46,15 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 17 | 64,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 90,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 50 | 74,47 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| LUMBRALES | 72,22 % | 22,22 % | 5,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MADRIGAL ALTAS TORRES | 16 | 66,67 % | 24 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 10 | 20,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 9 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 29 | 66,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| MADRIGAL ALTAS TORRES | 82,35 % | 17,65 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MAGDALENA | 17 | 35,42 % | 48 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 54,55 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 31 | 25,81 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 49 | 35,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MAGDALENA | 35,29 % | 29,41 % | 11,76 % | 5,88 % | 17,65 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MANSILLA DE LAS MULAS | 49 | 53,26 % | 92 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 23 | 39,13 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 24 | 62,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 56 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 104 | 53,26 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MANSILLA DE LAS MULAS | 62,26 % | 5,66 % | 15,09 % | 1,89 % | 15,09 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-02 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MATALLANA DE TORIO | 6 | 75,00 % | 8 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 2 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 8 | 75,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| MATALLANA DE TORIO | 42,86 % | 42,86 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

MATILLA DE LOS CAÑOS
Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MATILLA DE LOS CAÑOS | 15 | 78,95 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 5 | 80,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 8 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 85,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 20 | 78,95 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| MATILLA DE LOS CAÑOS | 60,00 % | 26,67 % | 13,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MAYORGA DE CAMPOS | 23 | 88,46 % | 26 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 62,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 81,82 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 14 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 33 | 88,46 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| MAYORGA DE CAMPOS | 62,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MEDINA DEL CAMPO RURAL | 13 | 72,22 % | 18 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 14,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 9 | 77,78 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 80,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 26 | 72,22 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| MEDINA DEL CAMPO RURAL | 68,75 % | 18,75 % | 6,25 % | 6,25 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MEDINA DEL CAMPO URBANO | 390 | 73,58 % | 530 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 156 | 39,74 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 177 | 92,66 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 6 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 253 | 75,49 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 592 73,58 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MEDINA DEL CAMPO URBANO | 74,77 % | 14,49 % | 5,84 % | 0,47 % | 4,44 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MEDINA DE POMAR | 36 | 65,45 % | 55 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 39 | 74,36 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 11 | 72,73 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 59 | 65,45 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| MEDINA DE POMAR | 68,42 % | 18,42 % | 2,63 % | 10,53 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MEDINA DE RIOSECO | 81 | 54,00 % | 150 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 53 | 35,85 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 37 | 89,19 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 70 | 45,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 161 | 54,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MEDINA DE RIOSECO | 55,06 % | 33,71 % | 7,87 % | 1,12 % | 2,25 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 48 | 72,73 % | 66 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 32 | 75,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 31 | 58,06 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 78 | 72,73 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 64,91 % | 12,28 % | 3,51 % | 8,77 % | 10,53 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MIGUEL ARMIJO | 103 | 57,22 % | 180 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 5 | 40,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 71,43 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 166 | 55,42 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 185 | 57,22 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| MIGUEL ARMIJO | 84,11 % | 0,93 % | 7,48 % | 0,93 % | 6,54 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MIRANDA DEL CASTAÑAR | 8 | 57,14 % | 14 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 60,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 14 | 57,14 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|---|--|
| MIRANDA DEL CASTAÑAR | 62,50 % | 37,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MIRANDA ESTE | 327 | 78,42 % | 417 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 74 | 36,49 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 274 | 87,23 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 100 | 72,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 449 | 78,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| MIRANDA ESTE | 35,89 % | 51,51 % | 8,49 % | 4,11 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MIRANDA OESTE | 283 | 63,17 % | 448 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 172 | 26,74 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 178 | 87,64 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 158 | 60,76 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 508 | 63,17 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|----------------------|
| MIRANDA OESTE | 73,03 % | 16,45 % | 3,62 % | 0,33 % | 0,66 % | 5,59 % | 0,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 10,41 % | 0,04 % |

MOMBELTRAN

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MOMBELTRAN | 18 | 64,29 % | 28 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 11 | 45,45 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 30,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 31 | 64,29 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| MOMBELTRAN | 63,16 % | 31,58 % | 5,26 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

MOTA DEL MARQUES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-10 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MOTA DEL MARQUES | 8 | 61,54 % | 13 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 7 | 71,43 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 3 | 33,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 14 | 61,54 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| MOTA DEL MARQUES | 75,00 % | 12,50 % | 12,50 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MUÑANA | 23 | 88,46 % | 26 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 4 | 75,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 18 | 94,44 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 70,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 32 | 88,46 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| MUÑANA | 76,00 % | 8,00 % | 4,00 % | 12,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| MUÑICO | 5 | 100,00 % | 5 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 3 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 5 | 100,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| MUÑICO | 71,43 % | 14,29 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| NAVA DE LA ASUNCION | 140 | 65,42 % | 214 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 56 | 21,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 80 | 90,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 5 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 101 | 57,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 242 65,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--|--|--|--------------------|
| NAVA DE LA ASUNCION | 69,80 % | 11,41 % | 2,01 % | 1,34 % | 0,67 % | 14,77 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 0,10 % | 10,41 % |

OLMEDO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-10

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| OLMEDO | | | 1 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|---|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 1 |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| OLVEGA | 53 | 80,30 % | 66 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 22 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 32 | 93,75 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 21 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 75 | 80,30 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| OLVEGA | 57,14 % | 5,36 % | 21,43 % | 16,07 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| OSORNO | 16 | 61,54 % | 26 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 9 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 13 | 84,62 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 5 | 40,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 27 | 61,54 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| OSORNO | 56,25 % | 6,25 % | 31,25 % | 6,25 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PALENCIA RURAL | 43 | 63,24 % | 68 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 33 | 51,52 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 28 | 82,14 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 43,75 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 80 | 63,24 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PALENCIA RURAL | 68,89 % | 17,78 % | 11,11 % | 2,22 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PAMPLIEGA | 13 | 68,42 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 6 | 66,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 10 | 70,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 19 | 68,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| PAMPLIEGA | 78,57 % | 7,14 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PARADA DE MOLINO | 173 | 61,57 % | 281 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 79 | 53,16 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 94 | 87,23 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 20 | 35,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 121 | 44,63 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 315 61,57 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|
| PARADA DE MOLINO | 54,08 % | 3,57 % | 10,20 % | 0,51 % | 0,51 % | 1,02 % | 30,10 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PAREDES DE NAVA | 48 | 78,69 % | 61 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 18 | 77,78 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 85,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 30 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 69 | 78,69 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PAREDES DE NAVA | 66,04 % | 16,98 % | 5,66 % | 11,32 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PARQUESOL | 241 | 56,18 % | 429 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 88 | 55,68 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 40 | 77,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 40 | 7,50 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 287 | 58,19 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 455 | 56,18 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PARQUESOL | 34,87 % | 58,62 % | 3,45 % | 3,07 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

PEDIATRIA DE AREA ESTE
Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEDIATRIA DE AREA ESTE | 337 | 53,32 % | 632 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 195 | 12,82 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 180 | 80,56 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 61 | 4,92 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 308 | 61,04 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 745 53,32 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PEDIATRIA DE AREA ESTE | 65,08 % | 18,25 % | 6,88 % | 0,26 % | 9,52 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEDIATRIA DE AREA LEON | 212 | 62,91 % | 337 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 69 | 42,03 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 123 | 81,30 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 173 | 54,34 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 369 62,91 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PEDIATRIA DE AREA LEON | 62,93 % | 18,97 % | 7,33 % | 10,78 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA | 76 | 67,26 % | 113 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 32 | 31,25 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 37 | 83,78 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 57 | 68,42 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 126 67,26 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA | 64,37 % | 6,90 % | 21,84 % | 1,15 % | 2,30 % | 3,45 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,10 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEDIATRIA DE AREA ZAMORA | 51 | 66,23 % | 77 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 17 | 70,59 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 28 | 85,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 37 | 48,65 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 82 | 66,23 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PEDIATRIA DE AREA ZAMORA | 70,69 % | 10,34 % | 5,17 % | 3,45 % | 1,72 % | 8,62 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,10 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEDROSILLO EL RALO | 23 | 76,67 % | 30 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 17 | 70,59 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 17 | 76,47 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 38 76,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--|--|--------------------|
| PEDROSILLO EL RALO | 57,14 % | 28,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 7,14 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEÑAFIEL | 127 | 69,78 % | 182 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 58 | 15,52 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 83 | 86,75 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 7 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 72 | 80,56 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 220 | 69,78 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PEÑAFIEL | 69,01 % | 2,82 % | 7,75 % | 0,70 % | 19,72 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 140 | 80,46 % | 174 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 35 | 42,86 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 49 | 83,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 107 | 85,05 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 191 80,46 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 72,67 % | 3,33 % | 10,67 % | 4,00 % | 9,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

PERIURBANA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PERIURBANA NORTE | 166 | 61,71 % | 269 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 58 | 34,48 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 58 | 89,66 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 166 | 59,04 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 284 61,71 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PERIURBANA NORTE | 68,02 % | 16,28 % | 9,30 % | 0,58 % | 5,81 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PERIURBANA SUR | 151 | 49,03 % | 308 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 119 | 8,40 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 57 | 77,19 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 28 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 145 | 72,41 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 349 49,03 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--|--------------------|
| PERIURBANA SUR | 94,16 % | 3,25 % | 0,65 % | 1,95 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PIEDRAHITA | 45 | 71,43 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 24 | 79,17 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 7 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 42 | 52,38 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 73 | 71,43 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PIEDRAHITA | 75,51 % | 6,12 % | 8,16 % | 10,20 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PILARICA | 147 | 62,03 % | 237 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 99 | 39,39 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 42 | 90,48 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 19 | 5,26 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 98 | 76,53 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 258 |
| | | | 62,03 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PILARICA | 68,59 % | 17,95 % | 8,97 % | 1,28 % | 3,21 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PINARES-COVALEDA | 50 | 84,75 % | 59 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 40,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 27 | 85,19 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 26 | 92,31 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 68 | 84,75 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PINARES-COVALEDA | 66,10 % | 16,95 % | 1,69 % | 1,69 % | 8,47 % | 5,08 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PINTOR OLIVA | 360 | 73,92 % | 487 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 97 | 18,56 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 365 | 84,11 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 81 | 60,49 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 545 |
| | | | 73,92 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|
| PINTOR OLIVA | 35,51 % | 23,13 % | 3,74 % | 0,47 % | 0,47 % | 3,50 % | 33,18 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PISUERGA | 490 | 56,45 % | 868 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 125 | 41,60 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 123 | 85,37 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 14 | 7,14 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 652 | 52,15 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 914 56,45 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PISUERGA | 46,02 % | 42,05 % | 5,30 % | 0,19 % | 0,38 % | 6,06 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,74 % | 10,41 % |

PIZARRALES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PIZARRALES | 117 | 61,58 % | 190 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 21 | 52,38 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 61 | 68,85 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 123 | 56,10 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 205 | 61,58 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| PIZARRALES | 42,40 % | 46,40 % | 4,80 % | 0,80 % | 5,60 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

PLAZA DEL EJERCITO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PLAZA DEL EJERCITO | 61 | 27,23 % | 224 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 17 | 17,65 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 24 | 87,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 190 | 20,00 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 235 27,23 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PLAZA DEL EJERCITO | 25,00 % | 64,06 % | 6,25 % | 4,69 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PONFERRADA I | 277 | 73,47 % | 377 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 52 | 44,23 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 131 | 83,97 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 51 | 7,84 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 178 | 85,96 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 412 | 73,47 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PONFERRADA I | 79,52 % | 0,34 % | 8,87 % | 1,37 % | 0,34 % | 9,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

PONFERRADA II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PONFERRADA II | 196 | 68,06 % | 288 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 108 | 35,19 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 120 | 85,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 6 | 16,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 83 | 73,49 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 317 68,06 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PONFERRADA II | 50,47 % | 5,14 % | 19,63 % | 1,87 % | 11,68 % | 11,21 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

PONFERRADA III

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PONFERRADA III | 113 | 70,63 % | 160 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 32 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 85 | 84,71 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 49 | 77,55 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 169 70,63 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------------|
| PONFERRADA III | 56,67 % | 5,00 % | 13,33 % | 3,33 % | 1,67 % | 19,17 % | 0,83 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % | 0,01 % |

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PONFERRADA IV | 141 | 70,15 % | 201 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 42 | 21,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 86 | 87,21 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 87 | 73,56 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 218 | 70,15 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PONFERRADA IV | 51,59 % | 10,19 % | 14,01 % | 0,64 % | 2,55 % | 21,02 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PORRILLO | 28 | 53,85 % | 52 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 25 | 20,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 90,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 83,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 55 | 53,85 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PORRILLO | 54,84 % | 25,81 % | 16,13 % | 3,23 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PUENTE DOMINGO FLOREZ | 9 | 81,82 % | 11 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 9 | 88,89 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 12 | 81,82 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| PUENTE DOMINGO FLOREZ | 53,85 % | 15,38 % | 7,69 % | 23,08 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

PUERTA NUEVA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PUERTA NUEVA | 211 | 55,38 % | 381 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 97 | 51,55 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 39 | 87,18 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 7 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 285 | 50,18 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 428 | 55,38 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| PUERTA NUEVA | 71,13 % | 9,62 % | 7,95 % | 3,77 % | 0,42 % | 7,11 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 47 | 78,33 % | 60 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 27 | 55,56 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 25 | 84,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 19 | 68,42 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 72 | 78,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 52,54 % | 1,69 % | 11,86 % | 6,78 % | 27,12 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

RIAÑO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RIAÑO | 13 | 68,42 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 9 | 66,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 7 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 22 | 68,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| RIAÑO | 42,86 % | 14,29 % | 7,14 % | 7,14 % | 28,57 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RIAZA | 46 | 68,66 % | 67 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 24 | 41,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 22 | 86,36 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 25 | 68,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 72 | 68,66 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| RIAZA | 61,22 % | 2,04 % | 22,45 % | 4,08 % | 10,20 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RIBERA DEL ESLA | 15 | 75,00 % | 20 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 62,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 11 | 81,82 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 25 | 75,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| RIBERA DEL ESLA | 42,11 % | 10,53 % | 10,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 26,32 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RIBERA DEL ORBIGO | 149 | 47,15 % | 316 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 60 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 122 | 77,05 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 178 | 26,40 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 361 | 47,15 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| RIBERA DEL ORBIGO | 71,79 % | 5,13 % | 17,31 % | 5,77 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

ROA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ROA | 94 | 72,87 % | 129 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 70 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 39 | 87,18 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 43 | 83,72 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 153 72,87 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| ROA | 61,40 % | 16,67 % | 10,53 % | 0,88 % | 10,53 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ROBLEDA | 16 | 84,21 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 5 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 13 | 84,62 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 21 | 84,21 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| ROBLEDA | 58,82 % | 35,29 % | 5,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RONDILLA I | 45 | 60,81 % | 74 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 23 | 30,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 16 | 93,75 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 38 | 63,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 77 | 60,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| RONDILLA I | 50,00 % | 41,30 % | 2,17 % | 6,52 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| RONDILLA II | 65 | 61,90 % | 105 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 30 | 26,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 90,48 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 5 | 20,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 56 | 71,43 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 112 | 61,90 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| RONDILLA II | 58,82 % | 30,88 % | 4,41 % | 5,88 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SACRAMENIA | 1 | 20,00 % | 5 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 5 | 20,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|--|
| SACRAMENIA | 100,00 % |
| TOTAL GAP | 8,34 % |

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAHAGUN | 67 | 72,83 % | 92 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 24 | 45,83 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 30 | 83,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 58 | 77,59 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 112 | 72,83 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| SAHAGUN | 52,63 % | 3,95 % | 10,53 % | 3,95 % | 1,32 % | 27,63 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

SALAS DE LOS INFANTES
Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAS DE LOS INFANTES | 28 | 63,64 % | 44 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 60,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 17 | 64,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 56,25 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 48 | 63,64 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| SALAS DE LOS INFANTES | 74,19 % | 12,90 % | 12,90 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALDAÑA | 100 | 80,00 % | 125 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 21 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 93 | 79,57 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 30 | 76,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 144 | 80,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SALDAÑA | 43,70 % | 41,18 % | 7,56 % | 7,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN AGUSTIN | 208 | 54,88 % | 379 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 54 | 35,19 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 55 | 80,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 292 | 51,03 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 401 | 54,88 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SAN AGUSTIN | 35,87 % | 56,50 % | 5,38 % | 0,45 % | 1,79 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN ANDRES DEL RABANEDO | 189 | 62,58 % | 302 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 56 | 33,93 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 78 | 80,77 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 186 | 60,22 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 323 | 62,58 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SAN ANDRES DEL RABANEDO | 76,26 % | 15,15 % | 2,53 % | 1,52 % | 4,55 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 69 | 71,13 % | 97 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 54 | 51,85 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 41 | 85,37 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 72,22 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 113 | 71,13 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 31,65 % | 12,66 % | 10,13 % | 1,27 % | 1,27 % | 43,04 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

SAN ILDEFONSO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-02 | 2025-08 |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN ILDEFONSO | 1 | 50,00 % | 2 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 2 | 50,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|
| SAN ILDEFONSO | 100,00 % |
| TOTAL GAP | 8,34 % |

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN JOSE | 71 | 46,71 % | 152 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 44 | 38,64 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 21 | 66,67 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 93 | 44,09 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 159 | 46,71 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SAN JOSE | 66,22 % | 21,62 % | 9,46 % | 1,35 % | 1,35 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN JUAN | 57 | 57,58 % | 99 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 85,71 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 22 | 90,91 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 77 | 41,56 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 106 | 57,58 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SAN JUAN | 75,81 % | 11,29 % | 11,29 % | 1,61 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN LEONARDO DE YAGUE | 62 | 72,09 % | 86 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 35 | 57,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 43 | 81,40 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 19 | 63,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 98 72,09 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SAN LEONARDO DE YAGUE | 39,44 % | 5,63 % | 19,72 % | 1,41 % | 33,80 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN PABLO | 62 | 72,09 % | 86 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 13 | 53,85 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 51 | 68,63 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 28 | 82,14 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 94 |
| | | | 72,09 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SAN PABLO | 55,22 % | 17,91 % | 1,49 % | 25,37 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | 11 | 57,89 % | 19 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 10 | 60,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 3 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 21 | 57,89 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN |
|--|---|---|---|--|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | 75,00 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAN PEDRO MANRIQUE | 17 | 73,91 % | 23 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 16 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 9 | 66,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 29 | 73,91 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| SAN PEDRO MANRIQUE | 47,62 % | 19,05 % | 33,33 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SANTA CLARA | 144 | 65,75 % | 219 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 14 | 35,71 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 100 | 77,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 120 | 56,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 234 | 65,75 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SANTA CLARA | 23,93 % | 67,48 % | 4,91 % | 3,68 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SANTA ELENA | 138 | 71,50 % | 193 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 39 | 74,36 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 46 | 78,26 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 115 | 66,09 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 200 | 71,50 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SANTA ELENA | 86,21 % | 3,45 % | 4,83 % | 0,69 % | 4,83 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SANTA MARIA | 93 | 72,09 % | 129 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 35 | 37,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 68 | 79,41 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 49 | 65,31 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 152 | 72,09 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SANTA MARIA | 67,35 % | 7,14 % | 10,20 % | 2,04 % | 13,27 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SANTA MARTA | 132 | 62,86 % | 210 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 49 | 55,10 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 47 | 85,11 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 135 | 54,07 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 232 | 62,86 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SANTA MARTA | 74,29 % | 2,14 % | 15,00 % | 8,57 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SAYAGO | 27 | 58,70 % | 46 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 6 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 83,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 29 | 58,62 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 47 | 58,70 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SAYAGO | 65,52 % | 3,45 % | 27,59 % | 3,45 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

SEDANO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-08 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEDANO | 2 | 100,00 % | 2 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 2 | 100,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|
| SEDANO | 50,00 % | 50,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % |

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEGOVIA I | 214 | 65,24 % | 328 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 57 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 168 | 86,31 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 145 | 37,93 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 370 | 65,24 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| SEGOVIA I | 81,53 % | 4,05 % | 4,95 % | 1,35 % | 0,45 % | 7,66 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 0,10 % | 10,41 % |

SEGOVIA II

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEGOVIA II | 176 | 53,33 % | 330 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 62 | 33,87 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 116 | 66,38 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 177 | 48,02 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 356 | 53,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SEGOVIA II | 71,89 % | 7,03 % | 6,49 % | 4,86 % | 9,73 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,10 % | 10,41 % |

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEGOVIA III | 149 | 55,81 % | 267 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 71 | 39,44 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 79 | 79,75 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 138 | 45,65 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 289 | 55,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SEGOVIA III | 62,73 % | 21,74 % | 7,45 % | 8,07 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEGOVIA RURAL | 189 | 64,73 % | 292 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 59 | 42,37 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 181 | 79,56 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 68 | 32,35 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 310 | 64,73 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SEGOVIA RURAL | 75,88 % | 6,03 % | 4,02 % | 1,01 % | 13,07 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SEPULVEDA | 47 | 82,46 % | 57 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 10 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 36 | 97,22 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 55,56 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 64 | 82,46 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SEPULVEDA | 76,92 % | 1,92 % | 17,31 % | 3,85 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

SERRADA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-05 |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SERRADA | | | 1 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 1 | |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

SORIA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SORIA NORTE | 163 | 56,99 % | 286 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 51 | 35,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 92 | 80,43 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 163 | 48,47 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 306 | 56,99 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| SORIA NORTE | 78,61 % | 10,98 % | 8,67 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,74 % | 10,41 % |

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SORIA RURAL | 83 | 61,94 % | 134 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 26 | 38,46 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 79 | 75,95 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 36 | 44,44 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 141 | 61,94 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SORIA RURAL | 84,09 % | 3,41 % | 6,82 % | 2,27 % | 3,41 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SORIA SUR | 136 | 60,71 % | 224 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 60 | 23,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 136 | 72,79 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 44 | 54,55 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 240 | 60,71 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| SORIA SUR | 79,86 % | 8,63 % | 9,35 % | 0,72 % | 1,44 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SORIA TARDE | 43 | 68,25 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 11 | 27,27 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 39 | 79,49 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 13 | 69,23 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 63 | 68,25 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SORIA TARDE | 88,64 % | 4,55 % | 4,55 % | 2,27 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SOTILLO DE LA ADRADA | 124 | 58,77 % | 211 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 47 | 25,53 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 95 | 73,68 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 89 | 49,44 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 232 | 58,77 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| SOTILLO DE LA ADRADA | 49,25 % | 5,97 % | 22,39 % | 2,24 % | 0,75 % | 19,40 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SUR | 161 | 45,10 % | 357 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 96 | 42,71 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 24 | 62,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 3 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 253 | 42,29 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 376 45,10 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| SUR | 33,14 % | 63,37 % | 1,74 % | 1,74 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

TABARA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TABARA | 31 | 73,81 % | 42 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 78,57 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 22 | 77,27 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 49 | 73,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--|--------------------|
| TABARA | 48,78 % | 24,39 % | 4,88 % | 21,95 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TAMAMES | 11 | 84,62 % | 13 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 4 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 6 | 83,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 13 | 84,62 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--|--------------------|
| TAMAMES | 50,00 % | 8,33 % | 41,67 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TEJARES | 134 | 44,67 % | 300 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 16 | 31,25 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 87 | 43,68 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 83 | 28,92 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 140 | 49,29 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 326 | 44,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| TEJARES | 73,19 % | 0,72 % | 2,90 % | 23,19 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TORDESILLAS | 72 | 47,06 % | 153 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 37 | 29,73 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 49 | 85,71 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 76 | 30,26 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 162 | 47,06 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01MA / FLUOROQUINOLONAS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------------|
| TORDESILLAS | 53,75 % | 22,50 % | 15,00 % | 1,25 % | 1,25 % | 5,00 % | 1,25 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % | 0,01 % |

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TORENO | 19 | 73,08 % | 26 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 28,57 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 83,33 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 8 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 28 73,08 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| TORENO | 85,00 % | 10,00 % | 5,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

TORO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TORO | 96 | 24,12 % | 398 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 16 | 31,25 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 83 | 68,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 343 | 10,50 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 442 | 24,12 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| TORO | 74,26 % | 0,99 % | 13,86 % | 0,99 % | 9,90 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TORQUEMADA | 28 | 42,42 % | 66 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 42 | 21,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 78,57 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 16 | 56,25 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 72 | 42,42 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|---|
| TORQUEMADA | 80,65 % | 9,68 % | 9,68 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % |

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TORTOLA | 91 | 45,05 % | 202 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 67 | 19,40 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 81 | 67,90 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 66 | 37,88 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 216 | 45,05 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| TORTOLA | 36,17 % | 62,77 % | 1,06 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--|--------------------|-------------------|----------------|
| TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN | 63 | 63,00 % | 100 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|--------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 21 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 27 | 85,19 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 52 | 50,00 % |
| J36 | J36 Absceso periamigdalino | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 101 63,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
| TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN | 53,73 % | 35,82 % | 4,48 % | 1,49 % | 2,99 % | 1,49 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % | 0,04 % |

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| TUDELA | 148 | 53,05 % | 279 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 42 | 33,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 58 | 82,76 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 214 | 45,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 316 | 53,05 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| TUDELA | 53,94 % | 35,76 % | 5,45 % | 4,85 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD CENTRO | 69 | 77,53 % | 89 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 15,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 62 | 88,71 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 93 | 77,53 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| UNIVERSIDAD CENTRO | 91,30 % | 1,45 % | 2,90 % | 4,35 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALDERAS | 43 | 58,90 % | 73 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 45,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 71,43 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | 50,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 54 | 53,70 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 90 58,90 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| VALDERAS | 52,73 % | 7,27 % | 1,82 % | 10,91 % | 1,82 % | 25,45 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALENCIA DE DON JUAN | 64 | 53,78 % | 119 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 30 | 13,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 35 | 77,14 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 60 | 56,67 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 126 | 53,78 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VALENCIA DE DON JUAN | 42,03 % | 23,19 % | 31,88 % | 2,90 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALLADOLID RURAL I | 156 | 60,00 % | 260 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 38 | 26,32 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 80 | 85,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 16 | 25,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 146 | 56,16 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 280 | 60,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VALLADOLID RURAL I | 54,65 % | 34,30 % | 3,49 % | 7,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALLADOLID RURAL II | 155 | 45,59 % | 340 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 17 | 47,06 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 116 | 82,76 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 222 | 25,23 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 356 | 45,59 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VALLADOLID RURAL II | 47,37 % | 46,20 % | 2,34 % | 4,09 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALLE DE MENA | 73 | 94,81 % | 77 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 75,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 45 | 97,78 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 18 | 94,44 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 83 | 94,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| VALLE DE MENA | 56,63 % | 6,02 % | 18,07 % | 1,20 % | 18,07 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-06 | 2025-07 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALLE DE TOBALINA | 1 | 50,00 % | 2 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|---|----------------|-------------------|
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 2 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 2 50,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA |
|--|--|
| VALLE DE TOBALINA | 100,00 % |
| TOTAL GAP | 8,34 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-06 | 2025-11 |
|----------------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VALLE DE VALDEBEZANA | 3 | 75,00 % | 4 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnóstico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | 100,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 1 | 100,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 5 | 75,00 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--------------------|
| VALLE DE VALDEBEZANA | 50,00 % | 50,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 10,41 % |

VENTA DE BAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VENTA DE BAÑOS | 137 | 64,32 % | 213 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 74 | 35,14 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 94 | 81,91 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 9 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 74 | 60,81 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 251 | 64,32 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VENTA DE BAÑOS | 65,10 % | 13,42 % | 14,09 % | 7,38 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VIDRIALES | 31 | 83,78 % | 37 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 11 | 36,36 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 19 | 89,47 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 14 | 92,86 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 44 | 83,78 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| VIDRIALES | 56,76 % | 24,32 % | 18,92 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLABLINO | 81 | 77,14 % | 105 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 31 | 61,29 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 15 | 86,67 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 13 | 53,85 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 63 | 87,30 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 122 | 77,14 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| VILLABLINO | 40,00 % | 14,00 % | 7,00 % | 1,00 % | 38,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLACASTIN | 20 | 66,67 % | 30 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 3 | 66,67 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 14 | 85,71 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 2 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 14 | 50,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 33 | 66,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|--------------------|
| VILLACASTIN | 95,00 % | 5,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 10,41 % |

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLADA | 28 | 93,33 % | 30 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 7 | 71,43 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 13 | 92,31 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 32 | 93,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| VILLADA | 78,57 % | 10,71 % | 10,71 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLADIEGO | 15 | 71,43 % | 21 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 2 | 50,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 11 | 81,82 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 8 | 62,50 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 21 | 71,43 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VILLADIEGO | 42,11 % | 31,58 % | 21,05 % | 5,26 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLAFRANCA | 43 | 68,25 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 10 | 40,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 37 | 64,86 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 75,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 67 | 68,25 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VILLAFRANCA | 72,34 % | 6,38 % | 12,77 % | 8,51 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLAFRECHOS | 25 | 67,57 % | 37 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 20 | 85,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 15 | 53,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 43 | 67,57 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| VILLAFRECHOS | 85,19 % | 7,41 % | 7,41 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLALON DE CAMPOS | 41 | 74,55 % | 55 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 17 | 41,18 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 24 | 79,17 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 27 | 70,37 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 68 | 74,55 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| VILLALON DE CAMPOS | 70,21 % | 12,77 % | 10,64 % | 2,13 % | 2,13 % | 2,13 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 10,41 % |

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLALPANDO | 23 | 62,16 % | 37 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 12 | 25,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 8 | 100,00 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 20 | 65,00 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 40 | 62,16 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| VILLALPANDO | 53,85 % | 11,54 % | 19,23 % | 3,85 % | 11,54 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLAMURIEL | 103 | 64,78 % | 159 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 27 | 22,22 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 100 | 83,00 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 46 | 39,13 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 174 | 64,78 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| VILLAMURIEL | 72,32 % | 16,07 % | 4,46 % | 0,89 % | 6,25 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,44 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLARCAYO | 35 | 64,81 % | 54 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 15 | 53,33 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 12 | 83,33 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 29 | 65,52 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 56 | 64,81 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--------------------|
| VILLARCAYO | 74,36 % | 5,13 % | 17,95 % | 2,56 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLARRAMIEL | 7 | 46,67 % | 15 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 1 | |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 7 | 71,43 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 9 | 33,33 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 17 | 46,67 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA |
|--|---|---|
| VILLARRAMIEL | 85,71 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % |

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VILLORIA | 58 | 81,69 % | 71 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 27 | 77,78 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 30 | 76,67 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 26 | 69,23 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 83 | 81,69 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| VILLORIA | 66,67 % | 1,52 % | 13,64 % | 1,52 % | 16,67 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 10,41 % |

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VIRGEN CONCHA | 122 | 65,59 % | 186 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 60,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 38 | 68,42 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 134 | 64,18 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 192 | 65,59 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN | J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN | J01FA / MACRÓLIDOS | J01FF / LINCOSAMIDAS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|----------------------|
| VIRGEN CONCHA | 71,11 % | 12,59 % | 5,93 % | 0,74 % | 0,74 % | 8,15 % | 0,74 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,08 % | 0,44 % | 10,41 % | 0,04 % |

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| VITIGUDINO | 19 | 26,39 % | 72 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 8 | 12,50 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 22 | 59,09 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 46 | 13,04 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 76 | 26,39 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| VITIGUDINO | 76,19 % | 9,52 % | 14,29 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ZAMORA NORTE | 47 | 74,60 % | 63 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 20 | 55,00 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 16 | 62,50 % |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 38 | 76,32 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | 74 | 74,60 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|--------------------|
| ZAMORA NORTE | 82,00 % | 8,00 % | 10,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 8,34 % | 10,41 % |

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Faringoamigdalitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico

| Año y mes núm. | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| CGF AP | Nº Pac Faringo J01 | % Pac Faringo J01 | Nº Pac Faringo |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ZAMORA SUR | 48 | 53,33 % | 90 |
| TOTAL GAP | 23.195 | 62,31 % | 37.271 |

| Codigo Diag. | Cod - Diagnostico (CIE) | Nº Pac Faringo | % Pac Faringo J01 |
|---|--|----------------|-------------------|
| J02.9 | J02.9 Faringitis aguda, no especificada | 26 | 34,62 % |
| J03.90 | J03.90 Amigdalitis aguda, no especificada | 16 | 62,50 % |
| J06.0 | J06.0 Laringofaringitis aguda | 1 | |
| J06.9 | J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada | 56 | 51,79 % |
| TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS | | | 99 53,33 % |

| Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de faringoamigdalitis tratados con un antibiótico | J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO | J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAM ASA | J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAM ASA | J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN | J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS | J01FA / MACRÓLIDOS |
|--|---|---|---|--|--|--------------------|
| ZAMORA SUR | 66,00 % | 6,00 % | 16,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 8,00 % |
| TOTAL GAP | 57,83 % | 21,94 % | 8,34 % | 0,74 % | 0,10 % | 10,41 % |