

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
Gerencia AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01	
GAP ÁVILA	420	80,15 %	524	A48.1	Enfermedad de los legionarios						6	83,33 %	
GAP BURGOS	1.156	79,40 %	1.456	J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado						69	85,51 %	
GAP LEÓN	655	71,43 %	917	J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019						51	19,61 %	
GAP EL BIERZO	278	77,65 %	358	J12.9	Neumonía vírica, no especificada						5	20,00 %	
GAP PALENCIA	611	79,45 %	769	J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae						52	86,54 %	
GAP SALAMANCA	725	79,32 %	914	J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae						4	100,00 %	
GAP SEGOVIA	521	82,57 %	631	J15.9	Neumonía bacteriana no especificada						443	84,42 %	
GAP SORIA	278	77,44 %	359	J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado						346	77,17 %	
GAP VALLADOLID OESTE	817	79,55 %	1.027	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado						7.713	79,46 %	
GAP VALLADOLID ESTE	914	83,17 %	1.099	J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito						41	60,98 %	
GAP ZAMORA	525	79,55 %	660	J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos						5	40,00 %	
TOTAL GRS	6.900	79,23 %	8.714	J82.81	Neumonía eosinofílica crónica						19	26,32 %	
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70								TOTAL PACIENTES Neumonía	8.754	79,23 %
GAP ÁVILA	80,25 %	78,89 %	79,64 %										
GAP BURGOS	82,28 %	73,64 %	78,44 %										
GAP LEÓN	75,75 %	65,64 %	70,26 %										
GAP EL BIERZO	79,82 %	78,87 %	75,00 %										
GAP PALENCIA	82,03 %	78,43 %	77,62 %										
GAP SALAMANCA	81,03 %	77,63 %	78,56 %										
GAP SEGOVIA	81,42 %	86,67 %	81,53 %										
GAP SORIA	75,51 %	83,08 %	76,26 %										
GAP VALLADOLID OESTE	84,36 %	80,98 %	72,84 %										
GAP VALLADOLID ESTE	85,52 %	83,57 %	81,46 %										
GAP ZAMORA	80,93 %	71,30 %	81,02 %										
TOTAL GRS	81,76 %	77,57 %	77,56 %										

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMA SA	COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01DB / CEFALOSPORINA S DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINA S DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINA S DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPIRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA	0,21 %	8,06 %			20,87 %	0,41 %	2,69 %	17,15 %	2,07 %	12,19 %	1,03 %	0,21 %	34,92 %	0,21 %
GAP BURGOS	0,51 %	6,19 %	0,07 %		26,00 %	0,07 %	2,91 %	28,19 %	1,38 %	12,67 %	0,29 %		21,70 %	
GAP LEÓN		6,54 %		0,14 %	21,70 %		6,95 %	9,18 %	2,92 %	7,79 %	1,39 %		43,39 %	
GAP EL BIERZO	0,57 %	4,30 %			38,40 %	0,86 %	2,58 %	5,44 %	1,43 %	17,48 %	1,15 %		27,79 %	
GAP PALENCIA		5,89 %			22,72 %		1,82 %	17,25 %	1,26 %	11,22 %	1,26 %		38,43 %	0,14 %
GAP SALAMANCA	0,12 %	8,90 %			22,72 %	0,12 %	3,04 %	17,45 %	1,05 %	14,75 %	0,94 %		30,80 %	0,12 %
GAP SEGOVIA	0,47 %	6,20 %			25,89 %		1,40 %	17,05 %	1,71 %	15,35 %	1,71 %		30,23 %	
GAP SORIA		16,67 %			29,32 %		3,09 %	22,84 %	1,54 %	8,95 %		0,31 %	17,28 %	
GAP VALLADOLID OESTE	0,59 %	9,50 %	0,30 %		22,06 %	0,10 %	2,27 %	16,42 %	0,69 %	18,50 %	2,18 %		27,40 %	
GAP VALLADOLID ESTE	0,54 %	5,80 %	0,09 %		20,49 %		1,99 %	22,39 %	1,18 %	15,41 %	1,72 %		30,28 %	0,09 %
GAP ZAMORA	0,15 %	6,99 %			31,16 %		2,13 %	19,76 %	1,22 %	17,48 %	0,30 %		20,82 %	
TOTAL GRS	0,33 %	7,34 %	0,06 %	0,01 %	24,54 %	0,10 %	2,78 %	18,88 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	0,02 %	29,30 %	0,05 %

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

BURGO DE OSMA	15	57,69 %	26
BURGOHONDO	19	82,61 %	23
BURGOS RURAL NORTE	25	86,21 %	29
BURGOS RURAL SUR	44	74,58 %	59
CACABELOS	32	82,05 %	39
CALZADA DE VALDUNCIEL	1	33,33 %	3
CAMARZANA DE TERA	16	76,19 %	21
CAMPOS LAMPREANA	3	50,00 %	6
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	19	86,36 %	22
CANDELEDA	30	88,24 %	34
CANTALAPIEDRA	2	66,67 %	3
CANTALEJO	47	88,68 %	53
CANTERAC	35	81,40 %	43
CAPUCHINOS	18	69,23 %	26
CARBAJALES DE ALBA	6	100,00 %	6
CARBALLEDA	26	92,86 %	28
CARBONERO	45	83,33 %	54
CARRION DE LOS CONDES	20	80,00 %	25
CASA DEL BARCO	47	62,67 %	75
CEBREROS	25	89,29 %	28
CENTRO-GAMAZO	68	83,95 %	81
CERVERA DE PISUERGA	20	74,07 %	27
CIGALES	18	66,67 %	27
CIRCULAR	41	85,42 %	48
CIRCUNVALACION	52	86,67 %	60
CISTIERTA	19	79,17 %	24
CIUDAD RODRIGO	65	91,55 %	71
CONDADO DE TREVIÑO	7	70,00 %	10
CONDESA	36	58,06 %	62
CORRALES	15	93,75 %	16
CRISTOBAL ACOSTA	34	70,83 %	48
CRUCERO	24	75,00 %	32
CUELLAR	85	81,73 %	104
CUENCA DEL BERNESGA	16	61,54 %	26
DELICIAS I	84	84,85 %	99
DELICIAS II	73	83,91 %	87
DESCONOCIDO	2	66,67 %	3
EL EJIDO	58	81,69 %	71
EL ESPINAR	27	84,38 %	32
ERAS DEL BOSQUE	61	72,62 %	84
ESGUEVILLAS	4	80,00 %	5
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	11	84,62 %	13
FABERO	15	75,00 %	20

FONTIVEROS	10	100,00 %	10
FROMISTA	24	80,00 %	30
FUENTEGUINALDO	2	50,00 %	4
FUENTESAUCO	5	83,33 %	6
FUENTES DE OÑORO	1	100,00 %	1
GAMONAL-ANTIGUA	40	71,43 %	56
GARCIA LORCA	47	75,81 %	62
GARRIDO NORTE	37	67,27 %	55
GARRIDO SUR	43	75,44 %	57
GOMARA	5	100,00 %	5
GREDOS	6	85,71 %	7
GUARDO	75	91,46 %	82
GUAREÑA	18	85,71 %	21
GUIJUELO	42	85,71 %	49
HERRERA DE PISUERGA	22	73,33 %	30
HUERTA DEL REY	80	84,21 %	95
HUERTA DE REY	7	100,00 %	7
IGNACIO LOPEZ SAIZ	48	80,00 %	60
ISCAR	30	93,75 %	32
JARDINILLOS	62	73,81 %	84
JOSE AGUADO	47	74,60 %	63
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	67	81,71 %	82
LA ALAMEDILLA	56	75,68 %	74
LA ALBERCA	10	71,43 %	14
LA CABRERA			1
LA FUENTE SAN ESTEBAN	7	70,00 %	10
LAGUNA DE DUERO	75	76,53 %	98
LA MAGDALENA	9	75,00 %	12
LANZAHITA	12	75,00 %	16
LA PALOMERA	50	66,67 %	75
LA PUEBLA	85	75,89 %	112
LAS HUELGAS	31	77,50 %	40
LA SIERRA	13	81,25 %	16
LAS NAVAS DEL MARQUES	10	71,43 %	14
LAS TORRES	60	89,55 %	67
LA VICTORIA	67	83,75 %	80
LEDESMA	10	83,33 %	12
LERMA	22	84,62 %	26
LINARES DE RIOFRIO	3	100,00 %	3
LOS COMUNEROS	38	60,32 %	63
LOS CUBOS	27	84,38 %	32
LUMBRALES	6	75,00 %	8
MADRIGAL ALTAS TORRES	10	83,33 %	12
MAGDALENA	34	80,95 %	42
MANSILLA DE LAS MULAS	6	60,00 %	10

MATALLANA DE TORIO	6	66,67 %	9
MATILLA DE LOS CAÑOS	3	75,00 %	4
MAYORGA DE CAMPOS	10	71,43 %	14
MEDINA DEL CAMPO RURAL	47	87,04 %	54
MEDINA DEL CAMPO URBANO	76	87,36 %	87
MEDINA DE POMAR	16	84,21 %	19
MEDINA DE RIOSECO	37	75,51 %	49
MELGAR DE FERNAMENTAL	8	66,67 %	12
MIGUEL ARMIJO	27	71,05 %	38
MIRANDA DEL CASTAÑAR	7	77,78 %	9
MIRANDA ESTE	88	89,80 %	98
MIRANDA OESTE	113	80,71 %	140
MOMBELTRAN	12	92,31 %	13
MOTA DEL MARQUES	6	85,71 %	7
MUÑANA	4	80,00 %	5
NAVA DE LA ASUNCION	24	80,00 %	30
OLMEDO	23	79,31 %	29
OLVEGA	14	82,35 %	17
OSORNO	11	84,62 %	13
PALENCIA RURAL	21	80,77 %	26
PAMPLIEGA	6	54,55 %	11
PARADA DE MOLINO	46	85,19 %	54
PAREDES DE NAVA	14	73,68 %	19
PARQUESOL	71	80,68 %	88
PEDROSILLO EL RALO	4	80,00 %	5
PEÑAFIEL	35	76,09 %	46
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	36	83,72 %	43
PERIURBANA NORTE	47	85,45 %	55
PERIURBANA SUR	28	80,00 %	35
PIEDRAHITA	20	80,00 %	25
PILARICA	45	84,91 %	53
PINARES-COVALEDA	16	72,73 %	22
PINTOR OLIVA	76	81,72 %	93
PISUERGA	42	85,71 %	49
PIZARRALES	22	70,97 %	31
PLAZA DEL EJERCITO	70	81,40 %	86
PONFERRADA I	35	70,00 %	50
PONFERRADA II	29	76,32 %	38
PONFERRADA III	24	77,42 %	31
PONFERRADA IV	37	78,72 %	47
PORTILLO	38	86,36 %	44
PUEBLA DE SANABRIA	11	78,57 %	14

PUENTE DOMINGO FLOREZ	3	50,00 %	6
PUERTA NUEVA	43	71,67 %	60
QUINTANAR DE LA SIERRA	11	84,62 %	13
RIAÑO	26	92,86 %	28
RIAZA	9	64,29 %	14
RIBERA DEL ESLA	3	42,86 %	7
RIBERA DEL ORBIGO	22	53,66 %	41
ROA	25	83,33 %	30
ROBLEDA	2	100,00 %	2
RONDILLA I	32	91,43 %	35
RONDILLA II	43	78,18 %	55
SACRAMENIA	4	100,00 %	4
SAHAGUN	7	70,00 %	10
SALAS DE LOS INFANTES	12	75,00 %	16
SALDAÑA	21	91,30 %	23
SAN AGUSTIN	53	74,65 %	71
SAN ANDRES DEL RABANEDO	40	75,47 %	53
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	10	100,00 %	10
SAN ILDEFONSO	20	83,33 %	24
SAN JOSE	22	70,97 %	31
SAN JUAN	27	77,14 %	35
SAN LEONARDO DE YAGUE	13	92,86 %	14
SAN PABLO	49	80,33 %	61
SAN PEDRO DEL ARROYO	4	50,00 %	8
SAN PEDRO MANRIQUE	3	75,00 %	4
SANTA CLARA	31	64,58 %	48
SANTA ELENA	42	76,36 %	55
SANTA MARIA	18	78,26 %	23
SANTA MARTA	34	80,95 %	42
SAYAGO	13	72,22 %	18
SEDANO			1
SEGOVIA I	69	87,34 %	79
SEGOVIA II	39	81,25 %	48
SEGOVIA III	41	75,93 %	54
SEGOVIA RURAL	61	84,72 %	72
SEPULVEDA	27	87,10 %	31
SERRADA	37	88,10 %	42
SORIA NORTE	46	69,70 %	66
SORIA RURAL	16	57,14 %	28
SORIA SUR	33	68,75 %	48
SORIA TARDE	10	100,00 %	10
SOTILLO DE LA ADRADA	33	75,00 %	44
SUR	70	82,35 %	85
TABARA	10	71,43 %	14

TAMAMES	5	83,33 %	6
TEJARES	14	82,35 %	17
TORDESILLAS	46	80,70 %	57
TORENO	14	82,35 %	17
TORO	35	74,47 %	47
TORQUEMADA	6	66,67 %	9
TORTOLA	37	82,22 %	45
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	28	60,87 %	46
TUDELA	55	79,71 %	69
UNIVERSIDAD CENTRO	25	78,13 %	32
VALDERAS	8	66,67 %	12
VALENCIA DE DON JUAN	26	68,42 %	38
VALLADOLID RURAL I	23	88,46 %	26
VALLADOLID RURAL II	30	75,00 %	40
VALLE DE LOSA	3	75,00 %	4
VALLE DE MENA	4	57,14 %	7
VALLE DE TOBALINA	17	94,44 %	18
VALLE DE VALDEBEZANA	7	100,00 %	7
VENTA DE BAÑOS	30	76,92 %	39
VIDRIALES	3	75,00 %	4
VILLABLINO	32	78,05 %	41
VILLACASTIN	5	50,00 %	10
VILLADA	2	66,67 %	3
VILLADIEGO	10	66,67 %	15
VILLAFRANCA	21	75,00 %	28
VILLAFRECHOS	10	90,91 %	11
VILLALON DE CAMPOS	4	36,36 %	11
VILLALPANDO	11	84,62 %	13
VILLAMURIEL	14	93,33 %	15
VILLARCAYO	20	83,33 %	24
VILLARRAMIEL	6	60,00 %	10
VILLORIA	11	78,57 %	14
VIRGEN CONCHA	72	84,71 %	85
VITIGUDINO	15	78,95 %	19
ZAMORA NORTE	23	82,14 %	28
ZAMORA SUR	21	77,78 %	27
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA		18,75 %			31,25 %		12,50 %	12,50 %		6,25 %			18,75 %	
AGUILAR DE CAMPOO					17,50 %		5,00 %	17,50 %		10,00 %	2,50 %		47,50 %	
ALAEJOS					20,00 %		10,00 %	30,00 %		10,00 %			30,00 %	
ALBA DE TORMES	3,57 %				14,29 %		7,14 %	35,71 %		7,14 %	3,57 %		28,57 %	
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		5,00 %			15,00 %			10,00 %	15,00 %	10,00 %			45,00 %	
ALISTE		7,14 %			35,71 %		7,14 %	21,43 %		7,14 %			21,43 %	
ALMAZAN		23,08 %			38,46 %			23,08 %					15,38 %	
ALTA SANABRIA								25,00 %		25,00 %			50,00 %	
ANTONIO GUTIERREZ		5,19 %			19,48 %		6,49 %	12,99 %	3,90 %	6,49 %	2,60 %		42,86 %	
ARANDA NORTE		3,70 %			37,04 %			29,63 %	3,70 %	8,64 %			17,28 %	
ARANDA RURAL		4,69 %			25,00 %			32,81 %	1,56 %	6,25 %			29,69 %	
ARANDA SUR		3,08 %			30,77 %		1,54 %	35,38 %	1,54 %	10,77 %			16,92 %	
ARCOS DE JALON		32,53 %			26,51 %			30,12 %		1,20 %			9,64 %	
ARENAS DE SAN PEDRO		21,05 %			10,53 %		5,26 %	10,53 %	2,63 %	28,95 %			21,05 %	
AREVALO		7,50 %			17,50 %		2,50 %	15,00 %	5,00 %	10,00 %	5,00 %		37,50 %	
ARMUNIA					20,69 %		6,90 %	10,34 %		3,45 %	3,45 %		55,17 %	
ARTURO EYRIES		11,84 %	1,32 %		22,37 %		2,63 %	15,79 %		19,74 %	1,32 %		25,00 %	
ASTORGA I		3,45 %			24,14 %		13,79 %	3,45 %	3,45 %	13,79 %			37,93 %	
ASTORGA II					21,43 %		7,14 %	14,29 %		14,29 %			42,86 %	
AVILA ESTACION		14,29 %			17,86 %			8,93 %		12,50 %			46,43 %	
AVILA NORTE		8,82 %			26,47 %		2,94 %	8,82 %	2,94 %	8,82 %			41,18 %	
AVILA RURAL					20,83 %		8,33 %	12,50 %	4,17 %	20,83 %			33,33 %	
AVILA SUR ESTE		2,13 %			38,30 %			17,02 %	2,13 %	10,64 %			27,66 %	2,13 %
AVILA SUR OESTE		4,55 %			18,18 %		4,55 %	27,27 %		13,64 %			31,82 %	
BABIA		20,00 %			40,00 %								40,00 %	
BALTANAS					25,00 %					25,00 %			50,00 %	
BAÑEZA I					37,14 %		2,86 %	5,71 %	5,71 %	5,71 %	2,86 %		40,00 %	
BAÑEZA II		4,55 %			13,64 %		18,18 %	18,18 %	4,55 %				40,91 %	
BARCO DE AVILA					25,00 %			25,00 %		25,00 %			25,00 %	
BARRIO ESPAÑA		5,56 %			16,67 %		5,56 %	5,56 %		27,78 %			38,89 %	
BEJAR		6,67 %			17,78 %		2,22 %	20,00 %		17,78 %			35,56 %	
BELORADO		4,76 %			33,33 %		4,76 %	23,81 %		23,81 %			9,52 %	
BEMBIBRE	3,64 %	3,64 %			36,36 %		3,64 %			27,27 %	1,82 %		23,64 %	
BENAVENTE NORTE		11,29 %			37,10 %			12,90 %	3,23 %	19,35 %			16,13 %	
BENAVENTE SUR		7,46 %			31,34 %		2,99 %	20,90 %	1,49 %	11,94 %			23,88 %	
BERLANGA DE DUERO													100,00 %	
BOÑAR		13,33 %			6,67 %		6,67 %			13,33 %			60,00 %	
BRIVIESCA		4,88 %			39,02 %		2,44 %	24,39 %		7,32 %			21,95 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGO DE OSMA		5,26 %			31,58 %		21,05 %	15,79 %		10,53 %			15,79 %	
BURGOHONDO					19,05 %			23,81 %		9,52 %			47,62 %	
BURGOS RURAL NORTE		10,00 %			20,00 %		3,33 %	33,33 %	3,33 %	10,00 %			20,00 %	
BURGOS RURAL SUR		5,56 %			20,37 %			27,78 %		11,11 %			35,19 %	
CACABELOS		5,26 %			39,47 %		2,63 %	2,63 %	5,26 %	13,16 %	2,63 %		28,95 %	
CALZADA DE VALDUNCIEL													100,00 %	
CAMARZANA DE TERA		15,00 %			15,00 %			30,00 %		35,00 %			5,00 %	
CAMPOS LAMPREANA					40,00 %			20,00 %		20,00 %			20,00 %	
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS		4,76 %			23,81 %			23,81 %		4,76 %			42,86 %	
CANDELEDA		3,03 %			3,03 %	6,06 %	3,03 %	45,45 %	3,03 %	12,12 %	3,03 %		21,21 %	
CANTALAPIEDRA								100,00 %						
CANTALEJO	3,57 %	21,43 %			21,43 %			5,36 %	3,57 %	10,71 %			33,93 %	
CANTERAC	5,00 %	7,50 %			25,00 %			15,00 %	2,50 %	10,00 %	5,00 %		30,00 %	
CAPUCHINOS		8,70 %			30,43 %		8,70 %	13,04 %		17,39 %			21,74 %	
CARBAJALES DE ALBA					12,50 %			37,50 %		12,50 %			37,50 %	
CARBALLEDA		17,86 %			64,29 %			3,57 %		7,14 %			7,14 %	
CARBONERO	1,75 %	1,75 %			26,32 %		3,51 %	17,54 %	1,75 %	19,30 %			28,07 %	
CARRION DE LOS CONDES		14,29 %			19,05 %			19,05 %			4,76 %		42,86 %	
CASA DEL BARCO		6,78 %			27,12 %		3,39 %	18,64 %		18,64 %			25,42 %	
CEBREROS	3,57 %	14,29 %			21,43 %		3,57 %	14,29 %	7,14 %	7,14 %	3,57 %		25,00 %	
CENTRO-GAMAZO	1,23 %	4,94 %			19,75 %		1,23 %	20,99 %	1,23 %	14,81 %	1,23 %		34,57 %	
CERVERA DE PISUERGA		16,00 %			36,00 %			12,00 %	4,00 %	8,00 %	4,00 %		20,00 %	
CIGALES					17,39 %			34,78 %	4,35 %	13,04 %	4,35 %		26,09 %	
CIRCULAR		2,04 %			28,57 %		2,04 %	20,41 %		20,41 %	2,04 %		24,49 %	
CIRCUNVALACION		11,11 %			17,46 %		1,59 %	17,46 %	1,59 %	17,46 %			33,33 %	
CISTIERRA		9,52 %			23,81 %			4,76 %		4,76 %	4,76 %		52,38 %	
CIUDAD RODRIGO		8,33 %			31,94 %			12,50 %	1,39 %	6,94 %	1,39 %		37,50 %	
CONDADO DE TREVIÑO		22,22 %			11,11 %			22,22 %		33,33 %			11,11 %	
CONDESA		4,88 %			21,95 %			9,76 %	4,88 %	2,44 %			56,10 %	
CORRALES					15,79 %		10,53 %	15,79 %		21,05 %			36,84 %	
CRISTOBAL ACOSTA		7,50 %			15,00 %			32,50 %		20,00 %			25,00 %	
CRUCERO		11,54 %			15,38 %		3,85 %	11,54 %		7,69 %	3,85 %		46,15 %	
CUELLAR		0,93 %			44,86 %		0,93 %	13,08 %	0,93 %	15,89 %	1,87 %		21,50 %	
CUENCA DEL BERNESGA		5,56 %			27,78 %		16,67 %	5,56 %	11,11 %	11,11 %			22,22 %	
DELICIAS I	0,96 %	7,69 %	0,96 %		19,23 %		4,81 %	13,46 %		23,08 %	0,96 %		28,85 %	
DELICIAS II	5,38 %	9,68 %			26,88 %		2,15 %	16,13 %		20,43 %	2,15 %		17,20 %	
DESCONOCIDO					66,67 %					33,33 %				
EL EJIDO		8,47 %			25,42 %		5,08 %	6,78 %	1,69 %	5,08 %			47,46 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DB / CEFALOSPIRINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
EL ESPINAR					19,35 %			25,81 %	3,23 %	9,68 %			41,94 %	
ERAS DEL BOSQUE		1,39 %			11,11 %			20,83 %		12,50 %			54,17 %	
ESGUEVILLAS					33,33 %			33,33 %		16,67 %			16,67 %	
ESPINOSA DE LOS MONTEROS		15,38 %			30,77 %			7,69 %		7,69 %			38,46 %	
FABERO		5,88 %			29,41 %		11,76 %	11,76 %		17,65 %			23,53 %	
FONTIVEROS		36,36 %			9,09 %			18,18 %				9,09 %	27,27 %	
FROMISTA		3,70 %			29,63 %			7,41 %	7,41 %	7,41 %	3,70 %		40,74 %	
FUENTEGUINALDO													100,00 %	
FUENTESAUCO					33,33 %					16,67 %			50,00 %	
FUENTES DE OÑORO					100,00 %									
GAMONAL-ANTIGUA	2,13 %	6,38 %			19,15 %		6,38 %	31,91 %	2,13 %	10,64 %			21,28 %	
GARCIA LORCA		5,77 %			21,15 %			34,62 %	1,92 %	15,38 %			21,15 %	
GARRIDO NORTE		4,65 %			32,56 %		4,65 %	25,58 %		9,30 %	2,33 %		20,93 %	
GARRIDO SUR		10,20 %			28,57 %		4,08 %	20,41 %		10,20 %			26,53 %	
GOMARA					20,00 %			40,00 %	20,00 %				20,00 %	
GREDOS					16,67 %		16,67 %	16,67 %					50,00 %	
GUARDO		11,76 %			28,24 %		2,35 %	14,12 %		9,41 %	1,18 %		32,94 %	
GUAREÑA		10,53 %			31,58 %			36,84 %		5,26 %			15,79 %	
GUIJUELO		2,04 %			20,41 %	2,04 %		8,16 %		22,45 %			44,90 %	
HERRERA DE PISUERGA		4,35 %			17,39 %			30,43 %	4,35 %	8,70 %			34,78 %	
HUERTA DEL REY		9,47 %			21,05 %		2,11 %	17,89 %		16,84 %	3,16 %		29,47 %	
HUERTA DE REY					30,00 %			40,00 %		10,00 %			20,00 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ	1,64 %	4,92 %			27,87 %		4,92 %	27,87 %		14,75 %			18,03 %	
ISCAR		2,86 %			31,43 %			17,14 %	2,86 %	22,86 %			20,00 %	2,86 %
JARDINILLOS		8,97 %			21,79 %		3,85 %	11,54 %	1,28 %	12,82 %	1,28 %		37,18 %	1,28 %
JOSE AGUADO					18,75 %		14,58 %	8,33 %	6,25 %		2,08 %		50,00 %	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		7,41 %			20,99 %			34,57 %	1,23 %	16,05 %			19,75 %	
LA ALAMEDILLA	1,52 %	13,64 %			22,73 %		4,55 %	10,61 %		18,18 %	1,52 %		27,27 %	
LA ALBERCA		10,00 %			20,00 %		10,00 %	10,00 %		10,00 %			40,00 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN		12,50 %			12,50 %			37,50 %					37,50 %	
LAGUNA DE DUERO		7,69 %	1,10 %		24,18 %		2,20 %	13,19 %	1,10 %	17,58 %	1,10 %		31,87 %	
LA MAGDALENA					10,00 %	30,00 %							60,00 %	
LANZAHITA		8,33 %			58,33 %			8,33 %		8,33 %			16,67 %	
LA PALOMERA		13,56 %			15,25 %		5,08 %	10,17 %		11,86 %			44,07 %	
LA PUEBLA		5,94 %			17,82 %		1,98 %	18,81 %	1,98 %	9,90 %	0,99 %		42,57 %	
LAS HUELGAS		7,32 %			24,39 %		2,44 %	24,39 %	7,32 %	17,07 %			17,07 %	
LA SIERRA		12,50 %			18,75 %			12,50 %	12,50 %	12,50 %			31,25 %	
LAS NAVAS DEL MARQUES		20,00 %			10,00 %			10,00 %		20,00 %			40,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS TORRES	1,39 %	6,94 %			30,56 %		5,56 %	22,22 %	1,39 %	13,89 %			18,06 %	
LA VICTORIA		4,82 %			25,30 %		2,41 %	14,46 %	1,20 %	16,87 %	4,82 %		30,12 %	
LEDESMA					27,27 %		9,09 %	27,27 %		27,27 %			9,09 %	
LERMA		8,70 %			13,04 %			52,17 %		4,35 %			21,74 %	
LINARES DE RIOFRIO								75,00 %		25,00 %				
LOS COMUNEROS	2,22 %	4,44 %	2,22 %		31,11 %		4,44 %	26,67 %	2,22 %	13,33 %			13,33 %	
LOS CUBOS	3,13 %				15,63 %			34,38 %		25,00 %			21,88 %	
LUMBRALES		11,11 %					11,11 %	11,11 %		22,22 %			44,44 %	
MADRIGAL ALTAS TORRES		7,14 %			21,43 %		7,14 %	14,29 %		14,29 %	7,14 %		28,57 %	
MAGDALENA		10,00 %			7,50 %		5,00 %	27,50 %		17,50 %			32,50 %	
MANSILLA DE LAS MULAS					28,57 %								71,43 %	
MATALLANA DE TORIO		16,67 %					16,67 %						66,67 %	
MATILLA DE LOS CAÑOS							25,00 %	50,00 %					25,00 %	
MAYORGA DE CAMPOS		9,09 %			27,27 %		9,09 %	18,18 %					36,36 %	
MEDINA DEL CAMPO RURAL		9,09 %			27,27 %		1,82 %	18,18 %		9,09 %	1,82 %		32,73 %	
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,98 %	4,90 %			15,69 %		1,96 %	27,45 %		18,63 %	1,96 %		28,43 %	
MEDINA DE POMAR		5,88 %			11,76 %		5,88 %	17,65 %		17,65 %	5,88 %		35,29 %	
MEDINA DE RIOSECO		10,64 %			17,02 %		2,13 %	19,15 %		27,66 %	4,26 %		19,15 %	
MELGAR DE FERNAMENTAL					11,11 %			44,44 %		11,11 %			33,33 %	
MIGUEL ARMIVO		25,00 %			22,22 %			11,11 %		22,22 %			19,44 %	
MIRANDA DEL CASTAÑAR					12,50 %			12,50 %		12,50 %			62,50 %	
MIRANDA ESTE		10,91 %			29,09 %	0,91 %	6,36 %	16,36 %	0,91 %	10,00 %	0,91 %		24,55 %	
MIRANDA OESTE	1,59 %	8,73 %			26,19 %		7,94 %	21,43 %	2,38 %	9,52 %	1,59 %		20,63 %	
MOMBELTRAN					35,71 %			14,29 %		21,43 %			28,57 %	
MOTA DEL MARQUES					28,57 %			28,57 %		28,57 %			14,29 %	
MUÑANA					25,00 %		25,00 %	25,00 %					25,00 %	
NAVA DE LA ASUNCION		3,70 %			18,52 %			18,52 %		22,22 %	3,70 %		33,33 %	
OLMEDO		6,45 %			25,81 %			32,26 %		12,90 %			22,58 %	
OLVEGA		17,65 %			23,53 %		5,88 %	17,65 %		23,53 %			11,76 %	
OSORNO					50,00 %			8,33 %		16,67 %			25,00 %	
PALENCIA RURAL		7,69 %			30,77 %			19,23 %		15,38 %	3,85 %		23,08 %	
PAMPLIEGA					33,33 %			33,33 %		22,22 %			11,11 %	
PARADA DE MOLINO		7,14 %			30,36 %			16,07 %		21,43 %			25,00 %	
PAREDES DE NAVA		5,88 %			17,65 %		5,88 %	11,76 %		11,76 %			47,06 %	
PARQUESOL		8,89 %			22,22 %	1,11 %		16,67 %		20,00 %	2,22 %		28,89 %	
PEDROSILLO EL RALO					50,00 %					25,00 %			25,00 %	
PEÑAFIEL		4,65 %			13,95 %		2,33 %	30,23 %	2,33 %	11,63 %	2,33 %		32,56 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		20,41 %			18,37 %		6,12 %	14,29 %		22,45 %			18,37 %	
PERIURBANA NORTE		1,92 %			19,23 %		7,69 %	25,00 %		15,38 %			30,77 %	
PERIURBANA SUR		22,58 %			22,58 %		3,23 %	6,45 %	3,23 %	22,58 %			19,35 %	
PIEDRAHITA		4,55 %			9,09 %			22,73 %		4,55 %			59,09 %	
PILARICA		5,77 %			21,15 %			19,23 %		17,31 %			36,54 %	
PINALES-COVALEDA		17,65 %			23,53 %		5,88 %	29,41 %		5,88 %			17,65 %	
PINTOR OLIVA		2,33 %			20,93 %		2,33 %	24,42 %		10,47 %			39,53 %	
PISUERGA		19,61 %			15,69 %			17,65 %		19,61 %			27,45 %	
PIZARRALES		11,54 %			30,77 %			11,54 %		11,54 %			34,62 %	
PLAZA DEL EJERCITO		8,05 %			20,69 %			21,84 %	3,45 %	16,09 %	2,30 %		27,59 %	
PONFERRADA I					39,02 %	4,88 %	2,44 %	12,20 %		14,63 %	2,44 %		24,39 %	
PONFERRADA II		6,06 %			45,45 %		3,03 %	6,06 %		12,12 %			27,27 %	
PONFERRADA III					48,39 %		3,23 %	6,45 %		19,35 %			22,58 %	
PONFERRADA IV		2,17 %			36,96 %	2,17 %		2,17 %	4,35 %	21,74 %			30,43 %	
PORTILLO		6,38 %			19,15 %		4,26 %	27,66 %	2,13 %	6,38 %			34,04 %	
PUEBLA DE SANABRIA					46,15 %			7,69 %		15,38 %			30,77 %	
PUENTE DOMINGO FLOREZ					66,67 %								33,33 %	
PUERTA NUEVA		7,55 %			24,53 %		3,77 %	13,21 %	1,89 %	24,53 %			24,53 %	
QUINTANAR DE LA SIERRA		25,00 %			33,33 %		8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %			8,33 %	
RIAÑO		9,38 %			28,13 %		3,13 %			21,88 %			37,50 %	
RIAZA		16,67 %			41,67 %		8,33 %			16,67 %			16,67 %	
RIBERA DEL ESLA					33,33 %			33,33 %					33,33 %	
RIBERA DEL ORBIGO		16,00 %			24,00 %		8,00 %	16,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %		24,00 %	
ROA		3,23 %			32,26 %			25,81 %		12,90 %			25,81 %	
ROBLEDA										100,00 %				
RONDILLA I	2,70 %	5,41 %			16,22 %			21,62 %	2,70 %	18,92 %	5,41 %		27,03 %	
RONDILLA II		5,56 %			22,22 %			33,33 %		14,81 %			24,07 %	
SACRAMENIA					40,00 %			20,00 %					40,00 %	
SAHAGUN					57,14 %								42,86 %	
SALAS DE LOS INFANTES		6,67 %			26,67 %			33,33 %		20,00 %			13,33 %	
SALDAÑA		7,14 %			32,14 %		3,57 %	17,86 %		21,43 %			17,86 %	
SAN AGUSTIN					18,97 %		3,45 %	29,31 %		12,07 %			36,21 %	
SAN ANDRES DEL RABANEDO		11,63 %			20,93 %		2,33 %	16,28 %	4,65 %	6,98 %	2,33 %		34,88 %	
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		9,09 %			45,45 %			18,18 %		9,09 %			18,18 %	
SAN ILDEFONSO		4,17 %			33,33 %		8,33 %	16,67 %		12,50 %			25,00 %	
SAN JOSE		8,00 %			32,00 %			16,00 %	4,00 %	4,00 %			36,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JUAN					23,33 %			20,00 %	3,33 %	16,67 %			36,67 %	
SAN LEONARDO DE YAGUE		13,33 %			26,67 %			13,33 %	6,67 %	6,67 %			33,33 %	
SAN PABLO			1,75 %		19,30 %			24,56 %	3,51 %	19,30 %			31,58 %	
SAN PEDRO DEL ARROYO								25,00 %					75,00 %	
SAN PEDRO MANRIQUE					66,67 %			33,33 %						
SANTA CLARA		2,70 %			29,73 %		2,70 %	43,24 %		13,51 %			8,11 %	
SANTA ELENA		8,77 %			36,84 %		1,75 %	22,81 %		19,30 %			10,53 %	
SANTA MARIA					15,00 %		35,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %			30,00 %	
SANTA MARTA					26,19 %		2,38 %	19,05 %	2,38 %	14,29 %	4,76 %		30,95 %	
SAYAGO		14,29 %			28,57 %		7,14 %	7,14 %		14,29 %			28,57 %	
SEGOVIA I		6,98 %			19,77 %			26,74 %		13,95 %	1,16 %		31,40 %	
SEGOVIA II		3,92 %			11,76 %			21,57 %	5,88 %	23,53 %	1,96 %		31,37 %	
SEGOVIA III		7,14 %			14,29 %			19,64 %	1,79 %	16,07 %	7,14 %		33,93 %	
SEGOVIA RURAL		5,71 %			25,71 %		2,86 %	17,14 %		15,71 %	1,43 %		31,43 %	
SEPULVEDA		8,82 %			29,41 %		2,94 %	14,71 %		11,76 %			32,35 %	
SERRADA		9,52 %			26,19 %			26,19 %	2,38 %	11,90 %	4,76 %		19,05 %	
SORIA NORTE		7,84 %			37,25 %		1,96 %	19,61 %	1,96 %	9,80 %		1,96 %	19,61 %	
SORIA RURAL		10,00 %			20,00 %			15,00 %	5,00 %	30,00 %			20,00 %	
SORIA SUR		12,82 %			25,64 %		2,56 %	20,51 %	2,56 %	10,26 %			25,64 %	
SORIA TARDE					28,57 %			35,71 %		21,43 %			14,29 %	
SOTILLO DE LA ADRADA		2,50 %			27,50 %		2,50 %	17,50 %	2,50 %	7,50 %			40,00 %	
SUR		9,20 %			26,44 %			14,94 %	2,30 %	13,79 %	4,60 %		28,74 %	
TABARA					33,33 %			40,00 %		6,67 %			20,00 %	
TAMAMES					40,00 %			20,00 %					40,00 %	
TEJARES		12,50 %			12,50 %			25,00 %	6,25 %	25,00 %			18,75 %	
TORDESILLAS		8,62 %			18,97 %		6,90 %	10,34 %	1,72 %	12,07 %	5,17 %		36,21 %	
TORENO					44,44 %		5,56 %			11,11 %			38,89 %	
TORO		6,82 %			29,55 %		2,27 %	22,73 %		20,45 %	2,27 %		15,91 %	
TORQUEMADA		16,67 %			66,67 %								16,67 %	
TORTOLA	2,22 %	2,22 %			13,33 %		8,89 %	24,44 %		15,56 %	2,22 %		31,11 %	
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN		9,68 %			16,13 %		3,23 %	16,13 %	3,23 %	9,68 %	3,23 %		38,71 %	
TUDELA		13,33 %			18,33 %		3,33 %	11,67 %	1,67 %	10,00 %			41,67 %	
UNIVERSIDAD CENTRO		16,13 %			22,58 %			19,35 %		16,13 %	3,23 %		22,58 %	
VALDERAS					10,00 %		10,00 %		10,00 %	20,00 %			50,00 %	
VALENCIA DE DON JUAN		3,70 %			25,93 %		3,70 %	11,11 %		22,22 %			33,33 %	
VALLADOLID RURAL I		3,33 %			23,33 %		3,33 %	23,33 %		16,67 %	3,33 %		26,67 %	
VALLADOLID RURAL II		12,12 %			15,15 %		6,06 %	21,21 %		15,15 %	3,03 %		27,27 %	
VALLE DE LOSA							33,33 %			33,33 %			33,33 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE MENA								100,00 %						
VALLE DE TOBALINA					26,32 %			5,26 %		21,05 %			47,37 %	
VALLE DE VALDEBEZANA					25,00 %			37,50 %		25,00 %			12,50 %	
VENTA DE BAÑOS	2,86 %				20,00 %			25,71 %	5,71 %	17,14 %			28,57 %	
VIDRIALES					50,00 %								50,00 %	
VILLABLINO		13,16 %			34,21 %			7,89 %		13,16 %	2,63 %		28,95 %	
VILLACASTIN		14,29 %			28,57 %			14,29 %			14,29 %		28,57 %	
VILLADA								33,33 %		33,33 %			33,33 %	
VILLADIEGO		9,09 %			18,18 %			72,73 %						
VILLAFRANCA		6,90 %			27,59 %			10,34 %	3,45 %	17,24 %			34,48 %	
VILLAFRECHOS		14,29 %			7,14 %			7,14 %		28,57 %			42,86 %	
VILLALON DE CAMPOS					40,00 %			40,00 %					20,00 %	
VILLALPANDO					11,76 %		5,88 %	35,29 %	5,88 %	29,41 %			11,76 %	
VILLAMURIEL					25,00 %					6,25 %	6,25 %		62,50 %	
VILLARCAYO		13,64 %			40,91 %			9,09 %		13,64 %			22,73 %	
VILLARRAMIEL					37,50 %			12,50 %		12,50 %			37,50 %	
VILLORIA		7,69 %			15,38 %		7,69 %			23,08 %			38,46 %	7,69 %
VIRGEN CONCHA	1,11 %	5,56 %			31,11 %		1,11 %	14,44 %	2,22 %	16,67 %			27,78 %	
VITIGUDINO		12,50 %						31,25 %			6,25 %		50,00 %	
ZAMORA NORTE		3,70 %			25,93 %		3,70 %	33,33 %	3,70 %	14,81 %			14,81 %	
ZAMORA SUR					20,00 %		4,00 %	32,00 %		12,00 %	4,00 %		28,00 %	
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	0,06 %	0,01 %	24,53 %	0,10 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	0,02 %	29,29 %	0,05 %

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AGREDA	12	92,31 %	13
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, n microorganismo no especificado	12	91,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			13 92,31 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AGREDA	50,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETA-LACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA	18,75 %	31,25 %	12,50 %	12,50 %	6,25 %	18,75 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

AGUILAR DE CAMPOO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AGUILAR DE CAMPOO	37	90,24 %	41
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	7	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	31	87,10 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	41	90,24 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AGUILAR DE CAMPOO	86,67 %	100,00 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGUILAR DE CAMPOO	17,50 %	5,00 %	17,50 %	10,00 %	2,50 %	47,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

ALAEJOS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ALAEJOS	9	64,29 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	69,23 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		14	64,29 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
ALAEJOS	50,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALAEJOS	20,00 %	10,00 %	30,00 %	10,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ALBA DE TORMES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ALBA DE TORMES	22	88,00 %	25
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	85,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	25	88,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALBA DE TORMES	83,33 %		94,44 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALBA DE TORMES	3,57 %	14,29 %	7,14 %	35,71 %	7,14 %	3,57 %	28,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	18	85,71 %	21
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	16	81,25 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		21	85,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALDEADAVILA DE LA RIBE	80,00 %	100,00 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	5,00 %	15,00 %	10,00 %	15,00 %	10,00 %	45,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
ALISTE	10	71,43 %	14	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	71,43 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	14	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
ALISTE		83,33 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALISTE	7,14 %	35,71 %	7,14 %	21,43 %	7,14 %	21,43 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ALMAZAN	13	72,22 %	18
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	16	68,75 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		18	72,22 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALMAZAN	75,00 %	100,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALMAZAN	23,08 %	38,46 %	23,08 %	15,38 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	29,29 %

ALTA SANABRIA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-07
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ALTA SANABRIA	3	100,00 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
ALTA SANABRIA	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALTA SANABRIA	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ANTONIO GUTIERREZ	71	70,30 %	101
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	8	75,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	91	69,23 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		101	70,30 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ANTONIO GUTIERREZ	71,05 %	43,75 %	78,72 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	5,19 %	19,48 %	6,49 %	12,99 %	3,90 %	6,49 %	2,60 %	42,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

ARANDA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARANDA NORTE	69	82,14 %	84
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	6	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	76	80,26 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		84	82,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA NORTE	80,77 %	85,71 %	81,58 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA NORTE	3,70 %	37,04 %	29,63 %	3,70 %	8,64 %	17,28 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARANDA RURAL	51	91,07 %	56
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	52	90,38 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	59	91,07 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA RURAL	86,67 %	100,00 %	91,18 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA RURAL	4,69 %	25,00 %	32,81 %	1,56 %	6,25 %	29,69 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARANDA SUR	54	81,82 %	66
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA SUR	94,74 %	81,25 %	74,19 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	60	86,67 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	67	81,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA SUR	3,08 %	30,77 %	1,54 %	35,38 %	1,54 %	10,77 %	16,92 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ARCOS DE JALON

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
ARCOS DE JALON	71	93,42 %	76	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	76	93,42 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	76	93,42 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARCOS DE JALON	94,74 %	90,00 %	93,75 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	32,53 %	26,51 %	30,12 %	1,20 %	9,64 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ARENAS DE SAN PEDRO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARENAS DE SAN PEDRO	32	84,21 %	38
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARENAS DE SAN PEDRO	75,00 %	83,33 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	32	90,63 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	38	84,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARENAS DE SAN PEDRO	21,05 %	10,53 %	5,26 %	10,53 %	2,63 %	28,95 %	21,05 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AREVALO	34	75,56 %	45
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AREVALO	85,71 %	80,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	40	77,50 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	45	75,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AREVALO	7,50 %	17,50 %	2,50 %	15,00 %	5,00 %	10,00 %	5,00 %	37,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARMUNIA	26	74,29 %	35
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARMUNIA	70,00 %	81,82 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	80,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	29	68,97 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	36	74,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARMUNIA	20,69 %	6,90 %	10,34 %	3,45 %	3,45 %	55,17 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ARTURO EYRIES	61	80,26 %	76
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	71	78,87 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		76	80,26 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARTURO EYRIES	80,00 %	70,00 %	83,87 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARTURO EYRIES	11,84 %	1,32 %	22,37 %	2,63 %	15,79 %	19,74 %	1,32 %	25,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	0,06 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ASTORGA I	26	76,47 %	34
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	33	75,76 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		34	76,47 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ASTORGA I	78,57 %	90,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	3,45 %	24,14 %	13,79 %	3,45 %	3,45 %	13,79 %	37,93 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ASTORGA II	12	70,59 %	17
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	15	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		17	70,59 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
ASTORGA II	75,00 %	69,23 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	21,43 %	7,14 %	14,29 %	14,29 %	42,86 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

AVILA ESTACION

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AVILA ESTACION	45	75,00 %	60
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	58	75,86 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		60	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA ESTACION	85,19 %	64,29 %	65,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA ESTACION	14,29 %	17,86 %	8,93 %	12,50 %	46,43 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

AVILA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AVILA NORTE	29	85,29 %	34
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	31	87,10 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		34	85,29 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA NORTE	93,33 %	83,33 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	8,82 %	26,47 %	2,94 %	8,82 %	2,94 %	8,82 %	41,18 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

AVILA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AVILA RURAL	17	94,44 %	18
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	17	94,12 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		18	94,44 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA RURAL	100,00 %	83,33 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA RURAL	20,83 %	8,33 %	12,50 %	4,17 %	20,83 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AVILA SUR ESTE	43	84,31 %	51
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	48	83,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		51	84,31 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA SUR ESTE	79,17 %	85,71 %	92,31 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA SUR ESTE	2,13 %	38,30 %	17,02 %	2,13 %	10,64 %	27,66 %	2,13 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %	0,05 %

AVILA SUR OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
AVILA SUR OESTE	21	63,64 %	33
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	31	67,74 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		33	63,64 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA SUR OESTE	60,00 %	60,00 %	64,29 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR OESTE	4,55 %	18,18 %	4,55 %	27,27 %	13,64 %	31,82 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-10
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BABIA	5	100,00 %	5
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		5	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BABIA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BABIA	20,00 %	40,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	29,29 %

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-06	2025-07
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BALTANAS	4	100,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
BALTANAS	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BALTANAS	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	14,04 %	29,29 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BAÑEZA I	31	73,81 %	42
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	32	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			42 73,81 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA I	83,33 %	75,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	37,14 %	2,86 %	5,71 %	5,71 %	5,71 %	2,86 %	40,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BAÑEZA II	21	77,78 %	27
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	7	85,71 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		27	77,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA II	66,67 %	83,33 %	77,78 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	4,55 %	13,64 %	18,18 %	18,18 %	4,55 %	40,91 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	29,29 %

BARCO DE AVILA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BARCO DE AVILA	4	50,00 %	8
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	8	50,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		8	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BARCO DE AVILA	100,00 %	100,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BARRIO ESPAÑA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BARRIO ESPAÑA	16	72,73 %	22
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		22	72,73 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BARRIO ESPAÑA	77,78 %	80,00 %	62,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARRIO ESPAÑA	5,56 %	16,67 %	5,56 %	5,56 %	27,78 %	38,89 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BEJAR	35	83,33 %	42
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEJAR	100,00 %	83,33 %	72,73 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	38	84,21 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	42	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	6,67 %	17,78 %	2,22 %	20,00 %	17,78 %	35,56 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BELORADO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BELORADO	14	58,33 %	24
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	21	61,90 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		24	58,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BELORADO	83,33 %	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BELORADO	4,76 %	33,33 %	4,76 %	23,81 %	23,81 %	9,52 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BEMBIBRE	36	87,80 %	41
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEMBIBRE	100,00 %	83,33 %	81,82 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	34	88,24 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	42	87,80 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEMBIBRE	3,64 %	3,64 %	36,36 %	3,64 %	27,27 %	1,82 %	23,64 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

BENAVENTE NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BENAVENTE NORTE	45	77,59 %	58
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	75,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	51	78,43 %
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	58	77,59 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BENAVENTE NORTE	83,33 %	63,64 %	79,31 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE NORTE	11,29 %	37,10 %	12,90 %	3,23 %	19,35 %	16,13 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

BENAVENTE SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BENAVENTE SUR	56	78,87 %	71
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	5	60,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	63	80,95 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	71	78,87 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BENAVENTE SUR	76,92 %	81,82 %	79,41 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE SUR	7,46 %	31,34 %	2,99 %	20,90 %	1,49 %	11,94 %	23,88 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

BERLANGA DE DUERO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BERLANGA DE DUERO	1	50,00 %	2
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		2	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
BERLANGA DE DUERO	50,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
BERLANGA DE DUERO	100,00 %
TOTAL GAP	29,29 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BOÑAR	14	73,68 %	19
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BOÑAR	83,33 %	40,00 %	70,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	78,57 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	19	73,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BOÑAR	13,33 %	6,67 %	6,67 %	13,33 %	60,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	14,04 %	29,29 %

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BRIVIESCA	36	83,72 %	43
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	38	81,58 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		44	83,72 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BRIVIESCA	92,86 %	50,00 %	86,96 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	4,88 %	39,02 %	2,44 %	24,39 %	7,32 %	21,95 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BURGO DE OSMA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BURGO DE OSMA	15	57,69 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	60,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		26	57,69 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGO DE OSMA	66,67 %	60,00 %	55,56 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGO DE OSMA	5,26 %	31,58 %	21,05 %	15,79 %	10,53 %	15,79 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BURGOHONDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BURGOHONDO	19	82,61 %	23
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	75,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	19	84,21 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		23	82,61 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOHONDO	75,00 %	75,00 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	19,05 %	23,81 %	9,52 %	47,62 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

BURGOS RURAL NORTE
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BURGOS RURAL NORTE	25	86,21 %	29
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	84,62 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			29 86,21 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOS RURAL NORTE	93,75 %	100,00 %	72,73 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL NORTE	10,00 %	20,00 %	3,33 %	33,33 %	3,33 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

BURGOS RURAL SUR
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
BURGOS RURAL SUR	44	74,58 %	59
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	53	77,36 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			59 74,58 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOS RURAL SUR	88,89 %	54,55 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL SUR	5,56 %	20,37 %	27,78 %	11,11 %	35,19 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CACABELOS	32	82,05 %	39
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CACABELOS	85,71 %	85,71 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	30	76,67 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	39	82,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACÍTICAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CACABELOS	5,26 %	39,47 %	2,63 %	2,63 %	5,26 %	13,16 %	2,63 %	28,95 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CALZADA DE VALDUNCIEL
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-07	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CALZADA DE VALDUNCIEL	1	33,33 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	33,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CALZADA DE VALDUNCIEL			100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
CALZADA DE VALDUNCIEL	100,00 %
TOTAL GAP	29,29 %

CAMARZANA DE TERA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CAMARZANA DE TERA	16	76,19 %	21
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	17	76,47 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			21 76,19 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMARZANA DE TERA	100,00 %	75,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMARZANA DE TERA	15,00 %	15,00 %	30,00 %	35,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CAMPOS LAMPREANA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-05	2025-08	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CAMPOS LAMPREANA	3	50,00 %	6
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		6	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMPOS LAMPREANA	100,00 %		33,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMPOS LAMPREANA	40,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	19	86,36 %	22
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	3	66,67 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	17	88,24 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	23	86,36 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANALEJAS-SANCTI SPIRI	80,00 %	100,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	4,76 %	23,81 %	23,81 %	4,76 %	42,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CANDELEDA	30	88,24 %	34
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANDELEDA	100,00 %	100,00 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	10	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	22	90,91 %
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	35	88,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA, GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA, GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA, GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	3,03 %	3,03 %	6,06 %	3,03 %	45,45 %	3,03 %	12,12 %	3,03 %	21,21 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	0,10 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CANTALAPIEDRA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-09
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CANTALAPIEDRA	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
CANTALAPIEDRA	66,67 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓN
CANTALAPIEDRA	100,00 %
TOTAL GAP	18,87 %

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CANTALEJO	47	88,68 %	53
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	47	89,36 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			53 88,68 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANTALEJO	88,89 %	100,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALEJO	3,57 %	21,43 %	21,43 %	5,36 %	3,57 %	10,71 %	33,93 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CANTERAC	35	81,40 %	43
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	41	80,49 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		43	81,40 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANTERAC	87,50 %	75,00 %	78,95 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTERAC	5,00 %	7,50 %	25,00 %	15,00 %	2,50 %	10,00 %	5,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CAPUCHINOS	18	69,23 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	21	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			26 69,23 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAPUCHINOS	80,00 %	75,00 %	64,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAPUCHINOS	8,70 %	30,43 %	8,70 %	13,04 %	17,39 %	21,74 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CARBAJALES DE ALBA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CARBAJALES DE ALBA	6	100,00 %	6
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		6	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
CARBAJALES DE ALBA	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBAJALES DE ALBA	12,50 %	37,50 %	12,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CARBALLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CARBALLEDA	26	92,86 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	17	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	90,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	92,86 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBALLEDA	100,00 %	100,00 %	91,30 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	17,86 %	64,29 %	3,57 %	7,14 %	7,14 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CARBONERO	45	83,33 %	54
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	50	82,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		54	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBONERO	78,57 %	90,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA, GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA, GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	1,75 %	1,75 %	26,32 %	3,51 %	17,54 %	1,75 %	19,30 %	28,07 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CARRION DE LOS CONDES	20	80,00 %	25
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	24	79,17 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		25	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARRION DE LOS CONDES	60,00 %	100,00 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARRION DE LOS CONDES	14,29 %	19,05 %	19,05 %	4,76 %	42,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,14 %	29,29 %

CASA DEL BARCO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CASA DEL BARCO	47	62,67 %	75
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CASA DEL BARCO	72,41 %	70,59 %	45,16 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	1	
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	25,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	69	65,22 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	75	62,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CASA DEL BARCO	6,78 %	27,12 %	3,39 %	18,64 %	18,64 %	25,42 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CEBREROS	25	89,29 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	88,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	89,29 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CEBREROS	83,33 %	100,00 %	88,24 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CEBREROS	3,57 %	14,29 %	21,43 %	3,57 %	14,29 %	7,14 %	7,14 %	3,57 %	25,00 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CENTRO-GAMAZO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CENTRO-GAMAZO	68	83,95 %	81
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	6	83,33 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	69	84,06 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			81 83,95 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CENTRO-GAMAZO	86,67 %	91,67 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CENTRO-GAMAZO	1,23 %	4,94 %	19,75 %	1,23 %	20,99 %	1,23 %	14,81 %	1,23 %	34,57 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CERVERA DE PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CERVERA DE PISUERGA	20	74,07 %	27
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	24	79,17 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	27	74,07 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CERVERA DE PISUERGA	100,00 %	83,33 %	63,16 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CERVERA DE PISUERGA	16,00 %	36,00 %	12,00 %	4,00 %	8,00 %	4,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CIGALES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CIGALES	18	66,67 %	27
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	65,38 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		27	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIGALES	72,73 %	66,67 %	61,54 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIGALES	17,39 %	34,78 %	4,35 %	13,04 %	4,35 %	26,09 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CIRCULAR	41	85,42 %	48
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	46	86,96 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		48	85,42 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIRCULAR	82,35 %	75,00 %	88,89 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	2,04 %	28,57 %	2,04 %	20,41 %	20,41 %	2,04 %	24,49 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CIRCUNVALACION
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CIRCUNVALACION	52	86,67 %	60
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	54	87,04 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		60	86,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIRCUNVALACION	81,48 %	100,00 %	86,96 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCUNVALACION	11,11 %	17,46 %	1,59 %	17,46 %	1,59 %	17,46 %	33,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

CISTIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CISTIERRA	19	79,17 %	24
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	85,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		24	79,17 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CISTIERRA	100,00 %	77,78 %	70,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CISTIERRA	9,52 %	23,81 %	4,76 %	4,76 %	4,76 %	52,38 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CIUDAD RODRIGO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CIUDAD RODRIGO	65	91,55 %	71
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIUDAD RODRIGO	94,44 %	91,67 %	90,24 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	10	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	57	89,47 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	71	91,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIUDAD RODRIGO	8,33 %	31,94 %	12,50 %	1,39 %	6,94 %	1,39 %	37,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CONDADO DE TREVINO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CONDADO DE TREVINO	7	70,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	77,78 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	70,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CONDADO DE TREVINO	60,00 %	100,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDADO DE TREVINO	22,22 %	11,11 %	22,22 %	33,33 %	11,11 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CONDESA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CONDESA	36	58,06 %	62
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	56	57,14 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		62	58,06 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CONDESA	61,90 %	40,00 %	59,38 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDESA	4,88 %	21,95 %	9,76 %	4,88 %	2,44 %	56,10 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CORRALES	15	93,75 %	16
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	92,31 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		16	93,75 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CORRALES	100,00 %	100,00 %	88,89 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CORRALES	15,79 %	10,53 %	15,79 %	21,05 %	36,84 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CRISTOBAL ACOSTA	34	70,83 %	48
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRISTOBAL ACOSTA	71,43 %	75,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	41	70,73 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	49	70,83 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRISTOBAL ACOSTA	7,50 %	15,00 %	32,50 %	20,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CRUCERO	24	75,00 %	32
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	6	83,33 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	73,08 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		32	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRUCERO	77,78 %	80,00 %	72,22 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	11,54 %	15,38 %	3,85 %	11,54 %	7,69 %	3,85 %	46,15 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CUELLAR	85	81,73 %	104
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CUELLAR	85,00 %	68,75 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	10	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	75,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	89	80,90 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	105	81,73 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	0,93 %	44,86 %	0,93 %	13,08 %	0,93 %	15,89 %	1,87 %	21,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

CUENCA DEL BERNESGA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
CUENCA DEL BERNESGA	16	61,54 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	23	60,87 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		26	61,54 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CUENCA DEL BERNESGA	66,67 %	100,00 %	52,94 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUENCA DEL BERNESGA	5,56 %	27,78 %	16,67 %	5,56 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

DELICIAS I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
DELICIAS I	84	84,85 %	99
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	95	85,26 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	99	84,85 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
DELICIAS I	89,09 %	76,92 %	78,13 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS I	0,96 %	7,69 %	0,96 %	19,23 %	4,81 %	13,46 %	23,08 %	0,96 %	28,85 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	0,06 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

DELICIAS II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
DELICIAS II	73	83,91 %	87
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	79	82,28 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		87	83,91 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
DELICIAS II	86,05 %	92,86 %	76,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACITAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	5,38 %	9,68 %	26,88 %	2,15 %	16,13 %	20,43 %	2,15 %	17,20 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-12

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
DESCONOCIDO	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
DESCONOCIDO	100,00 %		100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
DESCONOCIDO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	14,04 %

EL EJIDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
EL EJIDO	58	81,69 %	71
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
EL EJIDO	85,71 %	75,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	65	83,08 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	71	81,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL EJIDO	8,47 %	25,42 %	5,08 %	6,78 %	1,69 %	5,08 %	47,46 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
EL ESPINAR	27	84,38 %	32
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	32	84,38 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		32	84,38 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
EL ESPINAR	66,67 %	88,89 %	92,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL ESPINAR	19,35 %	25,81 %	3,23 %	9,68 %	41,94 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ERAS DEL BOSQUE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ERAS DEL BOSQUE	61	72,62 %	84
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	80	72,50 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	85	72,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ERAS DEL BOSQUE	71,43 %	78,57 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ERAS DEL BOSQUE	1,39 %	11,11 %	20,83 %	12,50 %	54,17 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ESGUEVILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ESGUEVILLAS	4	80,00 %	5
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		5	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ESGUEVILLAS	100,00 %	100,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESGUEVILLAS	33,33 %	33,33 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	11	84,62 %	13	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	84,62 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	13	84,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ESPINOSA DE LOS MONTE	100,00 %	66,67 %	88,89 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	15,38 %	30,77 %	7,69 %	7,69 %	38,46 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FABERO	15	75,00 %	20
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	15	73,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		20	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FABERO	66,67 %	50,00 %	90,91 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	5,88 %	29,41 %	11,76 %	11,76 %	17,65 %	23,53 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FONTIVEROS	10	100,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	6	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FONTIVEROS	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FONTIVEROS	36,36 %	9,09 %	18,18 %	9,09 %	27,27 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	0,02 %	29,29 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FROMISTA	24	80,00 %	30
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	28	78,57 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		30	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FROMISTA	100,00 %	75,00 %	70,59 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	3,70 %	29,63 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	3,70 %	40,74 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

FUENTEGUINALDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FUENTEGUINALDO	2	50,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
FUENTEGUINALDO	50,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
FUENTEGUINALDO	100,00 %
TOTAL GAP	29,29 %

FUENTESAUCO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FUENTESAUCO	5	83,33 %	6
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		6	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
FUENTESAUCO	100,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTESAUCO	33,33 %	16,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	14,04 %	29,29 %

FUENTES DE OÑORO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-05

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
FUENTES DE OÑORO	1	100,00 %	1
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		1	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
FUENTES DE OÑORO	100,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
FUENTES DE OÑORO	100,00 %
TOTAL GAP	24,53 %

GAMONAL-ANTIGUA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GAMONAL-ANTIGUA	40	71,43 %	56
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	75,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	50	74,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	56	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GAMONAL-ANTIGUA	69,23 %	55,56 %	72,22 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAMONAL-ANTIGUA	2,13 %	6,38 %	19,15 %	6,38 %	31,91 %	2,13 %	10,64 %	21,28 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GARCIA LORCA	47	75,81 %	62
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	57	78,95 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	62	75,81 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARCIA LORCA	90,91 %	50,00 %	68,75 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARCIA LORCA	5,77 %	21,15 %	34,62 %	1,92 %	15,38 %	21,15 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

GARRIDO NORTE
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GARRIDO NORTE	37	67,27 %	55
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARRIDO NORTE	66,67 %	88,89 %	61,29 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	25,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	44	72,73 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	55	67,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO NORTE	4,65 %	32,56 %	4,65 %	25,58 %	9,30 %	2,33 %	20,93 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

GARRIDO SUR
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GARRIDO SUR	43	75,44 %	57
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	3	66,67 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	6	83,33 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	45	77,78 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			59 75,44 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARRIDO SUR	75,00 %	72,73 %	74,19 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO SUR	10,20 %	28,57 %	4,08 %	20,41 %	10,20 %	26,53 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-09	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GOMARA	5	100,00 %	5
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		5	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
GOMARA	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GOMARA	20,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	1,42 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GREDOS	6	85,71 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	7	85,71 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	85,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
GREDOS	100,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GREDOS	16,67 %	16,67 %	16,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	29,29 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GUARDO	75	91,46 %	82
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	77	90,91 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		83	91,46 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUARDO	93,33 %	91,30 %	90,91 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUARDO	11,76 %	28,24 %	2,35 %	14,12 %	9,41 %	1,18 %	32,94 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
GUAREÑA	18	85,71 %	21	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	21	85,71 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	21	85,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUAREÑA	100,00 %	75,00 %	84,62 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	10,53 %	31,58 %	36,84 %	5,26 %	15,79 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GUIJUELO	42	85,71 %	49
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUIJUELO	85,00 %	93,33 %	78,57 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	19	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	76,92 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	49	85,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	2,04 %	20,41 %	2,04 %	8,16 %	22,45 %	44,90 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	0,10 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
HERRERA DE PISUERGA	22	73,33 %	30
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	28	71,43 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		30	73,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HERRERA DE PISUERGA	100,00 %	62,50 %	64,29 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HERRERA DE PISUERGA	4,35 %	17,39 %	30,43 %	4,35 %	8,70 %	34,78 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

HUERTA DEL REY
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
HUERTA DEL REY	80	84,21 %	95
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	80,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	86	86,05 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		95	84,21 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HUERTA DEL REY	89,58 %	88,89 %	76,32 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DEL REY	9,47 %	21,05 %	2,11 %	17,89 %	16,84 %	3,16 %	29,47 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

HUERTA DE REY
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
HUERTA DE REY	7	100,00 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	6	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
HUERTA DE REY	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DE REY	30,00 %	40,00 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
IGNACIO LOPEZ SAIZ	48	80,00 %	60
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	52	80,77 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		60	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
IGNACIO LOPEZ SAIZ	80,00 %	76,92 %	81,25 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	1,64 %	4,92 %	27,87 %	4,92 %	27,87 %	14,75 %	18,03 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ISCAR	30	93,75 %	32
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	31	93,55 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		33	93,75 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ISCAR	100,00 %	100,00 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ISCAR	2,86 %	31,43 %	17,14 %	2,86 %	22,86 %	20,00 %	2,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %	0,05 %

JARDINILLOS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
JARDINILLOS	62	73,81 %	84
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	82	74,39 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		84	73,81 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JARDINILLOS	77,27 %	76,00 %	70,27 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JARDINILLOS	8,97 %	21,79 %	3,85 %	11,54 %	1,28 %	12,82 %	1,28 %	37,18 %	1,28 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %	0,05 %

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
JOSE AGUADO	47	74,60 %	63
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	75,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	59	74,58 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		63	74,60 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSE AGUADO	86,67 %	55,56 %	72,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOMAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSE AGUADO	18,75 %	14,58 %	8,33 %	6,25 %	2,08 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	67	81,71 %	82
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	9	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	71	84,51 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			82
			81,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	78,57 %	76,19 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	7,41 %	20,99 %	34,57 %	1,23 %	16,05 %	19,75 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA ALAMEDILLA	56	75,68 %	74
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA ALAMEDILLA	68,42 %	68,75 %	82,05 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	68	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			75 75,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALAMEDILLA	1,52 %	13,64 %	22,73 %	4,55 %	10,61 %	18,18 %	1,52 %	27,27 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA ALBERCA	10	71,43 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	69,23 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		14	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
LA ALBERCA	100,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	10,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LA CABRERA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA CABRERA			1
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		1	

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69
LA CABRERA	
TOTAL GAP	77,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

LA FUENTE SAN ESTEBAN
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA FUENTE SAN ESTEBAN	7	70,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA FUENTE SAN ESTEBAN		100,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	2	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	6	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	11	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	12,50 %	12,50 %	37,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	29,29 %

LAGUNA DE DUERO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LAGUNA DE DUERO	75	76,53 %	98
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAGUNA DE DUERO	78,26 %	81,82 %	73,17 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	100,00 %
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	5	20,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	87	78,16 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			98 76,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA, GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA, GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAGUNA DE DUERO	7,69 %	1,10 %	24,18 %	2,20 %	13,19 %	1,10 %	17,58 %	1,10 %	31,87 %
TOTAL GAP	7,33 %	0,06 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

LA MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA MAGDALENA	9	75,00 %	12
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	8	87,50 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA MAGDALENA	100,00 %	50,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIO NES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
LA MAGDALENA	10,00 %	30,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	0,01 %	24,53 %	29,29 %

LANZAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LANZAHITA	12	75,00 %	16
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	69,23 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	16	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LANZAHITA			85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LANZAHITA	8,33 %	58,33 %	8,33 %	8,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LA PALOMERA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA PALOMERA	50	66,67 %	75
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA PALOMERA	69,23 %	53,85 %	69,44 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	60,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	67	68,66 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	76	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PALOMERA	13,56 %	15,25 %	5,08 %	10,17 %	11,86 %	44,07 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA PUEBLA	85	75,89 %	112
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA PUEBLA	80,00 %	70,59 %	73,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	9	55,56 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	99	76,77 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	2	100,00 %
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía			113 75,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PUEBLA	5,94 %	17,82 %	1,98 %	18,81 %	1,98 %	9,90 %	0,99 %	42,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

LAS HUELGAS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LAS HUELGAS	31	77,50 %	40
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	36	77,78 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	40	77,50 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS HUELGAS	73,68 %	62,50 %	92,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUELGAS	7,32 %	24,39 %	2,44 %	24,39 %	7,32 %	17,07 %	17,07 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

LA SIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
LA SIERRA	13	81,25 %	16	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	16	81,25 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	16	81,25 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA SIERRA	75,00 %	100,00 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA SIERRA	12,50 %	18,75 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	31,25 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LAS NAVAS DEL MARQUES	10	71,43 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	9	77,78 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		14	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS NAVAS DEL MARQUES	66,67 %	66,67 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS NAVAS DEL MARQUES	20,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LAS TORRES	60	89,55 %	67
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	61	90,16 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	67	89,55 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS TORRES	100,00 %	77,78 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	1,39 %	6,94 %	30,56 %	5,56 %	22,22 %	1,39 %	13,89 %	18,06 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

LA VICTORIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LA VICTORIA	67	83,75 %	80
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	74	82,43 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		80	83,75 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA VICTORIA	96,30 %	65,00 %	84,85 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	4,82 %	25,30 %	2,41 %	14,46 %	1,20 %	16,87 %	4,82 %	30,12 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

LEDESMA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LEDESMA	10	83,33 %	12
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LEDESMA	100,00 %	100,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LEDESMA	27,27 %	9,09 %	27,27 %	27,27 %	9,09 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LERMA	22	84,62 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			26 84,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LERMA	100,00 %	75,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	8,70 %	13,04 %	52,17 %	4,35 %	21,74 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LINARES DE RIOFRIO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-10
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LINARES DE RIOFRIO	3	100,00 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
LINARES DE RIOFRIO	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS
LINARES DE RIOFRIO	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	18,87 %	14,04 %

LOS COMUNEROS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LOS COMUNEROS	38	60,32 %	63
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	2	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	56	60,71 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	63	60,32 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS COMUNEROS	60,00 %	45,45 %	64,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS COMUNEROS	2,22 %	4,44 %	2,22 %	31,11 %	4,44 %	26,67 %	2,22 %	13,33 %	13,33 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	0,06 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LOS CUBOS	27	84,38 %	32
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	27	81,48 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			32 84,38 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS CUBOS	78,95 %	75,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	3,13 %	15,63 %	34,38 %	25,00 %	21,88 %
TOTAL GAP	0,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
LUMBRALES	6	75,00 %	8
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	7	85,71 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		8	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
LUMBRALES	75,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPO RINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LUMBRALES	11,11 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %	44,44 %
TOTAL GAP	7,33 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MADRIGAL ALTAS TORRES	10	83,33 %	12
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	11	90,91 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
MADRIGAL ALTAS TORRES	100,00 %	77,78 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MADRIGAL ALTAS TORRES	7,14 %	21,43 %	7,14 %	14,29 %	14,29 %	7,14 %	28,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MAGDALENA	34	80,95 %	42
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	37	83,78 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	42	80,95 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MAGDALENA	75,00 %	100,00 %	78,26 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAGDALENA	10,00 %	7,50 %	5,00 %	27,50 %	17,50 %	32,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

MANSILLA DE LAS MULAS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MANSILLA DE LAS MULAS	6	60,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	55,56 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	60,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MANSILLA DE LAS MULAS	100,00 %		62,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MANSILLA DE LAS MULAS	28,57 %	71,43 %
TOTAL GAP	24,53 %	29,29 %

MATALLANA DE TORIO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MATALLANA DE TORIO	6	66,67 %	9
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	8	62,50 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		9	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MATALLANA DE TORIO	100,00 %	50,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATALLANA DE TORIO	16,67 %	16,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	2,78 %	29,29 %

MATILLA DE LOS CAÑOS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MATILLA DE LOS CAÑOS	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
MATILLA DE LOS CAÑOS	75,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPO RINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	25,00 %	50,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	2,78 %	18,87 %	29,29 %

MAYORGA DE CAMPOS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MAYORGA DE CAMPOS	10	71,43 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	5	80,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	70,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		15	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
MAYORGA DE CAMPOS	50,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAYORGA DE CAMPOS	9,09 %	27,27 %	9,09 %	18,18 %	36,36 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MEDINA DEL CAMPO RURAL	47	87,04 %	54
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	47	87,23 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			54 87,04 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO RURA	78,57 %	93,75 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	9,09 %	27,27 %	1,82 %	18,18 %	9,09 %	1,82 %	32,73 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MEDINA DEL CAMPO URBANO	76	87,36 %	87
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	80,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	78	87,18 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	87	87,36 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO URBA	80,00 %	80,00 %	97,30 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,98 %	4,90 %	15,69 %	1,96 %	27,45 %	18,63 %	1,96 %	28,43 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

MEDINA DE POMAR
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MEDINA DE POMAR	16	84,21 %	19
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	18	83,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		19	84,21 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DE POMAR	100,00 %	100,00 %	78,57 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE POMAR	5,88 %	11,76 %	5,88 %	17,65 %	17,65 %	5,88 %	35,29 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

MEDINA DE RIOSECO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MEDINA DE RIOSECO	37	75,51 %	49
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	8	87,50 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	41	73,17 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		49	75,51 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DE RIOSECO	76,92 %	75,00 %	73,68 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE RIOSECO	10,64 %	17,02 %	2,13 %	19,15 %	27,66 %	4,26 %	19,15 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MELGAR DE FERNAMENTAL	8	66,67 %	12
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	70,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MELGAR DE FERNAMENTA	50,00 %	100,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTAL	11,11 %	44,44 %	11,11 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MIGUEL ARMIJO	27	71,05 %	38
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	34	73,53 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	38	71,05 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIGUEL ARMIJO	92,31 %	40,00 %	65,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIGUEL ARMIJO	25,00 %	22,22 %	11,11 %	22,22 %	19,44 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-01

2025-02

2025-04

2025-05

2025-06

2025-09

2025-11

2025-12

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR	7	77,78 %	9	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	77,78 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	9	77,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA DEL CASTAÑAR	100,00 %		83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	12,50 %	12,50 %	12,50 %	62,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MIRANDA ESTE	88	89,80 %	98
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	5	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	7	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	88	88,64 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		100	89,80 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA ESTE	88,57 %	71,43 %	95,92 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA ESTE	10,91 %	29,09 %	0,91 %	6,36 %	16,36 %	0,91 %	10,00 %	0,91 %	24,55 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	0,10 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

MIRANDA OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MIRANDA OESTE	113	80,71 %	140
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA OESTE	85,42 %	79,17 %	76,81 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	3	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	11	90,91 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	124	79,03 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	141	80,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA OESTE	1,59 %	8,73 %	26,19 %	7,94 %	21,43 %	2,38 %	9,52 %	1,59 %	20,63 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

MOMBELTRAN

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
MOMBELTRAN	12	92,31 %	13	J15.9	Neumonía bacteriana no especificada			2	100,00 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738	J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado			2	100,00 %
				J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado			8	87,50 %
				J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito			1	100,00 %
					TOTAL PACIENTES Neumonía			13	92,31 %
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70						
MOMBELTRAN	100,00 %	100,00 %	90,00 %						
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOMBELTRAN	35,71 %	14,29 %	21,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

MOTA DEL MARQUES
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-07	2025-08	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MOTA DEL MARQUES	6	85,71 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	100,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	85,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MOTA DEL MARQUES	100,00 %	100,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	28,57 %	28,57 %	28,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
MUÑANA	4	80,00 %	5
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		5	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MUÑANA	50,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑANA	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	29,29 %

NAVA DE LA ASUNCION

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
NAVA DE LA ASUNCION	24	80,00 %	30
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	76,92 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		30	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
NAVA DE LA ASUNCION	88,89 %	100,00 %	68,75 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
NAVA DE LA ASUNCION	3,70 %	18,52 %	18,52 %	22,22 %	3,70 %	33,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

OLMEDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
OLMEDO	23	79,31 %	29
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	80,77 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		29	79,31 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLMEDO	50,00 %	100,00 %	88,24 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	6,45 %	25,81 %	32,26 %	12,90 %	22,58 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
OLVEGA	14	82,35 %	17
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	16	81,25 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		17	82,35 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLVEGA	66,67 %	100,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	17,65 %	23,53 %	5,88 %	17,65 %	23,53 %	11,76 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
OSORNO	11	84,62 %	13
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	84,62 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		13	84,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OSORNO	100,00 %	100,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OSORNO	50,00 %	8,33 %	16,67 %	25,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PALENCIA RURAL	21	80,77 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	24	79,17 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		26	80,77 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PALENCIA RURAL	88,89 %	100,00 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PALENCIA RURAL	7,69 %	30,77 %	19,23 %	15,38 %	3,85 %	23,08 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

PAMPLIEGA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PAMPLIEGA	6	54,55 %	11
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	60,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		11	54,55 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PAMPLIEGA	100,00 %	50,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	33,33 %	33,33 %	22,22 %	11,11 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PARADA DE MOLINO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PARADA DE MOLINO	46	85,19 %	54
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	50	84,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		54	85,19 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PARADA DE MOLINO	84,00 %	57,14 %	95,45 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARADA DE MOLINO	7,14 %	30,36 %	16,07 %	21,43 %	25,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)		Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
PAREDES DE NAVA	14	73,68 %	19	J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019		1	100,00 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado		18	72,22 %
					TOTAL PACIENTES Neumonía		19	73,68 %
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70					
PAREDES DE NAVA	83,33 %	50,00 %	72,73 %					
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	5,88 %	17,65 %	5,88 %	11,76 %	11,76 %	47,06 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PARQUESOL	71	80,68 %	88
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PARQUESOL	84,85 %	87,50 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	75,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	81	82,72 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	88	80,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARQUESOL	8,89 %	22,22 %	1,11 %	16,67 %	20,00 %	2,22 %	28,89 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	0,10 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

PEDROSILLO EL RALO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-07
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PEDROSILLO EL RALO	4	80,00 %	5
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		5	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEDROSILLO EL RALO		100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	14,04 %	29,29 %

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PEÑAFIEL	35	76,09 %	46
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑAFIEL	87,50 %	66,67 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	80,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	38	81,58 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	47	76,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACÍTICAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑAFIEL	4,65 %	13,95 %	2,33 %	30,23 %	2,33 %	11,63 %	2,33 %	32,56 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	36	83,72 %	43
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	2	50,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	34	82,35 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	43	83,72 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	71,43 %	72,73 %	88,46 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	20,41 %	18,37 %	6,12 %	14,29 %	22,45 %	18,37 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PERIURBANA NORTE
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PERIURBANA NORTE	47	85,45 %	55
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PERIURBANA NORTE	81,25 %	100,00 %	84,38 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	5	80,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	44	84,09 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	55	85,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA NORTE	1,92 %	19,23 %	7,69 %	25,00 %	15,38 %	30,77 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PERIURBANA SUR	28	80,00 %	35
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PERIURBANA SUR	93,75 %	100,00 %	57,14 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	29	82,76 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	35	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA SUR	22,58 %	22,58 %	3,23 %	6,45 %	3,23 %	22,58 %	19,35 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

PIEDRAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PIEDRAHITA	20	80,00 %	25
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	23	82,61 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		25	80,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PIEDRAHITA	100,00 %		82,61 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIEDRAHITA	4,55 %	9,09 %	22,73 %	4,55 %	59,09 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PILARICA	45	84,91 %	53
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	47	85,11 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	53	84,91 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PILARICA	92,00 %	66,67 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	5,77 %	21,15 %	19,23 %	17,31 %	36,54 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PINARES-COVALEDA	16	72,73 %	22
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	18	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	23	72,73 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PINARES-COVALEDA	71,43 %	50,00 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINARES-COVALEDA	17,65 %	23,53 %	5,88 %	29,41 %	5,88 %	17,65 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PINTOR OLIVA	76	81,72 %	93
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PINTOR OLIVA	77,50 %	93,75 %	81,08 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	2	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	87	82,76 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	93	81,72 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	2,33 %	20,93 %	2,33 %	24,42 %	10,47 %	39,53 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PISUERGA	42	85,71 %	49
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	45	88,89 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		49	85,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PISUERGA	83,33 %	100,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	19,61 %	15,69 %	17,65 %	19,61 %	27,45 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PIZARRALES
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PIZARRALES	22	70,97 %	31
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	29	68,97 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			31 70,97 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PIZARRALES	77,78 %	33,33 %	73,68 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIZARRALES	11,54 %	30,77 %	11,54 %	11,54 %	34,62 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PLAZA DEL EJERCITO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PLAZA DEL EJERCITO	70	81,40 %	86
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	80	82,50 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		86	81,40 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PLAZA DEL EJERCITO	89,66 %	75,00 %	78,05 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PLAZA DEL EJERCITO	8,05 %	20,69 %	21,84 %	3,45 %	16,09 %	2,30 %	27,59 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PONFERRADA I	35	70,00 %	50
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	33,33 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	44	68,18 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	51	70,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA I	70,59 %	76,92 %	61,90 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPIRINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA I	39,02 %	4,88 %	2,44 %	12,20 %	14,63 %	2,44 %	24,39 %
TOTAL GAP	24,53 %	0,10 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

PONFERRADA II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PONFERRADA II	29	76,32 %	38
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA II	85,71 %	83,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	33	81,82 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	38	76,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA II	6,06 %	45,45 %	3,03 %	6,06 %	12,12 %	27,27 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PONFERRADA III
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PONFERRADA III	24	77,42 %	31
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	6	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	76,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	33	77,42 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA III	73,33 %	100,00 %	72,73 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA III	48,39 %	3,23 %	6,45 %	19,35 %	22,58 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PONFERRADA IV	37	78,72 %	47
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	6	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	40	85,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		47	78,72 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA IV	78,57 %	100,00 %	73,08 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA IV	2,17 %	36,96 %	2,17 %	2,17 %	4,35 %	21,74 %	30,43 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	0,10 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PORILLO	38	86,36 %	44
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	41	87,80 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		45	86,36 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PORILLO	100,00 %	90,91 %	78,26 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PORILLO	6,38 %	19,15 %	4,26 %	27,66 %	2,13 %	6,38 %	34,04 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

PUEBLA DE SANABRIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PUEBLA DE SANABRIA	11	78,57 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	12	83,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		14	78,57 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUEBLA DE SANABRIA	50,00 %	33,33 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	46,15 %	7,69 %	15,38 %	30,77 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PUENTE DOMINGO FLOREZ	3	50,00 %	6
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	5	40,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		6	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUENTE DOMINGO FLOREZ	100,00 %	50,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	29,29 %

PUERTA NUEVA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
PUERTA NUEVA	43	71,67 %	60
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUERTA NUEVA	75,00 %	66,67 %	67,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	54	74,07 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	60	71,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUERTA NUEVA	7,55 %	24,53 %	3,77 %	13,21 %	1,89 %	24,53 %	24,53 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
QUINTANAR DE LA SIERRA	11	84,62 %	13
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	80,00 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	14	84,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
QUINTANAR DE LA SIERRA	100,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	25,00 %	33,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

RIAÑO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RIAÑO	26	92,86 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	11	81,82 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	17	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	92,86 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAÑO	80,00 %	100,00 %	94,44 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAÑO	9,38 %	28,13 %	3,13 %	21,88 %	37,50 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	14,04 %	29,29 %

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RIAZA	9	64,29 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	11	54,55 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		14	64,29 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAZA	50,00 %	66,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	16,67 %	41,67 %	8,33 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	14,04 %	29,29 %

RIBERA DEL ESLA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RIBERA DEL ESLA	3	42,86 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	6	33,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	42,86 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	=+70
RIBERA DEL ESLA		60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ESLA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	29,29 %

RIBERA DEL ORBIGO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RIBERA DEL ORBIGO	22	53,66 %	41
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	38	52,63 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		41	53,66 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIBERA DEL ORBIGO	77,78 %	55,56 %	43,48 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACÍTICAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ORBIGO	16,00 %	24,00 %	8,00 %	16,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	24,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ROA	25	83,33 %	30
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ROA	60,00 %	85,71 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	84,62 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	30	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	3,23 %	32,26 %	25,81 %	12,90 %	25,81 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

ROBLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-05	2025-06	2025-10
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ROBLEDA	2	100,00 %	2
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		2	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
ROBLEDA	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01FA / MACROLÍDOS
ROBLEDA	100,00 %
TOTAL GAP	14,04 %

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RONDILLA I	32	91,43 %	35
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RONDILLA I	87,50 %	100,00 %	91,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	30	90,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	36	91,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA I	2,70 %	5,41 %	16,22 %	21,62 %	2,70 %	18,92 %	5,41 %	27,03 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
RONDILLA II	43	78,18 %	55
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	53	75,47 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		57	78,18 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RONDILLA II	93,33 %	90,91 %	65,52 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA II	5,56 %	22,22 %	33,33 %	14,81 %	24,07 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-08	2025-09	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SACRAMENIA	4	100,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
SACRAMENIA	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SACRAMENIA	40,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	29,29 %

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAHAGUN	7	70,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	77,78 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	70,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAHAGUN	50,00 %	100,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	57,14 %	42,86 %
TOTAL GAP	24,53 %	29,29 %

SALAS DE LOS INFANTES
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SALAS DE LOS INFANTES	12	75,00 %	16
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	78,57 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		16	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALAS DE LOS INFANTES	100,00 %	100,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALAS DE LOS INFANTES	6,67 %	26,67 %	33,33 %	20,00 %	13,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SALDAÑA	21	91,30 %	23
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	22	90,91 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		23	91,30 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALDAÑA	100,00 %	100,00 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALDAÑA	7,14 %	32,14 %	3,57 %	17,86 %	21,43 %	17,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN AGUSTIN	53	74,65 %	71
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN AGUSTIN	62,07 %	92,31 %	79,31 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	2	50,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	7	85,71 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	58	74,14 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	71	74,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN AGUSTIN	18,97 %	3,45 %	29,31 %	12,07 %	36,21 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN ANDRES DEL RABANEDO	40	75,47 %	53
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	49	75,51 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	53	75,47 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ANDRES DEL RABANE	73,33 %	83,33 %	73,08 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABANEDO	11,63 %	20,93 %	2,33 %	16,28 %	4,65 %	6,98 %	2,33 %	34,88 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	10	100,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	9,09 %	45,45 %	18,18 %	9,09 %	18,18 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN ILDEFONSO	20	83,33 %	24
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	23	82,61 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		24	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ILDEFONSO	91,67 %		90,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ILDEFONSO	4,17 %	33,33 %	8,33 %	16,67 %	12,50 %	25,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN JOSE	22	70,97 %	31
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JOSE	60,00 %	75,00 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	75,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	68,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	31	70,97 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	8,00 %	32,00 %	16,00 %	4,00 %	4,00 %	36,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN JUAN	27	77,14 %	35
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	30	76,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			35 77,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JUAN	75,00 %	50,00 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JUAN	23,33 %	20,00 %	3,33 %	16,67 %	36,67 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
SAN LEONARDO DE YAGUE	13	92,86 %	14	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	92,86 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	14	92,86 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN LEONARDO DE YAGUE	75,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGUE	13,33 %	26,67 %	13,33 %	6,67 %	6,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN PABLO	49	80,33 %	61
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	60	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		62	80,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PABLO	61,54 %	90,00 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	1,75 %	19,30 %	24,56 %	3,51 %	19,30 %	31,58 %
TOTAL GAP	0,06 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SAN PEDRO DEL ARROYO
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN PEDRO DEL ARROYO	4	50,00 %	8
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	7	42,86 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		8	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PEDRO DEL ARROYO	50,00 %	100,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO DEL ARROYO	25,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	18,87 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAN PEDRO MANRIQUE	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN
SAN PEDRO MANRIQUE	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SANTA CLARA	31	64,58 %	48
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA CLARA	66,67 %	57,14 %	62,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	33,33 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	43	69,77 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	49	64,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA CLARA	2,70 %	29,73 %	2,70 %	43,24 %	13,51 %	8,11 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SANTA ELENA	42	76,36 %	55
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA ELENA	70,59 %	91,67 %	73,08 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	100,00 %
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	49	79,59 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	55	76,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA ELENA	8,77 %	36,84 %	1,75 %	22,81 %	19,30 %	10,53 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SANTA MARIA	18	78,26 %	23
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	20	80,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		23	78,26 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA MARIA	80,00 %	100,00 %	76,47 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARIA	15,00 %	35,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SANTA MARTA	34	80,95 %	42
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	6	83,33 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	36	80,56 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		42	80,95 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA MARTA	86,67 %	71,43 %	76,19 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARTA	26,19 %	2,38 %	19,05 %	2,38 %	14,29 %	4,76 %	30,95 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SAYAGO	13	72,22 %	18
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	17	76,47 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		18	72,22 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAYAGO			86,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAYAGO	14,29 %	28,57 %	7,14 %	7,14 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SEDANO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-06

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEDANO			1
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		1	

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69
SEDANO	
TOTAL GAP	77,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEGOVIA I	69	87,34 %	79
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	2	50,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	72	88,89 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			79 87,34 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA I	88,00 %	93,75 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	6,98 %	19,77 %	26,74 %	13,95 %	1,16 %	31,40 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SEGOVIA II

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEGOVIA II	39	81,25 %	48
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	3	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	43	81,40 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		48	81,25 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA II	87,50 %	77,78 %	78,26 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA II	3,92 %	11,76 %	21,57 %	5,88 %	23,53 %	1,96 %	31,37 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEGOVIA III	41	75,93 %	54
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	53	75,47 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		54	75,93 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA III	66,67 %	88,89 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA III	7,14 %	14,29 %	19,64 %	1,79 %	16,07 %	7,14 %	33,93 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SEGOVIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEGOVIA RURAL	61	84,72 %	72
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	70	84,29 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		72	84,72 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA RURAL	85,00 %	83,33 %	81,48 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA RURAL	5,71 %	25,71 %	2,86 %	17,14 %	15,71 %	1,43 %	31,43 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SEPULVEDA	27	87,10 %	31
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	88,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			31 87,10 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEPULVEDA	72,73 %	100,00 %	93,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	8,82 %	29,41 %	2,94 %	14,71 %	11,76 %	32,35 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SERRADA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SERRADA	37	88,10 %	42
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	66,67 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	35	91,43 %
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía			42 88,10 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SERRADA	93,75 %	80,00 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SERRADA	9,52 %	26,19 %	26,19 %	2,38 %	11,90 %	4,76 %	19,05 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

SORIA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SORIA NORTE	46	69,70 %	66
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	2	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	80,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	60	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		67	69,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA NORTE	61,54 %	87,50 %	64,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	7,84 %	37,25 %	1,96 %	19,61 %	1,96 %	9,80 %	1,96 %	19,61 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	0,02 %	29,29 %

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SORIA RURAL	16	57,14 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	53,85 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	57,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA RURAL	77,78 %	50,00 %	46,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	10,00 %	20,00 %	15,00 %	5,00 %	30,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SORIA SUR	33	68,75 %	48
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	44	63,64 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		49	68,75 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA SUR	57,89 %	66,67 %	76,19 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA SUR	12,82 %	25,64 %	2,56 %	20,51 %	2,56 %	10,26 %	25,64 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SORIA TARDE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)		Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
SORIA TARDE	10	100,00 %	10	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado		10	100,00 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía		10	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69
SORIA TARDE	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA TARDE	28,57 %	35,71 %	21,43 %	14,29 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

SOTILLO DE LA ADRADA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SOTILLO DE LA ADRADA	33	75,00 %	44
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SOTILLO DE LA ADRADA	78,57 %	71,43 %	70,83 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	40	80,00 %
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	45	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	2,50 %	27,50 %	2,50 %	17,50 %	2,50 %	7,50 %	40,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
SUR	70	82,35 %	85
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	100,00 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	81	81,48 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	85	82,35 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SUR	85,37 %	90,00 %	76,47 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	9,20 %	26,44 %	14,94 %	2,30 %	13,79 %	4,60 %	28,74 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

TABARA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TABARA	10	71,43 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	69,23 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		15	71,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TABARA	100,00 %	66,67 %	62,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TABARA	33,33 %	40,00 %	6,67 %	20,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-07	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TAMAMES	5	83,33 %	6
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		6	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
TAMAMES	100,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TAMAMES	40,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	29,29 %

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TEJARES	14	82,35 %	17
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	85,71 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		18	82,35 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TEJARES	60,00 %	100,00 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TEJARES	12,50 %	12,50 %	25,00 %	6,25 %	25,00 %	18,75 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TORDESILLAS	46	80,70 %	57
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORDESILLAS	88,89 %	91,67 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	50	80,00 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	57	80,70 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOBACÍTICAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	8,62 %	18,97 %	6,90 %	10,34 %	1,72 %	12,07 %	5,17 %	36,21 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TORENO	14	82,35 %	17
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	76,92 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		17	82,35 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORENO	75,00 %	100,00 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORENO	44,44 %	5,56 %	11,11 %	38,89 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	14,04 %	29,29 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TORO	35	74,47 %	47
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	2	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	43	72,09 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		47	74,47 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORO	83,33 %	68,75 %	73,68 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORO	6,82 %	29,55 %	2,27 %	22,73 %	20,45 %	2,27 %	15,91 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-11	
CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
TORQUEMADA	6	66,67 %	9	J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado			2	100,00 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado			7	57,14 %
					TOTAL PACIENTES Neumonía			9	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORQUEMADA	100,00 %	40,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORQUEMADA	16,67 %	66,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	29,29 %

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TORTOLA	37	82,22 %	45
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	4	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	50,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	38	84,21 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	45	82,22 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORTOLA	92,86 %	57,14 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLÍNAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA, GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA, GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	2,22 %	2,22 %	13,33 %	8,89 %	24,44 %	15,56 %	2,22 %	31,11 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

TROBAJO DEL CAMINO - V
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	28	60,87 %	46
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	39	58,97 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	46	60,87 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TROBAJO DEL CAMINO - V	69,23 %	54,55 %	59,09 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETAALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	9,68 %	16,13 %	3,23 %	16,13 %	3,23 %	9,68 %	3,23 %	38,71 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
TUDELA	55	79,71 %	69
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TUDELA	87,50 %	84,21 %	73,53 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	1	
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	5	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	7	85,71 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	55	78,18 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	69	79,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TUDELA	13,33 %	18,33 %	3,33 %	11,67 %	1,67 %	10,00 %	41,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

UNIVERSIDAD CENTRO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
UNIVERSIDAD CENTRO	25	78,13 %	32
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	3	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	28	78,57 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	33	78,13 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
UNIVERSIDAD CENTRO	100,00 %	50,00 %	73,68 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
UNIVERSIDAD CENTRO	16,13 %	22,58 %	19,35 %	16,13 %	3,23 %	22,58 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

VALDERAS

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALDERAS	8	66,67 %	12
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	11	72,73 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALDERAS	100,00 %		62,50 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALDERAS	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

VALENCIA DE DON JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALENCIA DE DON JUAN	26	68,42 %	38
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	36	72,22 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		38	68,42 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALENCIA DE DON JUAN	77,78 %	50,00 %	68,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALENCIA DE DON JUAN	3,70 %	25,93 %	3,70 %	11,11 %	22,22 %	33,33 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VALLADOLID RURAL I
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALLADOLID RURAL I	23	88,46 %	26
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	25	88,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		26	88,46 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLADOLID RURAL I	90,00 %	83,33 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL I	3,33 %	23,33 %	3,33 %	23,33 %	16,67 %	3,33 %	26,67 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

VALLADOLID RURAL II
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALLADOLID RURAL II	30	75,00 %	40
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	66,67 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	34	73,53 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	40	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLADOLID RURAL II	91,67 %	66,67 %	68,18 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL II	12,12 %	15,15 %	6,06 %	21,21 %	15,15 %	3,03 %	27,27 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

VALLE DE LOSA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALLE DE LOSA	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE LOSA	100,00 %		100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE LOSA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	2,78 %	14,04 %	29,29 %

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALLE DE MENA	4	57,14 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	6	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	57,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE MENA	50,00 %		60,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓN
VALLE DE MENA	100,00 %
TOTAL GAP	18,87 %

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-01

2025-02

2025-03

2025-04

2025-05

2025-06

2025-09

2025-11

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
VALLE DE TOBALINA	17	94,44 %	18	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	18	94,44 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	18	94,44 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE TOBALINA	100,00 %	100,00 %	92,31 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE TOBALINA	26,32 %	5,26 %	21,05 %	47,37 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VALLE DE VALDEBEZANA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-01

2025-04

2025-05

2025-06

2025-07

2025-09

2025-11

2025-12

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VALLE DE VALDEBEZANA	7	100,00 %	7
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	6	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		7	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE VALDEBEZANA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE VALDEBEZANA	25,00 %	37,50 %	25,00 %	12,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VENTA DE BAÑOS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VENTA DE BAÑOS	30	76,92 %	39
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	37	78,38 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		39	76,92 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VENTA DE BAÑOS	80,00 %	63,64 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	2,86 %	20,00 %	25,71 %	5,71 %	17,14 %	28,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VIDRIALES	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		4	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	=+70
VIDRIALES	75,00 %
TOTAL GAP	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIDRIALES	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	29,29 %

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLABLINO	32	78,05 %	41
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLABLINO	76,92 %	83,33 %	70,59 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	5	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	32	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	41	78,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLABLINO	13,16 %	34,21 %	7,89 %	13,16 %	2,63 %	28,95 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLACASTIN	5	50,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	50,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	50,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLACASTIN		100,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLACASTIN	14,29 %	28,57 %	14,29 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,14 %	29,29 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLADA	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		3	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLADA	100,00 %		100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VILLADIEGO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLADIEGO	10	66,67 %	15
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	1	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	76,92 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		15	66,67 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLADIEGO	75,00 %	100,00 %	55,56 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN
VILLADIEGO	9,09 %	18,18 %	72,73 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %

VILLAFRANCA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLAFRANCA	21	75,00 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	26	73,08 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	75,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAFRANCA	75,00 %	50,00 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRANCA	6,90 %	27,59 %	10,34 %	3,45 %	17,24 %	34,48 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
VILLAFRECHOS	10	90,91 %	11	J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	11	90,91 %
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738		TOTAL PACIENTES Neumonía	11	90,91 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAFRECHOS	100,00 %	66,67 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRECHOS	14,29 %	7,14 %	7,14 %	28,57 %	42,86 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VILLALON DE CAMPOS
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLALON DE CAMPOS	4	36,36 %	11
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	9	44,44 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		12	36,36 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLALON DE CAMPOS		33,33 %	42,86 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALON DE CAMPOS	40,00 %	40,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	29,29 %

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLALPANDO	11	84,62 %	13
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	13	84,62 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		13	84,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLALPANDO	100,00 %		90,91 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALPANDO	11,76 %	5,88 %	35,29 %	5,88 %	29,41 %	11,76 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLAMURIEL	14	93,33 %	15
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	15	93,33 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		15	93,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAMURIEL	100,00 %	75,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAMURIEL	25,00 %	6,25 %	6,25 %	62,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %

VILLARCAYO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLARCAYO	20	83,33 %	24
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	22	86,36 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
TOTAL PACIENTES Neumonía		24	83,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLARCAYO	90,91 %	80,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARCAYO	13,64 %	40,91 %	9,09 %	13,64 %	22,73 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLARRAMIEL	6	60,00 %	10
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	10	60,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		10	60,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLARRAMIEL	66,67 %		66,67 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARRAMIEL	37,50 %	12,50 %	12,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	24,53 %	18,87 %	14,04 %	29,29 %

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VILLORIA	11	78,57 %	14
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	1	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	11	81,82 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	1	
	TOTAL PACIENTES Neumonía	14	78,57 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLORIA	66,67 %	50,00 %	88,89 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLORIA	7,69 %	15,38 %	7,69 %	23,08 %	38,46 %	7,69 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	14,04 %	29,29 %	0,05 %

VIRGEN CONCHA
Indicadores PRAN por proceso: Neumonía
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VIRGEN CONCHA	72	84,71 %	85
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VIRGEN CONCHA	79,41 %	84,62 %	89,47 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	1	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	3	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	2	100,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	79	83,54 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	86	84,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIRGEN CONCHA	1,11 %	5,56 %	31,11 %	1,11 %	14,44 %	2,22 %	16,67 %	27,78 %
TOTAL GAP	0,33 %	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
VITIGUDINO	15	78,95 %	19
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	1	100,00 %
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	4	75,00 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	14	78,57 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		19	78,95 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VITIGUDINO	100,00 %	66,67 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VITIGUDINO	12,50 %	31,25 %	6,25 %	50,00 %
TOTAL GAP	7,33 %	18,87 %	1,14 %	29,29 %

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ZAMORA NORTE	23	82,14 %	28
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	27	81,48 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		28	82,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ZAMORA NORTE	50,00 %	100,00 %	78,95 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA NORTE	3,70 %	25,93 %	3,70 %	33,33 %	3,70 %	14,81 %	14,81 %
TOTAL GAP	7,33 %	24,53 %	2,78 %	18,87 %	1,42 %	14,04 %	29,29 %

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
ZAMORA SUR	21	77,78 %	27
TOTAL GAP	6.905	79,23 %	8.738

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	27	77,78 %
TOTAL PACIENTES Neumonía		27	77,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ZAMORA SUR	87,50 %	60,00 %	73,33 %
TOTAL GAP	81,76 %	77,57 %	77,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPIRINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPIRINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA SUR	20,00 %	4,00 %	32,00 %	12,00 %	4,00 %	28,00 %
TOTAL GAP	24,53 %	2,78 %	18,87 %	14,04 %	1,14 %	29,29 %