

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
Gerencia AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)					Otitis	% Pac Otitis J01
GAP ÁVILA	52,66 %	2.459	20,94 %	39,77 %	H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado					140	58,57 %
GAP BURGOS	52,88 %	4.206	16,74 %	31,65 %	H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado					3.278	21,72 %
GAP LEÓN	52,75 %	4.305	18,98 %	35,98 %	H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado					1.125	67,56 %
GAP EL BIERZO	54,73 %	1.944	15,95 %	29,14 %	H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado					130	56,15 %
GAP PALENCIA	53,16 %	2.026	22,01 %	41,41 %	H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado					24.080	51,67 %
GAP SALAMANCA	51,64 %	5.459	13,68 %	26,50 %	H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho					1.885	74,06 %
GAP SEGOVIA	59,42 %	1.858	25,83 %	43,48 %	H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo					1.714	75,96 %
GAP SORIA	54,17 %	1.368	22,37 %	41,30 %	H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral					1.188	48,15 %
GAP VALLADOLID OESTE	50,52 %	2.860	21,36 %	42,28 %	H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado					28	71,43 %
GAP VALLADOLID ESTE	45,94 %	3.524	17,14 %	37,31 %	H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado					41	60,98 %
GAP ZAMORA	55,26 %	2.783	21,34 %	38,62 %	H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado					90	47,78 %
TOTAL GRS	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %	TOTAL PACIENTES Otitis						32.780	52,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XC / ESTEROIDES ANTIBACTERIALES	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
GAP ÁVILA	0,15 %	39,69 %	0,08 %	0,15 %	35,29 %	0,46 %	15,21 %	2,16 %	0,54 %	6,56 %	0,39 %		8,42 %			
GAP BURGOS		31,38 %	0,27 %		47,12 %	0,09 %	11,11 %	2,74 %	0,18 %	7,19 %			7,15 %			
GAP LEÓN		35,89 %	0,09 %	0,04 %	34,39 %	0,13 %	15,85 %	4,40 %	0,26 %	9,73 %	0,53 %		6,12 %			
GAP EL BIERZO	0,09 %	29,04 %	0,09 %	0,19 %	46,99 %	0,19 %	14,57 %	3,29 %	0,66 %	6,86 %	0,09 %		6,95 %			
GAP PALENCIA		41,04 %	0,37 %	0,19 %	35,28 %		7,99 %	4,64 %	0,65 %	7,24 %	0,37 %		11,14 %			0,09 %
GAP SALAMANCA	0,07 %	26,46 %	0,04 %	0,07 %	36,72 %	0,11 %	25,29 %	2,48 %	0,28 %	9,15 %	0,18 %		8,16 %		0,04 %	0,07 %
GAP SEGOVIA	0,09 %	43,48 %		0,09 %	39,49 %	0,18 %	8,15 %	1,54 %	1,18 %	5,80 %	0,45 %		7,07 %	0,09 %		
GAP SORIA	0,13 %	41,16 %	0,13 %	0,13 %	31,31 %		17,68 %	4,59 %	0,67 %	7,56 %		0,13 %	4,59 %			
GAP VALLADOLID OESTE	0,07 %	41,80 %	0,48 %	0,14 %	36,12 %		10,93 %	1,31 %	0,07 %	7,89 %	0,28 %		6,57 %			
GAP VALLADOLID ESTE	0,12 %	37,31 %		0,06 %	41,32 %		9,51 %	2,16 %	0,12 %	8,83 %	1,05 %		6,67 %			0,06 %
GAP ZAMORA	0,07 %	38,62 %			34,72 %		19,64 %	1,69 %	0,39 %	8,19 %	0,46 %		6,31 %			
TOTAL % Pacientes GRS	0,06 %	35,54 %	0,13 %	0,08 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	0,01 %	7,23 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	53,45 %	58	8,62 %	16,13 %
AGUILAR DE CAMPOO	61,01 %	159	19,50 %	31,96 %
ALAEJOS	43,64 %	55	10,91 %	25,00 %
ALBA DE TORMES	57,33 %	225	21,33 %	37,21 %
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	56,34 %	71	2,82 %	5,00 %
ALISTE	50,59 %	85	17,65 %	34,88 %
ALMAZAN	56,45 %	124	23,39 %	41,43 %
ALTA SANABRIA	100,00 %	13		
ANTONIO GUTIERREZ	52,81 %	481	17,67 %	33,46 %
ARANDA NORTE	52,73 %	275	19,27 %	36,55 %
ARANDA RURAL	49,34 %	152	6,58 %	13,33 %
ARANDA SUR	56,27 %	263	17,11 %	30,41 %
ARCOS DE JALON	50,00 %	46	17,39 %	34,78 %
ARENAS DE SAN PEDRO	47,89 %	190	18,42 %	38,46 %
AREVALO	62,79 %	301	24,58 %	39,15 %
ARMUNIA	45,82 %	251	22,71 %	49,57 %
ARTURO EYRIES	44,08 %	152	18,42 %	41,79 %
ASTORGA I	64,71 %	170	21,76 %	33,64 %
ASTORGA II	48,84 %	43	6,98 %	14,29 %
AVILA ESTACION	44,09 %	186	24,19 %	54,88 %
AVILA NORTE	55,15 %	136	27,94 %	50,67 %
AVILA RURAL	53,91 %	115	27,83 %	51,61 %
AVILA SUR ESTE	61,74 %	230	24,78 %	40,14 %
AVILA SUR OESTE	47,85 %	209	18,18 %	38,00 %
BABIA	50,00 %	10	20,00 %	40,00 %
BALTANAS	66,67 %	39	15,38 %	23,08 %
BAÑEZA I	48,53 %	272	15,07 %	31,06 %
BAÑEZA II	49,60 %	125	14,40 %	29,03 %
BARCO DE AVILA	46,25 %	80	15,00 %	32,43 %
BARRIO ESPAÑA	50,62 %	81	23,46 %	46,34 %
BEJAR	34,12 %	296	8,45 %	24,75 %
BELORADO	46,15 %	52	21,15 %	45,83 %
BEMBIBRE	42,57 %	303	11,55 %	27,13 %
BENAVENTE NORTE	53,17 %	252	27,38 %	51,49 %
BENAVENTE SUR	51,23 %	324	19,75 %	38,55 %
BERLANGA DE DUERO	44,00 %	25	16,00 %	36,36 %
BOÑAR	53,57 %	56	17,86 %	33,33 %
BRIVIESCA	58,62 %	87	25,29 %	43,14 %
BURGO DE OSMA	66,37 %	113	19,47 %	29,33 %
BURGOHONDO	38,46 %	78	12,82 %	33,33 %
BURGOS RURAL NORTE	54,35 %	92	10,87 %	20,00 %
BURGOS RURAL SUR	54,35 %	138	16,67 %	30,67 %
CACABELOS	63,48 %	178	12,36 %	19,47 %
CALZADA DE VALDUNCIEL	60,61 %	66	7,58 %	12,50 %
CAMARZANA DE TERA	37,89 %	95	17,89 %	47,22 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	% Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	140	58,57 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3.278	21,72 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1.125	67,56 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	130	56,15 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24.080	51,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1.885	74,06 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1.714	75,96 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1.188	48,15 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	28	71,43 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	41	60,98 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	90	47,78 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	32.780	52,45 %

CAMPOS LAMPREANA	48,39 %	31	19,35 %	40,00 %
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	48,35 %	91	7,69 %	15,91 %
CANDELEDA	50,86 %	116	16,38 %	32,20 %
CANTALAPIEDRA	33,96 %	53	5,66 %	16,67 %
CANTALEJO	63,03 %	119	26,05 %	41,33 %
CANTERAC	37,04 %	135	8,89 %	24,00 %
CAPUCHINOS	46,99 %	183	12,57 %	26,74 %
CARBAJALES DE ALBA	60,00 %	15	13,33 %	22,22 %
CARBALLEDA	50,91 %	55	20,00 %	39,29 %
CARBONERO	71,17 %	111	27,93 %	39,24 %
CARRION DE LOS CONDES	48,78 %	41	29,27 %	60,00 %
CASA DEL BARCO	55,78 %	147	21,09 %	37,80 %
CEBREROS	52,56 %	156	17,31 %	32,93 %
CENTRO-GAMAZO	55,12 %	127	10,24 %	18,57 %
CERVERA DE PISUERGA	54,55 %	55	18,18 %	33,33 %
CIGALES	31,15 %	122	9,02 %	28,95 %
CIRCULAR	36,67 %	150	8,67 %	23,64 %
CIRCUNVALACION	46,05 %	228	20,18 %	43,81 %
CISTIERNA	64,77 %	88	22,73 %	35,09 %
CIUDAD RODRIGO	52,38 %	294	19,73 %	37,66 %
CONDADO DE TREVIÑO	46,43 %	28	17,86 %	38,46 %
CONDESA	53,93 %	191	9,95 %	18,45 %
CORRALES	64,29 %	56	17,86 %	27,78 %
CRISTOBAL ACOSTA	42,97 %	128	10,94 %	25,45 %
CRUCERO	58,64 %	162	25,31 %	43,16 %
CUELLAR	48,17 %	164	10,37 %	21,52 %
CUENCA DEL BERNESGA	64,00 %	100	18,00 %	28,13 %
DELICIAS I	49,32 %	369	19,78 %	40,11 %
DELICIAS II	51,05 %	237	18,99 %	37,19 %
DESCONOCIDO	100,00 %	2	100,00 %	100,00 %
EL EJIDO	53,31 %	242	19,83 %	37,21 %
EL ESPINAR	74,04 %	104	38,46 %	51,95 %
ERAS DEL BOSQUE	53,88 %	258	18,99 %	35,25 %
ESGUEVILLAS	60,00 %	15	46,67 %	77,78 %
ESPINOSA DE LOS MONTER	49,21 %	63	28,57 %	58,06 %
FABERO	57,48 %	127	22,05 %	38,36 %
FONTIVEROS	60,00 %	50	18,00 %	30,00 %
FROMISTA	53,70 %	54	18,52 %	34,48 %
FUENTEGUINALDO	70,00 %	20	10,00 %	14,29 %
FUENTESAUCO	57,69 %	26	46,15 %	80,00 %
FUENTES DE OÑORO	57,14 %	28	17,86 %	31,25 %
GAMONAL-ANTIGUA	44,57 %	184	16,85 %	37,80 %
GARCIA LORCA	51,69 %	118	9,32 %	18,03 %
GARRIDO NORTE	54,62 %	260	16,92 %	30,99 %
GARRIDO SUR	48,09 %	393	14,25 %	29,63 %
GOMARA	40,00 %	15	20,00 %	50,00 %
GREDOS	40,00 %	15	26,67 %	66,67 %
GUARDO	52,70 %	148	16,89 %	32,05 %
GUAREÑA	55,00 %	60	16,67 %	30,30 %
GUIJUELO	68,48 %	165	15,15 %	22,12 %
HERRERA DE PISUERGA	41,10 %	73	23,29 %	56,67 %
HUERTA DEL REY	49,26 %	203	26,60 %	54,00 %
HUERTA DE REY	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
IGNACIO LOPEZ SAIZ	58,65 %	133	9,02 %	15,38 %
ISCAR	56,29 %	151	15,89 %	28,24 %

JARDINILLOS	61,21 %	165	33,94 %	55,45 %
JOSE AGUADO	50,40 %	373	20,64 %	40,96 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	60,00 %	210	28,10 %	46,83 %
LA ALAMEDILLA	41,48 %	229	13,10 %	31,58 %
LA ALBERCA	66,67 %	48	29,17 %	43,75 %
LA CABRERA	28,00 %	25	4,00 %	14,29 %
LA FUENTE SAN ESTEBAN	44,44 %	63	12,70 %	28,57 %
LAGUNA DE DUERO	52,66 %	357	25,49 %	48,40 %
LA MAGDALENA	44,44 %	27	25,93 %	58,33 %
LANZAHITA	61,67 %	60	15,00 %	24,32 %
LA PALOMERA	53,57 %	364	20,60 %	38,46 %
LA PUEBLA	50,45 %	220	21,82 %	43,24 %
LAS HUELGAS	40,66 %	91	10,99 %	27,03 %
LA SIERRA	48,00 %	25	28,00 %	58,33 %
LAS NAVAS DEL MARQUES	45,53 %	123	26,83 %	58,93 %
LAS TORRES	47,01 %	134	13,43 %	28,57 %
LA VICTORIA	48,33 %	180	26,11 %	54,02 %
LEDESMA	46,25 %	80	20,00 %	43,24 %
LERMA	59,57 %	94	5,32 %	8,93 %
LINARES DE RIOFRIO	52,00 %	50	24,00 %	46,15 %
LOS COMUNEROS	43,79 %	169	18,34 %	41,89 %
LOS CUBOS	48,39 %	186	15,05 %	31,11 %
LUMBRALES	36,36 %	77	9,09 %	25,00 %
MADRIGAL ALTAS TORRES	46,77 %	62	27,42 %	58,62 %
MAGDALENA	55,06 %	89	11,24 %	20,41 %
MANSILLA DE LAS MULAS	43,40 %	53	7,55 %	17,39 %
MATALLANA DE TORIO	58,82 %	17	17,65 %	30,00 %
MATILLA DE LOS CAÑOS	54,17 %	48	2,08 %	3,85 %
MAYORGA DE CAMPOS	36,84 %	19	10,53 %	28,57 %
MEDINA DEL CAMPO RURAL	38,51 %	148	14,19 %	36,84 %
MEDINA DEL CAMPO URBAN	48,30 %	441	19,27 %	39,91 %
MEDINA DE POMAR	60,61 %	66	18,18 %	30,00 %
MEDINA DE RIOSECO	42,59 %	108	18,52 %	43,48 %
MELGAR DE FERNAMENTAL	51,92 %	52	9,62 %	18,52 %
MIGUEL ARMIJO	47,26 %	237	14,35 %	30,36 %
MIRANDA DEL CASTAÑAR	40,63 %	32	12,50 %	30,77 %
MIRANDA ESTE	43,32 %	307	19,54 %	45,11 %
MIRANDA OESTE	65,03 %	366	24,86 %	38,24 %
MOMBELTRAN	65,31 %	49	18,37 %	28,13 %
MOTA DEL MARQUES	68,75 %	16	31,25 %	45,45 %
MUÑANA	50,00 %	36	13,89 %	27,78 %
MUNICO	57,14 %	14	14,29 %	25,00 %
NAVA DE LA ASUNCION	65,00 %	180	30,00 %	46,15 %
OLMEDO	50,77 %	65	29,23 %	57,58 %
OLVEGA	58,51 %	94	28,72 %	49,09 %
OSORNO	41,18 %	34	14,71 %	35,71 %
PALENCIA RURAL	60,00 %	80	33,75 %	56,25 %
PAMPLIEGA	33,33 %	12		
PARADA DE MOLINO	61,84 %	228	28,95 %	46,81 %
PAREDES DE NAVA	83,33 %	30	46,67 %	56,00 %
PARQUESOL	52,63 %	266	22,18 %	42,14 %
PEDIATRIA DE AREA ESTE		1		
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF		1		
PEDROSILLO EL RALO	48,15 %	54	3,70 %	7,69 %
PENAFIEL	55,33 %	150	14,67 %	26,51 %

PEÑARANDA DE BRACAMON	57,96 %	226	16,81 %	29,01 %
PERIURBANA NORTE	58,49 %	371	13,48 %	23,04 %
PERIURBANA SUR	56,83 %	227	16,30 %	28,68 %
PIEDRAHITA	48,89 %	45	26,67 %	54,55 %
PILARICA	46,45 %	183	19,67 %	42,35 %
PINARES-COVALEDA	51,52 %	66	30,30 %	58,82 %
PINTOR OLIVA	57,27 %	227	22,91 %	40,00 %
PISUERGA	57,72 %	272	25,37 %	43,95 %
PIZARRALES	48,90 %	319	7,84 %	16,03 %
PLAZA DEL EJERCITO	52,27 %	176	26,70 %	51,09 %
PONFERRADA I	49,59 %	367	18,80 %	37,91 %
PONFERRADA II	56,25 %	288	17,36 %	30,86 %
PONFERRADA III	64,08 %	206	18,93 %	29,55 %
PONFERRADA IV	54,59 %	196	12,76 %	23,36 %
PORTILLO	42,86 %	175	16,57 %	38,67 %
PUEBLA DE SANABRIA	55,29 %	85	20,00 %	36,17 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ	52,63 %	38	15,79 %	30,00 %
PUERTA NUEVA	68,36 %	256	28,52 %	41,71 %
QUINTANAR DE LA SIERRA	45,65 %	46	13,04 %	28,57 %
RIAÑO	57,14 %	21	4,76 %	8,33 %
RIAZA	71,05 %	76	26,32 %	37,04 %
RIBERA DEL ESLA	59,38 %	32	21,88 %	36,84 %
RIBERA DEL ORBIGO	47,12 %	278	16,19 %	34,35 %
ROA	45,68 %	81	9,88 %	21,62 %
ROBLEDA	46,43 %	28	14,29 %	30,77 %
RONDILLA I	48,18 %	137	16,06 %	33,33 %
RONDILLA II	37,11 %	159	10,06 %	27,12 %
SACRAMENIA		5		
SAHAGUN	55,93 %	59	18,64 %	33,33 %
SALAS DE LOS INFANTES	50,00 %	46	17,39 %	34,78 %
SALDAÑA	36,71 %	79	18,99 %	51,72 %
SAN AGUSTIN	57,85 %	223	14,35 %	24,81 %
SAN ANDRES DEL RABANER	49,36 %	235	20,43 %	41,38 %
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	55,26 %	76	18,42 %	33,33 %
SAN ILDEFONSO	57,65 %	85	11,76 %	20,41 %
SAN JOSE	70,05 %	187	9,09 %	12,98 %
SAN JUAN	55,15 %	165	10,30 %	18,68 %
SAN LEONARDO DE YAGUE	60,00 %	50	26,00 %	43,33 %
SAN PABLO	51,40 %	107	17,76 %	34,55 %
SAN PEDRO DEL ARROYO	55,26 %	38	18,42 %	33,33 %
SAN PEDRO MANRIQUE	73,33 %	15	6,67 %	9,09 %
SANTA CLARA	56,85 %	146	19,86 %	34,94 %
SANTA ELENA	70,97 %	186	31,18 %	43,94 %
SANTA MARIA	49,04 %	157	17,20 %	35,06 %
SANTA MARTA	55,86 %	324	13,27 %	23,76 %
SAYAGO	50,79 %	63	15,87 %	31,25 %
SEDANO	33,33 %	9	22,22 %	66,67 %
SEGOVIA I	52,84 %	229	27,51 %	52,07 %
SEGOVIA II	59,22 %	255	27,06 %	45,70 %
SEGOVIA III	63,39 %	112	32,14 %	50,70 %
SEGOVIA RURAL	50,38 %	262	21,37 %	42,42 %
SEPULVEDA	79,03 %	62	33,87 %	42,86 %
SERRADA	46,15 %	91	10,99 %	23,81 %
SORIA NORTE	49,55 %	224	19,64 %	39,64 %
SORIA RURAL	56,41 %	156	22,44 %	39,77 %

SORIA SUR	47,06 %	255	23,14 %	49,17 %
SORIA TARDE	66,67 %	51	43,14 %	64,71 %
SOTILLO DE LA ADRADA	51,15 %	174	12,07 %	23,60 %
SUR	40,65 %	214	16,82 %	41,38 %
TABARA	62,00 %	50	6,00 %	9,68 %
TAMAMES	57,58 %	33	21,21 %	36,84 %
TEJARES	49,74 %	193	20,73 %	41,67 %
TORDESILLAS	57,64 %	144	15,28 %	26,51 %
TORENO	60,53 %	38	21,05 %	34,78 %
TORO	49,74 %	193	17,10 %	34,38 %
TORQUEMADA	38,46 %	52	25,00 %	65,00 %
TORTOLA	43,58 %	257	23,35 %	53,57 %
TROBAJO DEL CAMINO - VA	55,04 %	258	26,74 %	48,59 %
TUDELA	39,13 %	161	12,42 %	31,75 %
UNIVERSIDAD CENTRO	46,62 %	133	18,05 %	38,71 %
VALDERAS	59,32 %	59	22,03 %	37,14 %
VALENCIA DE DON JUAN	59,39 %	165	18,18 %	30,61 %
VALLADOLID RURAL I	54,24 %	118	31,36 %	57,81 %
VALLADOLID RURAL II	35,09 %	114	12,28 %	35,00 %
VALLE DE LOSA	66,67 %	9	22,22 %	33,33 %
VALLE DE MENA	50,00 %	78	6,41 %	12,82 %
VALLE DE TOBALINA	59,09 %	22		
VALLE DE VALDEBEZANA	75,00 %	12	25,00 %	33,33 %
VENTA DE BAÑOS	44,36 %	133	18,80 %	42,37 %
VIDRIALES	74,29 %	35	14,29 %	19,23 %
VILLABLINO	61,90 %	126	12,70 %	20,51 %
VILLACASTIN	54,55 %	44	29,55 %	54,17 %
VILLADA	75,00 %	24	12,50 %	16,67 %
VILLADIEGO	50,00 %	40	15,00 %	30,00 %
VILLAFRANCA	56,96 %	79	15,19 %	26,67 %
VILLAFRECHOS	60,98 %	41	19,51 %	32,00 %
VILLALON DE CAMPOS	66,67 %	24	25,00 %	37,50 %
VILLALPANDO	50,00 %	48	22,92 %	45,83 %
VILLAMURIEL	44,44 %	135	14,81 %	33,33 %
VILLARCAYO	67,44 %	86	19,77 %	29,31 %
VILLARRAMIEL	61,90 %	21	38,10 %	61,54 %
VILLORIA	40,35 %	114	7,02 %	17,39 %
VIRGEN CONCHA	53,29 %	304	20,07 %	37,65 %
VITIGUDINO	46,15 %	91	9,89 %	21,43 %
ZAMORA NORTE	48,03 %	152	12,50 %	26,03 %
ZAMORA SUR	43,72 %	199	17,09 %	39,08 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XC / ESTEROIDES ANTIBACTERIANOS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
AGREDA		16,13 %			35,48 %		25,81 %			29,03 %			6,45 %		

AGUILAR DE CAMPOO		31,96 %			42,27 %		7,22 %	11,34 %		5,15 %	1,03 %		8,25 %		
ALAEJOS		25,00 %			16,67 %		29,17 %	8,33 %		8,33 %			20,83 %		
ALBA DE TORMES		37,21 %			27,13 %		31,01 %			11,63 %			5,43 %		
ALDEADAVILA DE LA RIBE		5,00 %			30,00 %		42,50 %	2,50 %	5,00 %	12,50 %			20,00 %		
ALISTE		34,88 %			30,23 %		18,60 %			30,23 %					
ALMAZAN		41,43 %		1,43 %	40,00 %		15,71 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %			5,71 %		
ALTA SANABRIA					30,77 %		53,85 %			7,69 %			7,69 %		
ANTONIO GUTIERREZ		33,46 %			38,58 %		18,11 %	1,57 %		7,87 %	1,18 %		5,91 %		
ARANDA NORTE		36,55 %			44,14 %		10,34 %	2,76 %	0,69 %	7,59 %			4,14 %		
ARANDA RURAL		13,33 %			58,67 %		18,67 %	4,00 %		13,33 %			2,67 %		
ARANDA SUR		30,41 %			35,81 %		20,27 %	0,68 %		12,16 %			9,46 %		
ARCOS DE JALON		34,78 %			34,78 %		8,70 %	13,04 %		17,39 %		4,35 %	8,70 %		
ARENAS DE SAN PEDRO		38,46 %		1,10 %	42,86 %		10,99 %	5,49 %		12,09 %	1,10 %		2,20 %		
AREVALO	0,53 %	39,15 %			38,62 %		13,76 %	0,53 %	0,53 %	4,76 %			13,23 %		
ARMUNIA		49,57 %			36,52 %		9,57 %	2,61 %		6,09 %			2,61 %		
ARTURO EYRIES		41,79 %			41,79 %		11,94 %			8,96 %			1,49 %		
ASTORGA I		33,64 %			37,27 %		4,55 %	0,91 %	0,91 %	20,91 %			13,64 %		
ASTORGA II		14,29 %			28,57 %	4,76 %	14,29 %			42,86 %			4,76 %		
AVILA ESTACION		54,88 %			31,71 %		9,76 %		1,22 %	3,66 %			2,44 %		
AVILA NORTE		50,67 %			34,67 %		8,00 %		1,33 %	1,33 %	1,33 %		8,00 %		
AVILA RURAL		51,61 %			17,74 %		20,97 %	4,84 %		3,23 %			11,29 %		
AVILA SUR ESTE		39,44 %	0,70 %		52,11 %		5,63 %	0,70 %		3,52 %			4,23 %		
AVILA SUR OESTE		38,00 %		1,00 %	35,00 %		13,00 %		1,00 %	4,00 %	1,00 %		13,00 %		
BABIA		40,00 %			40,00 %					20,00 %			20,00 %		
BALTANAS		23,08 %			19,23 %		38,46 %	7,69 %		7,69 %			19,23 %		
BAÑEZA I		31,06 %			31,82 %	1,52 %	21,21 %	1,52 %	1,52 %	11,36 %	0,76 %		8,33 %		
BAÑEZA II		29,03 %			32,26 %		24,19 %	6,45 %		6,45 %	3,23 %		3,23 %		
BARCO DE AVILA		32,43 %			24,32 %		10,81 %			35,14 %			2,70 %		
BARRIO ESPAÑA		46,34 %			39,02 %		2,44 %			14,63 %			7,32 %		
BEJAR		24,75 %			46,53 %		13,86 %	1,98 %		9,90 %			6,93 %		
BEORADO		45,83 %			54,17 %		4,17 %		4,17 %	8,33 %					
BEMBIBRE		27,13 %			45,74 %		4,65 %	7,75 %		15,50 %			6,20 %		
BENAVENTE NORTE		51,49 %			29,10 %		12,69 %	3,73 %	0,75 %	9,70 %	0,75 %		10,45 %		
BENAVENTE SUR		38,55 %			37,35 %		18,07 %	2,41 %		11,45 %	1,20 %		4,82 %		
BERLANGA DE DUERO	9,09 %	36,36 %			36,36 %		18,18 %		9,09 %				9,09 %		
BOÑAR		33,33 %			50,00 %		6,67 %	6,67 %		10,00 %					
BRIVIESCA		43,14 %			47,06 %		5,88 %			3,92 %			1,96 %		
BURGO DE OSMA		29,33 %			24,00 %		26,67 %	22,67 %		4,00 %			1,33 %		
BURGOHONDO		33,33 %			30,00 %		16,67 %			6,67 %			30,00 %		
BURGOS RURAL NORTE		20,00 %			58,00 %		6,00 %	2,00 %		10,00 %			4,00 %		
BURGOS RURAL SUR		30,67 %			38,67 %		10,67 %	2,67 %		4,00 %			17,33 %		
CACABELOS		19,47 %			39,82 %	0,88 %	10,62 %	7,08 %		7,96 %			20,35 %		
CALZADA DE VALDUNCIEI		12,50 %			55,00 %		15,00 %	5,00 %		10,00 %			5,00 %		
CAMARZANA DE TERA		47,22 %			33,33 %		11,11 %			8,33 %			8,33 %		
CAMPOS LAMPREANA		40,00 %			33,33 %		33,33 %			6,67 %					
CANALEJAS-SANCTI SPIR		15,91 %			52,27 %		13,64 %	4,55 %		11,36 %			13,64 %		
CANDELEDA		32,20 %			13,56 %		40,68 %	8,47 %	1,69 %	6,78 %			10,17 %		
CANTALAPIEDRA		16,67 %			38,89 %		27,78 %						16,67 %		
CANTALEJO		41,33 %		1,33 %	38,67 %	1,33 %	4,00 %	2,67 %		6,67 %			9,33 %		
CANTERAC		24,00 %			50,00 %		16,00 %	2,00 %		12,00 %			6,00 %		
CAPUCHINOS		26,74 %			41,86 %		12,79 %	3,49 %		11,63 %			6,98 %		

[illegible]

CARBAJALES DE ALBA		22,22 %			44,44 %					33,33 %				
CARBALLEDA		39,29 %			28,57 %		35,71 %			3,57 %			10,71 %	
CARBONERO	1,27 %	39,24 %			41,77 %		11,39 %			11,39 %			5,06 %	
CARRION DE LOS CONDES		60,00 %			30,00 %		5,00 %		5,00 %	10,00 %			5,00 %	
CASA DEL BARCO		37,80 %			43,90 %		2,44 %			9,76 %	1,22 %		6,10 %	
CEBREROS		32,93 %			40,24 %	7,32 %	14,63 %	1,22 %		6,10 %	1,22 %		3,66 %	
CENTRO-GAMAZO		18,57 %			41,43 %		4,29 %	14,29 %		14,29 %	2,86 %		7,14 %	
CERVERA DE PISUERGA		33,33 %		3,33 %	60,00 %		6,67 %						3,33 %	
CIGALES		28,95 %			63,16 %					2,63 %	7,89 %		2,63 %	
CIRCULAR		23,64 %			49,09 %		3,64 %	3,64 %		10,91 %	3,64 %		7,27 %	
CIRCUNVALACION		43,81 %			44,76 %		7,62 %	1,90 %		2,86 %			4,76 %	
CISTIerna		35,09 %			36,84 %		8,77 %	3,51 %		19,30 %			7,02 %	
CIUDAD RODRIGO		37,66 %			40,91 %		10,39 %	1,95 %		12,34 %			3,25 %	
CONDADO DE TREVIÑO		38,46 %			61,54 %									
CONDESA		18,45 %			30,10 %		26,21 %	5,83 %	0,97 %	15,53 %	1,94 %		7,77 %	
CORRALES		27,78 %			22,22 %		38,89 %	2,78 %		8,33 %			2,78 %	
CRISTOBAL ACOSTA		25,45 %			47,27 %		14,55 %			7,27 %			9,09 %	
CRUCERO		43,16 %			24,21 %		12,63 %	3,16 %		15,79 %	1,05 %		7,37 %	
CUELLAR		21,52 %			55,70 %		10,13 %	3,80 %		10,13 %	1,27 %		6,33 %	
CUENCA DEL BERNESGA		28,13 %			14,06 %		53,13 %	1,56 %		4,69 %			6,25 %	
DELICIAS I		39,56 %	0,55 %		40,66 %		10,44 %	3,85 %	0,55 %	4,95 %			6,04 %	
DELICIAS II		37,19 %			34,71 %		5,79 %	2,48 %		6,61 %	0,83 %		17,36 %	
DESCONOCIDO		100,00 %												
EL EJIDO		37,21 %			38,76 %		11,63 %	6,98 %		6,98 %			1,55 %	
EL ESPINAR		51,95 %			42,86 %		3,90 %	2,60 %		1,30 %	2,60 %		3,90 %	
ERAS DEL BOSQUE		35,25 %			48,20 %		7,19 %	1,44 %		6,47 %			12,95 %	
ESGUEVILLAS		77,78 %			11,11 %								11,11 %	
ESPINOSA DE LOS MONTE		58,06 %			25,81 %		9,68 %			3,23 %			12,90 %	
FABERO		38,36 %		1,37 %	45,21 %		15,07 %	4,11 %	1,37 %	4,11 %			5,48 %	
FONTIVEROS		30,00 %			46,67 %		23,33 %			3,33 %			10,00 %	
FROMISTA		24,14 %	10,34 %		51,72 %		6,90 %			3,45 %			3,45 %	
FUENTEGUINALDO		14,29 %			42,86 %	7,14 %	50,00 %							
FUENTESAUCO		80,00 %			13,33 %		13,33 %							
FUENTES DE OÑORO		31,25 %			62,50 %					6,25 %			6,25 %	
GAMONAL-ANTIGUA		36,59 %	1,22 %		53,66 %		1,22 %	2,44 %		3,66 %			6,10 %	
GARCIA LORCA		18,03 %			70,49 %					4,92 %			11,48 %	
GARRIDO NORTE		30,99 %			33,80 %		19,01 %	5,63 %		11,97 %			8,45 %	
GARRIDO SUR		29,63 %			39,15 %		18,52 %	1,06 %		8,47 %	0,53 %		12,17 %	
GOMARA		50,00 %			16,67 %		16,67 %			16,67 %				
GREDOS		66,67 %			16,67 %								16,67 %	
GUARDO		32,05 %			35,90 %		11,54 %	1,28 %	1,28 %	6,41 %	1,28 %		20,51 %	
GUAREÑA		30,30 %			33,33 %		30,30 %	3,03 %		3,03 %			12,12 %	
GUIJUELO		22,12 %			35,40 %		38,05 %	3,54 %		7,96 %			4,42 %	
HERRERA DE PISUERGA		56,67 %			46,67 %		3,33 %			3,33 %				
HUERTA DEL REY		53,00 %	1,00 %		31,00 %		9,00 %			9,00 %			1,00 %	
HUERTA DE REY		25,00 %			50,00 %								37,50 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ		15,38 %			66,67 %	1,28 %	3,85 %	10,26 %	1,28 %	5,13 %			2,56 %	
ISCAR		28,24 %			49,41 %		9,41 %	2,35 %		8,24 %			9,41 %	
JARDINILLOS		55,45 %			29,70 %		2,97 %	2,97 %	1,98 %	4,95 %	0,99 %		10,89 %	
JOSE AGUADO		40,43 %	0,53 %		36,17 %		4,26 %	7,98 %		5,32 %			9,57 %	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		44,44 %	2,38 %		37,30 %		5,56 %	2,38 %		7,14 %			5,56 %	

[illegible]

LA ALAMEDILLA		30,53 %	1,05 %		27,37 %		27,37 %			11,58 %			5,26 %		
LA ALBERCA		43,75 %		3,13 %	28,13 %	6,25 %	9,38 %		3,13 %	3,13 %			18,75 %		
LA CABRERA		14,29 %			14,29 %		57,14 %			14,29 %			14,29 %		
LA FUENTE SAN ESTEBAN		28,57 %			50,00 %		25,00 %			3,57 %			7,14 %		
LAGUNA DE DUERO		48,40 %			30,85 %		15,96 %	1,06 %		7,98 %			3,72 %		
LA MAGDALENA		58,33 %			33,33 %		8,33 %						8,33 %		
LANZAHITA		24,32 %			18,92 %		48,65 %	2,70 %		2,70 %			2,70 %		
LA PALOMERA		38,46 %		0,51 %	29,74 %		10,77 %	11,79 %	0,51 %	7,18 %	0,51 %		10,77 %		
LA PUEBLA		43,24 %			35,14 %		7,21 %	0,90 %		13,51 %			7,21 %		
LAS HUELGAS		24,32 %	2,70 %		67,57 %			5,41 %		2,70 %			2,70 %		
LA SIERRA		58,33 %			33,33 %				8,33 %						
LAS NAVAS DEL MARQUE		58,93 %			26,79 %		5,36 %	1,79 %		3,57 %			8,93 %		
LAS TORRES		28,57 %			49,21 %		11,11 %	1,59 %		4,76 %			11,11 %		
LA VICTORIA		54,02 %			34,48 %		1,15 %	1,15 %		8,05 %	1,15 %		4,60 %		
LEDESMA		43,24 %			18,92 %		10,81 %			18,92 %			10,81 %		
LERMA		8,93 %			60,71 %		17,86 %			12,50 %			7,14 %		
LINARES DE RIOFRIO		46,15 %			11,54 %		34,62 %	7,69 %		3,85 %	3,85 %				
LOS COMUNEROS		41,89 %			36,49 %	1,35 %	10,81 %	8,11 %		9,46 %			1,35 %		
LOS CUBOS		31,11 %			48,89 %		12,22 %			8,89 %			6,67 %		
LUMBRALES		25,00 %			32,14 %		25,00 %			17,86 %			7,14 %		
MADRIGAL ALTAS TORRE		58,62 %			41,38 %		6,90 %			3,45 %	3,45 %		3,45 %		
MAGDALENA		20,41 %			34,69 %		26,53 %			20,41 %			6,12 %		
MANSILLA DE LAS MULAS		17,39 %			43,48 %		8,70 %	17,39 %		21,74 %			4,35 %		
MATALLANA DE TORIO		30,00 %			40,00 %					30,00 %					
MATILLA DE LOS CAÑOS		3,85 %			34,62 %		7,69 %	38,46 %		11,54 %			15,38 %		
MAYORGA DE CAMPOS		28,57 %			71,43 %										
MEDINA DEL CAMPO RURAL		36,84 %			40,35 %		15,79 %	1,75 %		3,51 %			7,02 %		
MEDINA DEL CAMPO URBANO		39,91 %			42,72 %		7,04 %	1,41 %	0,47 %	8,92 %	0,47 %		8,92 %		
MEDINA DE POMAR		30,00 %			62,50 %		5,00 %	2,50 %		5,00 %			2,50 %		
MEDINA DE RIOSECO		43,48 %			26,09 %		30,43 %			6,52 %			8,70 %		
MELGAR DE FERNAMENTAL		18,52 %			77,78 %								3,70 %		
MIGUEL ARMIJO	0,89 %	30,36 %			29,46 %		26,79 %	1,79 %		6,25 %			8,93 %		
MIRANDA DEL CASTAÑAR		30,77 %			46,15 %		15,38 %			15,38 %					
MIRANDA ESTE		45,11 %			36,09 %		8,27 %	0,75 %	0,75 %	6,02 %			10,53 %		
MIRANDA OESTE		38,24 %			32,77 %		20,17 %	5,46 %		6,30 %			7,98 %		
MOMBELTRAN		28,13 %			15,63 %		28,13 %	28,13 %	3,13 %	15,63 %			9,38 %		
MOTA DEL MARQUES		45,45 %			45,45 %								9,09 %		
MUÑANA		27,78 %			66,67 %		16,67 %								
MUÑICO		25,00 %			12,50 %		62,50 %			12,50 %					
NAVA DE LA ASUNCION		46,15 %			28,21 %		4,27 %	5,13 %	1,71 %	11,97 %	0,85 %		11,97 %		
OLMEDO	3,03 %	57,58 %			33,33 %		3,03 %			3,03 %			3,03 %		
OLVEGA		49,09 %			41,82 %		3,64 %			9,09 %			1,82 %		
OSORNO		35,71 %			35,71 %		7,14 %			7,14 %			28,57 %		
PALENCIA RURAL		56,25 %			22,92 %		6,25 %			12,50 %			8,33 %		
PAMPLIEGA					75,00 %					25,00 %			25,00 %		
PARADA DE MOLINO		46,81 %			29,08 %		15,60 %	1,42 %	0,71 %	3,55 %	0,71 %		8,51 %		
PAREDES DE NAVA		56,00 %		4,00 %	12,00 %		8,00 %	4,00 %		4,00 %			12,00 %		
PARQUESOL		42,14 %			40,00 %		11,43 %	1,43 %		7,14 %	0,71 %		8,57 %		
PEDROSILLO EL RALO		7,69 %			50,00 %		26,92 %	3,85 %		7,69 %			11,54 %		
PEÑAFIEL		26,51 %			43,37 %		15,66 %	1,20 %		13,25 %			10,84 %		
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		29,01 %			35,11 %		29,01 %	1,53 %		3,82 %			12,21 %		

[illegible]

PERIURBANA NORTE		23,04 %			35,48 %		29,03 %	3,69 %	0,46 %	11,98 %			6,45 %		
PERIURBANA SUR		28,68 %			41,86 %		9,30 %	0,78 %		19,38 %			12,40 %		
PIEDRAHITA		54,55 %			36,36 %		4,55 %						18,18 %		
PILARICA	1,18 %	42,35 %			45,88 %		8,24 %	2,35 %		3,53 %	1,18 %		2,35 %		
PINARES-COVALEDA		58,82 %			8,82 %		8,82 %	2,94 %		26,47 %					
PINTOR OLIVA		40,00 %			26,15 %		11,54 %	5,38 %	0,77 %	4,62 %	0,77 %		18,46 %		
PISUERGA		43,31 %	0,64 %		35,67 %		12,74 %	0,64 %		8,92 %			2,55 %		
PIZARRALES		16,03 %			50,64 %		29,49 %	1,28 %		5,77 %			5,13 %		
PLAZA DEL EJERCITO	1,09 %	51,09 %		1,09 %	23,91 %		8,70 %			11,96 %	1,09 %		4,35 %		
PONFERRADA I	0,55 %	37,91 %			30,77 %		26,37 %	4,95 %		7,14 %			3,30 %		
PONFERRADA II		30,25 %	0,62 %	0,62 %	48,77 %	0,62 %	16,05 %	1,23 %		1,23 %			6,79 %		
PONFERRADA III		29,55 %			56,82 %		12,88 %	0,76 %		4,55 %			3,03 %		
PONFERRADA IV		23,36 %			52,34 %		17,76 %	1,87 %	0,93 %	5,61 %			4,67 %		
PORTILLO		38,67 %			29,33 %		12,00 %	1,33 %		14,67 %	1,33 %		6,67 %		
PUEBLA DE SANABRIA		36,17 %			42,55 %		17,02 %		2,13 %	2,13 %			4,26 %		
PUENTE DOMINGO FLORE		30,00 %			65,00 %		5,00 %								
PUERTA NUEVA	0,57 %	41,71 %			34,86 %		16,00 %	0,57 %	1,14 %	4,57 %	0,57 %		6,86 %		
QUINTANAR DE LA SIERRA		28,57 %			47,62 %		4,76 %			4,76 %			14,29 %		
RIAÑO		8,33 %			16,67 %		58,33 %			8,33 %			16,67 %		
RIAZA		37,04 %			57,41 %		1,85 %		1,85 %	3,70 %			11,11 %		
RIBERA DEL ESLA		36,84 %			5,26 %		36,84 %	5,26 %		10,53 %			5,26 %		
RIBERA DEL ORBIGO		33,59 %	0,76 %		44,27 %		14,50 %	3,05 %		6,87 %			3,82 %		
ROA		21,62 %			64,86 %		2,70 %	2,70 %		8,11 %			13,51 %		
ROBLEDA		30,77 %			46,15 %		7,69 %	7,69 %		15,38 %			15,38 %		
RONDILLA I		33,33 %			43,94 %		7,58 %	3,03 %		15,15 %	3,03 %		6,06 %		
RONDILLA II		27,12 %			45,76 %		11,86 %			11,86 %			8,47 %		
SAHAGUN		33,33 %			36,36 %		12,12 %			18,18 %			6,06 %		
SALAS DE LOS INFANTES		34,78 %			56,52 %		4,35 %			8,70 %			4,35 %		
SALDAÑA		51,72 %			44,83 %					10,34 %			13,79 %		
SAN AGUSTIN		24,03 %	0,78 %		49,61 %		19,38 %	1,55 %		9,30 %			4,65 %		
SAN ANDRES DEL RABANAL		41,38 %			34,48 %		11,21 %	7,76 %		6,90 %	1,72 %		3,45 %		
SAN ESTEBAN DE GORMA		33,33 %			47,62 %		19,05 %			2,38 %					
SAN ILDEFONSO		20,41 %			28,57 %		48,98 %	6,12 %		4,08 %			2,04 %		
SAN JOSE		12,98 %			25,19 %		57,25 %	0,76 %		6,87 %	0,76 %		6,87 %		
SAN JUAN		18,68 %			37,36 %		30,77 %	4,40 %		5,49 %			7,69 %		
SAN LEONARDO DE YAGUAJAY		43,33 %			43,33 %		3,33 %	3,33 %		6,67 %			6,67 %		
SAN PABLO		34,55 %			34,55 %		16,36 %	1,82 %		5,45 %			10,91 %		
SAN PEDRO DEL ARROYO	4,76 %	33,33 %			38,10 %		14,29 %			9,52 %			9,52 %		
SAN PEDRO MANRIQUE		9,09 %			9,09 %		81,82 %								
SANTA CLARA		34,94 %			44,58 %		14,46 %	1,20 %		4,82 %			4,82 %		
SANTA ELENA		43,94 %			28,03 %		21,97 %	3,79 %		6,06 %			6,82 %		
SANTA MARIA		35,06 %			32,47 %		19,48 %	5,19 %		10,39 %			2,60 %		
SANTA MARTA		23,76 %			20,99 %		53,59 %	1,10 %	1,10 %	6,63 %			4,97 %		0,55 %
SAYAGO		31,25 %			53,13 %		18,75 %			6,25 %	3,13 %				
SEDANO		66,67 %			33,33 %										
SEGOVIA I		52,07 %			37,19 %	0,83 %	4,13 %		1,65 %	4,96 %			4,13 %		
SEGOVIA II		45,70 %			33,77 %		3,31 %		3,97 %	3,97 %			14,57 %		
SEGOVIA III		50,70 %			38,03 %		7,04 %		1,41 %	5,63 %	1,41 %		4,23 %		
SEGOVIA RURAL		42,42 %			45,45 %		11,36 %	0,76 %		2,27 %			5,30 %		
SEPULVEDA		42,86 %			48,98 %		6,12 %			4,08 %			2,04 %		
SERRADA		23,81 %			57,14 %		16,67 %	4,76 %		4,76 %	2,38 %				

[illegible]

SORIA NORTE		38,74 %	0,90 %		27,03 %		27,03 %	8,11 %		4,50 %			4,50 %		
SORIA RURAL		39,77 %			38,64 %		21,59 %	1,14 %	2,27 %	3,41 %			5,68 %		
SORIA SUR		49,17 %			30,00 %		12,50 %	0,83 %	0,83 %	5,83 %			5,00 %		
SORIA TARDE		64,71 %			5,88 %					17,65 %			14,71 %		
SOTILLO DE LA ADRADA		23,60 %			35,96 %		19,10 %	1,12 %	1,12 %	14,61 %			10,11 %		
SUR		37,93 %	3,45 %	1,15 %	34,48 %		10,34 %	1,15 %		8,05 %			4,60 %		
TABARA		9,68 %			12,90 %		67,74 %	3,23 %		9,68 %	3,23 %		3,23 %		
TAMAMES		36,84 %			42,11 %		10,53 %			10,53 %			5,26 %		
TEJARES		41,67 %		1,04 %	37,50 %		11,46 %		2,08 %	5,21 %	1,04 %		11,46 %		
TORDESILLAS		25,30 %	1,20 %		37,35 %		12,05 %	1,20 %		10,84 %			14,46 %		
TORENO		34,78 %			60,87 %		4,35 %		8,70 %	4,35 %					
TORO		34,38 %			45,83 %		9,38 %	1,04 %	1,04 %	13,54 %			2,08 %		
TORQUEMADA		60,00 %	5,00 %		20,00 %			10,00 %		10,00 %					
TORTOLA		53,57 %		0,89 %	34,82 %		8,04 %		0,89 %	3,57 %	1,79 %		7,14 %		
TROBAJO DEL CAMINO - V		48,59 %			33,80 %		13,38 %	1,41 %		7,04 %			2,82 %		
TUDELA		31,75 %			50,79 %		9,52 %	3,17 %		9,52 %	1,59 %		3,17 %		
UNIVERSIDAD CENTRO	1,61 %	38,71 %			37,10 %		11,29 %	8,06 %		3,23 %			8,06 %		
VALDERAS		37,14 %			40,00 %		22,86 %			8,57 %					
VALENCIA DE DON JUAN		30,61 %			37,76 %		30,61 %	1,02 %	1,02 %	6,12 %			4,08 %		
VALLADOLID RURAL I		57,81 %			25,00 %		9,38 %			9,38 %			1,56 %		
VALLADOLID RURAL II		35,00 %			52,50 %		7,50 %			2,50 %			7,50 %		
VALLE DE LOSA		33,33 %			66,67 %										
VALLE DE MENA		12,82 %			69,23 %		5,13 %	5,13 %		5,13 %			12,82 %		
VALLE DE TOBALINA					92,31 %			7,69 %							
VALLE DE VALDEBEZANA		33,33 %			33,33 %		11,11 %			11,11 %			22,22 %		
VENTA DE BAÑOS		42,37 %			37,29 %		13,56 %		1,69 %	5,08 %			5,08 %		
VIDRIALES		19,23 %			46,15 %		50,00 %			11,54 %			3,85 %		
VILLABLINO		20,51 %			61,54 %		12,82 %		2,56 %	7,69 %	1,28 %		8,97 %		
VILLACASTIN		54,17 %			25,00 %		8,33 %			8,33 %				4,17 %	
VILLADA		16,67 %			50,00 %		16,67 %						27,78 %		
VILLADIEGO		30,00 %			25,00 %		25,00 %	15,00 %		5,00 %			10,00 %		
VILLAFRANCA		26,67 %			48,89 %		8,89 %		2,22 %	15,56 %			13,33 %		
VILLAFRECHOS		32,00 %			40,00 %		4,00 %			8,00 %			16,00 %		
VILLALON DE CAMPOS		37,50 %			31,25 %		12,50 %	12,50 %		12,50 %			6,25 %		
VILLALPANDO		45,83 %			37,50 %		4,17 %	4,17 %		12,50 %					
VILLAMURIEL		33,33 %			20,00 %			33,33 %		18,33 %			6,67 %		
VILLARCAYO		29,31 %			41,38 %		10,34 %	5,17 %		12,07 %			8,62 %		
VILLARRAMIEL		61,54 %			30,77 %		7,69 %		7,69 %						
VILLORIA		17,39 %			52,17 %		15,22 %	2,17 %		4,35 %	2,17 %		13,04 %		
VIRGEN CONCHA		37,65 %			45,06 %		11,11 %			4,94 %			9,26 %		
VITIGUDINO		21,43 %			61,90 %		4,76 %	2,38 %		7,14 %			11,90 %		
ZAMORA NORTE		26,03 %			31,51 %		31,51 %	2,74 %		12,33 %			5,48 %		
ZAMORA SUR		39,08 %			31,03 %		21,84 %	2,30 %		5,75 %			5,75 %		
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	0,13 %	0,08 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	0,01 %	7,23 %	0,01 %	0,01 %

[illegible]

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	53,45 %	58	8,62 %	16,13 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	55	50,91 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		58	53,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA	16,13 %	35,48 %	25,81 %	29,03 %	6,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGUILAR DE CAMPOO	61,01 %	159	19,50 %	31,96 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGUILAR DE CAMPOO	31,96 %	42,27 %	7,22 %	11,34 %	5,15 %	1,03 %	8,25 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	26,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	105	56,19 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	63,64 %
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		159	61,01 %

ALAEJOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis	
--------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01		
ALAEJOS	43,64 %	55	10,91 %	25,00 %		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %		

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	48,84 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	
	TOTAL PACIENTES Otitis	55	43,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALAEJOS	25,00 %	16,67 %	29,17 %	8,33 %	8,33 %	20,83 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALBA DE TORMES	57,33 %	225	21,33 %	37,21 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALBA DE TORMES	37,21 %	27,13 %	31,01 %	11,63 %	5,43 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	170	58,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	16	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	225	57,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06			
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01					
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		56,34 %	71	2,82 %	5,00 %					
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %					
							Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
							H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
							H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
							H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	51	52,94 %
							H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
							H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
							H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	37,50 %
							TOTAL PACIENTES Otitis		71	56,34 %
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS		
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		5,00 %	30,00 %	42,50 %	2,50 %	5,00 %	12,50 %	20,00 %		
TOTAL GAP		35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %		

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALISTE	50,59 %	85	17,65 %	34,88 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
ALISTE	34,88 %	30,23 %	18,60 %	30,23 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	42,86 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	67	47,76 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	37,50 %
TOTAL PACIENTES Otitis		85	50,59 %

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALMAZAN	56,45 %	124	23,39 %	41,43 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	25	32,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	85	62,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		124	56,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALMAZAN	41,43 %	1,43 %	40,00 %	15,71 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	5,71 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

ALTA SANABRIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALTA SANABRIA	100,00 %	13		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	13	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	13	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALTA SANABRIA	30,77 %	53,85 %	7,69 %	7,69 %
TOTAL GAP	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ANTONIO GUTIERREZ	52,81 %	481	17,67 %	33,46 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	33,46 %	38,58 %	18,11 %	1,57 %	7,87 %	1,18 %	5,91 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	32	21,88 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	406	51,97 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	92,31 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	13	46,15 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		481	52,81 %

ARANDA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01				
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01										
ARANDA NORTE	52,73 %	275	19,27 %	36,55 %										
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %										
						</								

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA NORTE	36,55 %	44,14 %	10,34 %	2,76 %	0,69 %	7,59 %	4,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA RURAL	49,34 %	152	6,58 %	13,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA RURAL	13,33 %	58,67 %	18,67 %	4,00 %	13,33 %	2,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	116	44,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	63,64 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	152	49,34 %

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA SUR	56,27 %	263	17,11 %	30,41 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA SUR	30,41 %	35,81 %	20,27 %	0,68 %	12,16 %	9,46 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	23,81 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	64,29 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	185	53,51 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	20	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	14	85,71 %
70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	263	56,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01					
ARCOS DE JALON		50,00 %	46	17,39 %	34,78 %					
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %					
							H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	
							H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	39	53,85 %
							H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
							H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
							TOTAL PACIENTES Otitis		46	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	34,78 %	34,78 %	8,70 %	13,04 %	17,39 %	4,35 %	8,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,01 %	7,23 %

ARENAS DE SAN PEDRO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARENAS DE SAN PEDRO	47,89 %	190	18,42 %	38,46 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	6	83,33 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	16,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	151	43,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	70,59 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		190	47,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARENAS DE SAN PEDRO	38,46 %	1,10 %	42,86 %	10,99 %	5,49 %	12,09 %	1,10 %	2,20 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AREVALO	62,79 %	301	24,58 %	39,15 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AREVALO	0,53 %	39,15 %	38,62 %	13,76 %	0,53 %	0,53 %	4,76 %	13,23 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	5	80,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	28	17,86 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	73,33 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	224	65,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	63,64 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	15	53,33 %
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		301	62,79 %

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARMUNIA	45,82 %	251	22,71 %	49,57 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARMUNIA	49,57 %	36,52 %	9,57 %	2,61 %	6,09 %	2,61 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	21,05 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	218	46,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	251	45,82 %

ARTURO EYRIES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARTURO EYRIES	44,08 %	152	18,42 %	41,79 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARTURO EYRIES	41,79 %	41,79 %	11,94 %	8,96 %	1,49 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	110	44,55 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	62,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	28,57 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	152	44,08 %

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA I	64,71 %	170	21,76 %	33,64 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	33,64 %	37,27 %	4,55 %	0,91 %	0,91 %	20,91 %	13,64 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	117	62,39 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	18	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	88,24 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		170	64,71 %

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA II	48,84 %	43	6,98 %	14,29 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	14,29 %	28,57 %	4,76 %	14,29 %	42,86 %	4,76 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	34	41,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	43	48,84 %

AVILA ESTACION

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
AVILA ESTACION	44,09 %	186	24,19 %	54,88 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
								TOTAL PACIENTES Otitis	186	44,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA ESTACION	54,88 %	31,71 %	9,76 %	1,22 %	3,66 %	2,44 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

AVILA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
AVILA NORTE	55,15 %	136	27,94 %	50,67 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		136	55,15 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	50,67 %	34,67 %	8,00 %	1,33 %	1,33 %	1,33 %	8,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

AVILA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA RURAL	53,91 %	115	27,83 %	51,61 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA RURAL	51,61 %	17,74 %	20,97 %	4,84 %	3,23 %	11,29 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	7,69 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	87,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	88	55,68 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	115	53,91 %

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR ESTE	61,74 %	230	24,78 %	40,14 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR ESTE	39,44 %	0,70 %	52,11 %	5,63 %	0,70 %	3,52 %	4,23 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	30	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	71,43 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	150	58,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	73,68 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	20	80,00 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		230	61,74 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR OESTE	47,85 %	209	18,18 %	38,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	26	26,92 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	63,64 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	154	47,40 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		209	47,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR OESTE	38,00 %	1,00 %	35,00 %	13,00 %	1,00 %	4,00 %	1,00 %	13,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BABIA	50,00 %	10	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	8	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	10	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BABIA	40,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	7,23 %

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BALTANAS	66,67 %	39	15,38 %	23,08 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	25	72,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		39	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BALTANAS	23,08 %	19,23 %	38,46 %	7,69 %	7,69 %	19,23 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01					
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01											
BAÑEZA I	48,53 %	272	15,07 %	31,06 %											
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %											
							TOTAL PACIENTES Otitis		272	48,53 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	31,06 %	31,82 %	1,52 %	21,21 %	1,52 %	1,52 %	11,36 %	0,76 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BAÑEZA II	49,60 %	125	14,40 %	29,03 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	29,03 %	32,26 %	24,19 %	6,45 %	6,45 %	3,23 %	3,23 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	92	47,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	66,67 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		125	49,60 %

BARCO DE AVILA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARCO DE AVILA	46,25 %	80	15,00 %	32,43 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	32,43 %	24,32 %	10,81 %	35,14 %	2,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	66	45,45 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	80	46,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARRIO ESPAÑA	50,62 %	81	23,46 %	46,34 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARRIO ESPAÑA	46,34 %	39,02 %	2,44 %	14,63 %	7,32 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	16,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	62	45,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		81	50,62 %

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEJAR	34,12 %	296	8,45 %	24,75 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	24,75 %	46,53 %	13,86 %	1,98 %	9,90 %	6,93 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	20,69 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	230	31,30 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	33,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	76,92 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	25,00 %
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	296	34,12 %

BELORADO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BELORADO	46,15 %	52	21,15 %	45,83 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS
BELORADO	45,83 %	54,17 %	4,17 %	4,17 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	30	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	52	46,15 %

BEMBIBRE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEMBIBRE	42,57 %	303	11,55 %	27,13 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEMBIBRE	27,13 %	45,74 %	4,65 %	7,75 %	15,50 %	6,20 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	54	12,96 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	57,14 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	223	45,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	50,00 %
70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	303	42,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE NORTE	53,17 %	252	27,38 %	51,49 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE NORTE	51,49 %	29,10 %	12,69 %	3,73 %	0,75 %	9,70 %	0,75 %	10,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	18,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	195	51,79 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	100,00 %
	Otitis media no especificada, bilateral	7	71,43 %
	Otitis media no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		252	53,17 %

BENAVENTE SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE SUR	51,23 %	324	19,75 %	38,55 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE SUR	38,55 %	37,35 %	18,07 %	2,41 %	11,45 %	1,20 %	4,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	33,33 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	23,81 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	73,33 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	238	47,06 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	18	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	21	90,48 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	20	45,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		324	51,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BERLANGA DE DUERO	44,00 %	25	16,00 %	36,36 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	46,15 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	6	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	25	44,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BERLANGA DE DUERO	9,09 %	36,36 %	36,36 %	18,18 %	9,09 %	9,09 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	7,23 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BOÑAR	53,57 %	56	17,86 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
BOÑAR	33,33 %	50,00 %	6,67 %	6,67 %	10,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	35	54,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		56	53,57 %

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BRIVIESCA	58,62 %	87	25,29 %	43,14 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	43,14 %	47,06 %	5,88 %	3,92 %	1,96 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	60	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	87	58,62 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGO DE OSMA	66,37 %	113	19,47 %	29,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGO DE OSMA	29,33 %	24,00 %	26,67 %	22,67 %	4,00 %	1,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	16	56,25 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	73	63,01 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		113	66,37 %

BURGOHONDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOHONDO	38,46 %	78	12,82 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	64	37,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		78	38,46 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	33,33 %	30,00 %	16,67 %	6,67 %	30,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOS RURAL NORTE	54,35 %	92	10,87 %	20,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL NORTE	20,00 %	58,00 %	6,00 %	2,00 %	10,00 %	4,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	23,08 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	61	54,10 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		92	54,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01				
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01										
BURGOS RURAL SUR	54,35 %	138	16,67 %	30,67 %										
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %										
<div>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico</div>														

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
CACABELOS	63,48 %	178	12,36 %	19,47 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		178	63,48 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CACABELOS	19,47 %	39,82 %	0,88 %	10,62 %	7,08 %	7,96 %	20,35 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01			
CALZADA DE VALDUNCIEL	60,61 %	66	7,58 %	12,50 %			
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
	CALZADA DE VALDUNCIEL	12,50 %	55,00 %	15,00 %	5,00 %	10,00 %	5,00 %
	TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %
	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01			
	H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %			
	H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %			
	H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	53	58,49 %			
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %				
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %				
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %				
	TOTAL PACIENTES Otitis	66	60,61 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMARZANA DE TERA	37,89 %	95	17,89 %	47,22 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMARZANA DE TERA	47,22 %	33,33 %	11,11 %	8,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	78	37,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	14,29 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	95	37,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMPOS LAMPREANA	48,39 %	31	19,35 %	40,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	25	56,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	31	48,39 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
CAMPOS LAMPREANA	40,00 %	33,33 %	33,33 %	6,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	48,35 %	91	7,69 %	15,91 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANALEJAS-SANCTI SPIR	15,91 %	52,27 %	13,64 %	4,55 %	11,36 %	13,64 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	75	45,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		91	48,35 %

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANDELEDA	50,86 %	116	16,38 %	32,20 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	32,20 %	13,56 %	40,68 %	8,47 %	1,69 %	6,78 %	10,17 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	95	49,47 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	13	53,85 %
TOTAL PACIENTES Otitis		116	50,86 %

CANTALAPIEDRA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALAPIEDRA	33,96 %	53	5,66 %	16,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	40	35,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	53	33,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALAPIEDRA	16,67 %	38,89 %	27,78 %	16,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	7,23 %

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALEJO	63,03 %	119	26,05 %	41,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINAS INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACTA MASA	J01DB / CEFALOSPO RINAS DE PRIMERA GENERACIÓ N	J01DC / CEFALOSPO RINAS DE SEGUNDA GENERACIÓ N	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIÓ N	J01FA / MACRÓLIDO S	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
CANTALEJO	41,33 %	1,33 %	38,67 %	1,33 %	4,00 %	2,67 %	6,67 %	9,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	87	59,77 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	33,33 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
	Mastoiditis supurativa aguda, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		119	63,03 %

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTERAC	37,04 %	135	8,89 %	24,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTERAC	24,00 %	50,00 %	16,00 %	2,00 %	12,00 %	6,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	60,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	97	35,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		135	37,04 %

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAPUCHINOS	46,99 %	183	12,57 %	26,74 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAPUCHINOS	26,74 %	41,86 %	12,79 %	3,49 %	11,63 %	6,98 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	45	26,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	115	52,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	72,73 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	37,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	183	46,99 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBAJALES DE ALBA	60,00 %	15	13,33 %	22,22 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	15	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
CARBAJALES DE ALBA	22,22 %	44,44 %	33,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %

CARBALLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBALLEDA	50,91 %	55	20,00 %	39,29 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	39,29 %	28,57 %	35,71 %	3,57 %	10,71 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	50	48,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	55	50,91 %

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBONERO	71,17 %	111	27,93 %	39,24 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	1,27 %	39,24 %	41,77 %	11,39 %	11,39 %	5,06 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	64	73,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	111	71,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARRION DE LOS CONDES	48,78 %	41	29,27 %	60,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	71,43 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	26	42,31 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		41	48,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARRION DE LOS CONDES	60,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CASA DEL BARCO	55,78 %	147	21,09 %	37,80 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CASA DEL BARCO	37,80 %	43,90 %	2,44 %	9,76 %	1,22 %	6,10 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	113	53,98 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		147	55,78 %

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CEBREROS	52,56 %	156	17,31 %	32,93 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	123	50,41 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	54,55 %
TOTAL PACIENTES Otitis		156	52,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CEBREROS	32,93 %	40,24 %	7,32 %	14,63 %	1,22 %	6,10 %	1,22 %	3,66 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

CENTRO-GAMAZO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
CENTRO-GAMAZO	55,12 %	127	10,24 %	18,57 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		127	55,12 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CENTRO-GAMAZO	18,57 %	41,43 %	4,29 %	14,29 %	14,29 %	2,86 %	7,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CERVERA DE PISUERGA	54,55 %	55	18,18 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	40	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		55	54,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CERVERA DE PISUERGA	33,33 %	3,33 %	60,00 %	6,67 %	3,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	7,23 %

CIGALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIGALES	31,15 %	122	9,02 %	28,95 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIGALES	28,95 %	63,16 %	2,63 %	7,89 %	2,63 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	28	7,14 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	71	38,03 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	33,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	40,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
	TOTAL PACIENTES Otitis	122	31,15 %

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCULAR	36,67 %	150	8,67 %	23,64 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	23,64 %	49,09 %	3,64 %	3,64 %	10,91 %	3,64 %	7,27 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	22,73 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	105	33,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	40,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	57,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	60,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		150	36,67 %

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCUNVALACION	46,05 %	228	20,18 %	43,81 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCUNVALACION	43,81 %	44,76 %	7,62 %	1,90 %	2,86 %	4,76 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	34	11,76 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	33,33 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	156	48,72 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	81,82 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	16,67 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	228	46,05 %

CISTIERNA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01					
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01											
CISTIERNA	64,77 %	88	22,73 %	35,09 %											
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %											
							TOTAL PACIENTES Otitis				88	64,77 %			

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CISTIERNA	35,09 %	36,84 %	8,77 %	3,51 %	19,30 %	7,02 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

CIUDAD RODRIGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIUDAD RODRIGO	52,38 %	294	19,73 %	37,66 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIUDAD RODRIGO	37,66 %	40,91 %	10,39 %	1,95 %	12,34 %	3,25 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	33	30,30 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	62,50 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	223	52,02 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	76,92 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	36,36 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	294	52,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDADO DE TREVIÑO	46,43 %	28	17,86 %	38,46 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	21	57,14 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	28	46,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CONDADO DE TREVIÑO	38,46 %	61,54 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %

CONDESA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDESA	53,93 %	191	9,95 %	18,45 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDESA	18,45 %	30,10 %	26,21 %	5,83 %	0,97 %	15,53 %	1,94 %	7,77 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	14,81 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	150	58,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		191	53,93 %

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01		
CHORRALES	64,29 %	56	17,86 %	27,78 %		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %		
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01			
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	37,50 %			
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1				
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	65,12 %			
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %			
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %			
	TOTAL PACIENTES Otitis	56	64,29 %			

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRISTOBAL ACOSTA	42,97 %	128	10,94 %	25,45 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRISTOBAL ACOSTA	25,45 %	47,27 %	14,55 %	7,27 %	9,09 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	13,64 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	57,14 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	82	42,68 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	57,14 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	128	42,97 %

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRUCERO	58,64 %	162	25,31 %	43,16 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	43,16 %	24,21 %	12,63 %	3,16 %	15,79 %	1,05 %	7,37 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	121	53,72 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	33,33 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		162	58,64 %

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUELLAR	48,17 %	164	10,37 %	21,52 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	21,52 %	55,70 %	10,13 %	3,80 %	10,13 %	1,27 %	6,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	32	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	86	43,02 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	90,91 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	8	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		164	48,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUENCA DEL BERNESGA	64,00 %	100	18,00 %	28,13 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUENCA DEL BERNESGA	28,13 %	14,06 %	53,13 %	1,56 %	4,69 %	6,25 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	77	70,13 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	33,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	100	64,00 %

DELICIAS I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS I	49,32 %	369	19,78 %	40,11 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS I	39,56 %	0,55 %	40,66 %	10,44 %	3,85 %	0,55 %	4,95 %	6,04 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	13	76,92 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	303	46,53 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	86,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	14	21,43 %
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		369	49,32 %

DELICIAS II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS II	51,05 %	237	18,99 %	37,19 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	37,19 %	34,71 %	5,79 %	2,48 %	6,61 %	0,83 %	17,36 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	204	47,55 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	87,50 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		237	51,05 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-12

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
DESCONOCIDO	100,00 %	2	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	2	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
DESCONOCIDO	100,00 %
TOTAL GAP	35,54 %

EL EJIDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
EL EJIDO	53,31 %	242	19,83 %	37,21 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL EJIDO	37,21 %	38,76 %	11,63 %	6,98 %	6,98 %	1,55 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	46	21,74 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	172	59,30 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		242	53,31 %

EL ESPINAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
EL ESPINAR	74,04 %	104	38,46 %	51,95 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		104	74,04 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL ESPINAR	51,95 %	42,86 %	3,90 %	2,60 %	1,30 %	2,60 %	3,90 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ERAS DEL BOSQUE	53,88 %	258	18,99 %	35,25 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ERAS DEL BOSQUE	35,25 %	48,20 %	7,19 %	1,44 %	6,47 %	12,95 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	39	10,26 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	161	53,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	29	68,97 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	25	84,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		258	53,88 %

ESGUEVILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.2025-012025-022025-032025-042025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESGUEVILLAS	60,00 %	15	46,67 %	77,78 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	15	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESGUEVILLAS	77,78 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESPINOSA DE LOS MONTE	49,21 %	63	28,57 %	58,06 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTE	58,06 %	25,81 %	9,68 %	3,23 %	12,90 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	49	46,94 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		63	49,21 %

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FABERO	57,48 %	127	22,05 %	38,36 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	57,89 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		127	57,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	38,36 %	1,37 %	45,21 %	15,07 %	4,11 %	1,37 %	4,11 %	5,48 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FONTIVEROS	60,00 %	50	18,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FONTIVEROS	30,00 %	46,67 %	23,33 %	3,33 %	10,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	22,22 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	32	53,13 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	71,43 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	62,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		50	60,00 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FROMISTA	53,70 %	54	18,52 %	34,48 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	24,14 %	10,34 %	51,72 %	6,90 %	3,45 %	3,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	36	52,78 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		54	53,70 %

FUENTEGUINALDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTEGUINALDO	70,00 %	20	10,00 %	14,29 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	11	63,64 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	20	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
FUENTEGUINALDO	14,29 %	42,86 %	7,14 %	50,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %

FUENTESAUCO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTESAUCO	57,69 %	26	46,15 %	80,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	23	52,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	26	57,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION
FUENTESAUCO	80,00 %	13,33 %	13,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %

FUENTES DE OÑORO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis	
--------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01		
FUENTES DE OÑORO	57,14 %	28	17,86 %	31,25 %		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %		

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	62,50 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	19	47,37 %
TOTAL PACIENTES Otitis		28	57,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACTA MASA	J01FA / MACRÓLID S	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
FUENTES DE OÑORO	31,25 %	62,50 %	6,25 %	6,25 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GAMONAL-ANTIGUA	44,57 %	184	16,85 %	37,80 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	23	8,70 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	130	41,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	12	66,67 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		184	44,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAMONAL-ANTIGUA	36,59 %	1,22 %	53,66 %	1,22 %	2,44 %	3,66 %	6,10 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARCIA LORCA	51,69 %	118	9,32 %	18,03 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARCIA LORCA	18,03 %	70,49 %	4,92 %	11,48 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	27,27 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	86	51,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	118	51,69 %

GARRIDO NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO NORTE	54,62 %	260	16,92 %	30,99 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO NORTE	30,99 %	33,80 %	19,01 %	5,63 %	11,97 %	8,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	18	38,89 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	191	48,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	88,24 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	78,57 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	18	72,22 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	260	54,62 %

GARRIDO SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO SUR	48,09 %	393	14,25 %	29,63 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO SUR	29,63 %	39,15 %	18,52 %	1,06 %	8,47 %	0,53 %	12,17 %	0,53 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %	0,02 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	66,67 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	41	14,63 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	304	48,68 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	78,57 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	20	35,00 %
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		393	48,09 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GOMARA	40,00 %	15	20,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	30,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	15	40,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
GOMARA	50,00 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

GREDOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GREDOS	40,00 %	15	26,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	14	42,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		15	40,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GREDOS	66,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	7,23 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUARDO	52,70 %	148	16,89 %	32,05 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUARDO	32,05 %	35,90 %	11,54 %	1,28 %	1,28 %	6,41 %	1,28 %	20,51 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	70,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	111	54,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	57,14 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	22,22 %
	Otitis media no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		148	52,70 %

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUAREÑA	55,00 %	60	16,67 %	30,30 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	30,30 %	33,33 %	30,30 %	3,03 %	3,03 %	12,12 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	50	54,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		60	55,00 %

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUIJUELO	68,48 %	165	15,15 %	22,12 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	22,12 %	35,40 %	38,05 %	3,54 %	7,96 %	4,42 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	62,96 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	62,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	101	65,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	15	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	90,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	165	68,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HERRERA DE PISUERGA	41,10 %	73	23,29 %	56,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
HERRERA DE PISUERGA	56,67 %	46,67 %	3,33 %	3,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	61	40,98 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		73	41,10 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DEL REY	49,26 %	203	26,60 %	54,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DEL REY	53,00 %	1,00 %	31,00 %	9,00 %	9,00 %	1,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	155	50,32 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	55,56 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	203	49,26 %

HUERTA DE REY

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DE REY	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	8	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	12	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DE REY	25,00 %	50,00 %	37,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	7,23 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
IGNACIO LOPEZ SAIZ	58,65 %	133	9,02 %	15,38 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	20	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	87	63,22 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	69,23 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	77,78 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H73.019	Mirineitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		133	58,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	15,38 %	66,67 %	1,28 %	3,85 %	10,26 %	1,28 %	5,13 %	2,56 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
SCAR	56,29 %	151	15,89 %	28,24 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
								TOTAL PACIENTES Otitis	151	56,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ISCAR	28,24 %	49,41 %	9,41 %	2,35 %	8,24 %	9,41 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

JARDINILLOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JARDINILLOS	61,21 %	165	33,94 %	55,45 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JARDINILLOS	55,45 %	29,70 %	2,97 %	2,97 %	1,98 %	4,95 %	0,99 %	10,89 %	0,99 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %	0,02 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	62,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	104	50,96 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	25	92,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	18	83,33 %
	Otitis media, no especificada, oído bilateral	3	
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		165	61,21 %

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSE AGUADO	50,40 %	373	20,64 %	40,96 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSE AGUADO	40,43 %	0,53 %	36,17 %	4,26 %	7,98 %	5,32 %	9,57 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	39	25,64 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	298	51,01 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	70,00 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	8	37,50 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		373	50,40 %

JOSÉ LUIS SANTAMARIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	60,00 %	210	28,10 %	46,83 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	44,44 %	2,38 %	37,30 %	5,56 %	2,38 %	7,14 %	5,56 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	9,09 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	42,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	142	57,75 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	76,19 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	19	78,95 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	6	66,67 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		210	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA ALAMEDILLA	41,48 %	229	13,10 %	31,58 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	32	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	181	40,88 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	70,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	229	41,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALAMEDILLA	30,53 %	1,05 %	27,37 %	27,37 %	11,58 %	5,26 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

LA ALBERCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
LA ALBERCA	66,67 %	48	29,17 %	43,75 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
							H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	
							H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	39	79,49 %
							H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
							H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
								TOTAL PACIENTES Otitis	48	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	43,75 %	3,13 %	28,13 %	6,25 %	9,38 %	3,13 %	3,13 %	18,75 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

LA CABRERA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA CABRERA	28,00 %	25	4,00 %	14,29 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	29,17 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		25	28,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA CABRERA	14,29 %	14,29 %	57,14 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA FUENTE SAN ESTEBAN	44,44 %	63	12,70 %	28,57 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	28,57 %	50,00 %	25,00 %	3,57 %	7,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	57,14 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	51	39,22 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		63	44,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAGUNA DE DUERO	52,66 %	357	25,49 %	48,40 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAGUNA DE DUERO	48,40 %	30,85 %	15,96 %	1,06 %	7,98 %	3,72 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	53	16,98 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	71,43 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	236	54,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	68,18 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	33	87,88 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	30,00 %
70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	357	52,66 %

LA MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA MAGDALENA	44,44 %	27	25,93 %	58,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	23	47,83 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	27	44,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	58,33 %	33,33 %	8,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	7,23 %

LANZAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LANZAHITA	61,67 %	60	15,00 %	24,32 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	47	59,57 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	60	61,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LANZAHITA	24,32 %	18,92 %	48,65 %	2,70 %	2,70 %	2,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

LA PALOMERA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PALOMERA	53,57 %	364	20,60 %	38,46 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PALOMERA	38,46 %	0,51 %	29,74 %	10,77 %	11,79 %	0,51 %	7,18 %	0,51 %	10,77 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	68	20,59 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	240	60,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	58,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	80,00 %
	Otitis media, no especificada, oído bilateral	23	39,13 %
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		364	53,57 %

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PUEBLA	50,45 %	220	21,82 %	43,24 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PUEBLA	43,24 %	35,14 %	7,21 %	0,90 %	13,51 %	7,21 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	22,73 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	40,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	160	51,25 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	62,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	57,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	62,50 %
TOTAL PACIENTES Otitis		220	50,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS HUELGAS	40,66 %	91	10,99 %	27,03 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUELGAS	24,32 %	2,70 %	67,57 %	5,41 %	2,70 %	2,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	71	39,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		91	40,66 %

LA SIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-05 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA SIERRA	48,00 %	25	28,00 %	58,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	19	47,37 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	25	48,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS
LA SIERRA	58,33 %	33,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
AS NAVAS DEL MARQUES	45,53 %	123	26,83 %	58,93 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
								TOTAL PACIENTES Otitis	123	45,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS NAVAS DEL MARQUE	58,93 %	26,79 %	5,36 %	1,79 %	3,57 %	8,93 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS TORRES	47,01 %	134	13,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	28,57 %	49,21 %	11,11 %	1,59 %	4,76 %	11,11 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	33,33 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	15,79 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	91	48,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	81,82 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	134	47,01 %

LA VICTORIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA VICTORIA	48,33 %	180	26,11 %	54,02 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	54,02 %	34,48 %	1,15 %	1,15 %	8,05 %	1,15 %	4,60 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	8	75,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	25	8,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	40,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	120	50,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	54,55 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		180	48,33 %

LEDESMA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LEDESMA	46,25 %	80	20,00 %	43,24 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LEDESMA	43,24 %	18,92 %	10,81 %	18,92 %	10,81 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	62	43,55 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		80	46,25 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LERMA	59,57 %	94	5,32 %	8,93 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	8,93 %	60,71 %	17,86 %	12,50 %	7,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	25,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	40,74 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	42	59,52 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		94	59,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01					
LINARES DE RIOFRIO		52,00 %	50	24,00 %	46,15 %					
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
LINARES DE RIOFRIO	46,15 %	11,54 %	34,62 %	7,69 %	3,85 %	3,85 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %

LOS COMUNEROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS COMUNEROS	43,79 %	169	18,34 %	41,89 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS COMUNEROS	41,89 %	36,49 %	1,35 %	10,81 %	8,11 %	9,46 %	1,35 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	27,27 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	40,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	119	44,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	55,56 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	50,00 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		169	43,79 %

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS CUBOS	48,39 %	186	15,05 %	31,11 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	31,11 %	48,89 %	12,22 %	8,89 %	6,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	77,78 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	131	43,51 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	70,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		186	48,39 %

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LUMBRALES	36,36 %	77	9,09 %	25,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LUMBRALES	25,00 %	32,14 %	25,00 %	17,86 %	7,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	62	37,10 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	77	36,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MADRIGAL ALTAS TORRES	46,77 %	62	27,42 %	58,62 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	34,88 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	62	46,77 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MADRIGAL ALTAS TORRES	58,62 %	41,38 %	6,90 %	3,45 %	3,45 %	3,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAGDALENA	55,06 %	89	11,24 %	20,41 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAGDALENA	20,41 %	34,69 %	26,53 %	20,41 %	6,12 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	18	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	59	64,41 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		89	55,06 %

MANSILLA DE LAS MULAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MANSILLA DE LAS MULAS	43,40 %	53	7,55 %	17,39 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	45	46,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	53	43,40 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MANSILLA DE LAS MULAS	17,39 %	43,48 %	8,70 %	17,39 %	21,74 %	4,35 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

MATALLANA DE TORIO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MATALLANA DE TORIO	58,82 %	17	17,65 %	30,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	58,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	17	58,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
MATALLANA DE TORIO	30,00 %	40,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %

MATILLA DE LOS CAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MATILLA DE LOS CAÑOS	54,17 %	48	2,08 %	3,85 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	42	54,76 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	48	54,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	3,85 %	34,62 %	7,69 %	38,46 %	11,54 %	15,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAYORGA DE CAMPOS	36,84 %	19	10,53 %	28,57 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	26,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	19	36,84 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MAYORGA DE CAMPOS	28,57 %	71,43 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01			
MEDINA DEL CAMPO RURAL		38,51 %	148	14,19 %	36,84 %			
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %			

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	87	32,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	57,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	18	16,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	14,29 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		148	38,51 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	36,84 %	40,35 %	15,79 %	1,75 %	3,51 %	7,02 %	1,75 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %	0,02 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DEL CAMPO URBAN	48,30 %	441	19,27 %	39,91 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBAN	39,91 %	42,72 %	7,04 %	1,41 %	0,47 %	8,92 %	0,47 %	8,92 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	66,67 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	89	16,85 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	28	85,71 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	223	48,43 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	44	43,18 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	50	62,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	21	52,38 %
H66.94	Otitis media sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H66.95	Otitis media, oído no especificado	7	71,43 %
TOTAL PACIENTES Otitis		441	48,30 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE POMAR	60,61 %	66	18,18 %	30,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE POMAR	30,00 %	62,50 %	5,00 %	2,50 %	5,00 %	2,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	53	56,60 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		66	60,61 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE RIOSECO	42,59 %	108	18,52 %	43,48 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE RIOSECO	43,48 %	26,09 %	30,43 %	6,52 %	8,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	6,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	40,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	83	48,19 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		108	42,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MELGAR DE FERNAMENTAL	51,92 %	52	9,62 %	18,52 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTA	18,52 %	77,78 %	3,70 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	40	55,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		52	51,92 %

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIGUEL ARMIJO	47,26 %	237	14,35 %	30,36 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIGUEL ARMIJO	0,89 %	30,36 %	29,46 %	26,79 %	1,79 %	6,25 %	8,93 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	36	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	168	45,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	92,31 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	66,67 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		237	47,26 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR	40,63 %	32	12,50 %	30,77 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	42,86 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	23	34,78 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		32	40,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	30,77 %	46,15 %	15,38 %	15,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA ESTE	43,32 %	307	19,54 %	45,11 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA ESTE	45,11 %	36,09 %	8,27 %	0,75 %	0,75 %	6,02 %	10,53 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	53	18,87 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	44,44 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	216	45,37 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	65,22 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	
TOTAL PACIENTES Otitis		307	43,32 %

MIRANDA OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA OESTE	65,03 %	366	24,86 %	38,24 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA OESTE	38,24 %	32,77 %	20,17 %	5,46 %	6,30 %	7,98 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	17,24 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	224	59,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	49	83,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	51	90,20 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	40,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		366	65,03 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOMBELTRAN	65,31 %	49	18,37 %	28,13 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOMBELTRAN	28,13 %	15,63 %	28,13 %	28,13 %	3,13 %	15,63 %	9,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	5	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	30	56,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		49	65,31 %

MOTA DEL MARQUES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-06 2025-07

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOTA DEL MARQUES	68,75 %	16	31,25 %	45,45 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	14	64,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	16	68,75 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	45,45 %	45,45 %	9,09 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	7,23 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑANA	50,00 %	36	13,89 %	27,78 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	33	48,48 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	36	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION
MUÑANA	27,78 %	66,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.2025-012025-022025-032025-042025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑICO	57,14 %	14	14,29 %	25,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	11	63,64 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	14	57,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
MUÑICO	25,00 %	12,50 %	62,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06		
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01				
NAVA DE LA ASUNCION		65,00 %	180	30,00 %	46,15 %				
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %				

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	21,43 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	81,82 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	127	62,99 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	81,25 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	69,23 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	7	57,14 %
TOTAL PACIENTES Otitis		180	65,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
NAVA DE LA ASUNCION	46,15 %	28,21 %	4,27 %	5,13 %	1,71 %	11,97 %	0,85 %	11,97 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

OLMEDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
OLMEDO	50,77 %	65	29,23 %	57,58 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	3,03 %	57,58 %	33,33 %	3,03 %	3,03 %	3,03 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	31	45,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		65	50,77 %

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
OLVEGA	58,51 %	94	28,72 %	49,09 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	49,09 %	41,82 %	3,64 %	9,09 %	1,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	91,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	56	55,36 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		94	58,51 %

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
OSORNO	41,18 %	34	14,71 %	35,71 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	22	31,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	34	41,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OSORNO	35,71 %	35,71 %	7,14 %	7,14 %	28,57 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PALENCIA RURAL	60,00 %	80	33,75 %	56,25 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PALENCIA RURAL	56,25 %	22,92 %	6,25 %	12,50 %	8,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	71,43 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	44	47,73 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	61,54 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	80	60,00 %

PAMPLIEGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-05	2025-07	2025-08
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PAMPLIEGA	33,33 %	12		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	7	42,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	12	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	75,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	38,34 %	8,01 %	7,23 %

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARADA DE MOLINO	61,84 %	228	28,95 %	46,81 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	57,14 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	155	58,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	94,12 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	95,65 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	25,00 %
H73.019	Mirineitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		228	61,84 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARADA DE MOLINO	46,81 %	29,08 %	15,60 %	1,42 %	0,71 %	3,55 %	0,71 %	8,51 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

PAREDES DE NAVA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
PAREDES DE NAVA	83,33 %	30	46,67 %	56,00 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		30	83,33 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	56,00 %	4,00 %	12,00 %	8,00 %	4,00 %	4,00 %	12,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARQUESOL	52,63 %	266	22,18 %	42,14 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARQUESOL	42,14 %	40,00 %	11,43 %	1,43 %	7,14 %	0,71 %	8,57 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	17,65 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	57,14 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	212	51,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	93,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		266	52,63 %

PEDIATRIA DE AREA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-08

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA ESTE		1		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	1	

PEDIATRIA DE AREA ZAMC

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-02

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF		1		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDROSILLO EL RALO	48,15 %	54	3,70 %	7,69 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	45	46,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	54	48,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	7,69 %	50,00 %	26,92 %	3,85 %	7,69 %	11,54 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑAFIEL	55,33 %	150	14,67 %	26,51 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑAFIEL	26,51 %	43,37 %	15,66 %	1,20 %	13,25 %	10,84 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	113	55,75 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	12	25,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		150	55,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑARANDA DE BRACAM	57,96 %	226	16,81 %	29,01 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑARANDA DE BRACAM	29,01 %	35,11 %	29,01 %	1,53 %	3,82 %	12,21 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	26	7,69 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	71,43 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	169	63,91 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	58,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	25,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	80,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	226	57,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA NORTE	58,49 %	371	13,48 %	23,04 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA NORTE	23,04 %	35,48 %	29,03 %	3,69 %	0,46 %	11,98 %	6,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	34,48 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	280	58,57 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	20	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	69,23 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	29	62,07 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		371	58,49 %

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA SUR	56,83 %	227	16,30 %	28,68 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA SUR	28,68 %	41,86 %	9,30 %	0,78 %	19,38 %	12,40 %	0,78 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %	0,02 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	22,73 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	162	59,26 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	23	65,22 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	78,26 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	12,50 %
TOTAL PACIENTES Otitis		227	56,83 %

PIEDRAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIEDRAHITA	48,89 %	45	26,67 %	54,55 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	25	40,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	45	48,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIEDRAHITA	54,55 %	36,36 %	4,55 %	18,18 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	7,23 %

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
PILARICA	46,45 %	183	19,67 %	42,35 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
						TOTAL PACIENTES Otitis		183	46,45 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	1,18 %	42,35 %	45,88 %	8,24 %	2,35 %	3,53 %	1,18 %	2,35 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINARES-COVALEDA	51,52 %	66	30,30 %	58,82 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
PINARES-COVALEDA	58,82 %	8,82 %	8,82 %	2,94 %	26,47 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	51,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	71,43 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		66	51,52 %

PINTOR OLIVA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINTOR OLIVA	57,27 %	227	22,91 %	40,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	40,00 %	26,15 %	11,54 %	5,38 %	0,77 %	4,62 %	0,77 %	18,46 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	31,82 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	156	55,77 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	25	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	61,54 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	33,33 %
	Otitis media aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
	Otitis media crónica no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		227	57,27 %

PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
PISUERGA	57,72 %	272	25,37 %	43,95 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
							H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	16,67 %
							H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	66,67 %
							H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	216	56,02 %
							H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	76,47 %
							H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	83,33 %
							H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	57,14 %
							H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
							TOTAL PACIENTES Otitis		272	57,72 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	43,31 %	0,64 %	35,67 %	12,74 %	0,64 %	8,92 %	2,55 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

PIZARRALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIZARRALES	48,90 %	319	7,84 %	16,03 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIZARRALES	16,03 %	50,64 %	29,49 %	1,28 %	5,77 %	5,13 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	46	28,26 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	218	50,46 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	81,82 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	26	38,46 %
70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	319	48,90 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06		
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01				
PLAZA DEL EJERCITO		52,27 %	176	26,70 %	51,09 %				
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %				

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	22,22 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	138	47,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	84,62 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	50,00 %
H66.94	Otitis media sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H66.95	Otitis media, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		176	52,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PLAZA DEL EJERCITO	1,09 %	51,09 %	1,09 %	23,91 %	8,70 %	11,96 %	1,09 %	4,35 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA I	49,59 %	367	18,80 %	37,91 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA I	0,55 %	37,91 %	30,77 %	26,37 %	4,95 %	7,14 %	3,30 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	48	18,75 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	72,73 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	293	49,49 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	15	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		367	49,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA II	56,25 %	288	17,36 %	30,86 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	35	11,43 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	40,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	222	59,91 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	37,50 %
TOTAL PACIENTES Otitis		288	56,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA II	30,25 %	0,62 %	0,62 %	48,77 %	0,62 %	16,05 %	1,23 %	1,23 %	6,79 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	0,08 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA III	64,08 %	206	18,93 %	29,55 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA III	29,55 %	56,82 %	12,88 %	0,76 %	4,55 %	3,03 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	70,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	164	63,41 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	206	64,08 %

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA IV	54,59 %	196	12,76 %	23,36 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA IV	23,36 %	52,34 %	17,76 %	1,87 %	0,93 %	5,61 %	4,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	18	16,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	145	53,79 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	45,45 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	7	71,43 %
TOTAL PACIENTES Otitis		196	54,59 %

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PORTILLO	42,86 %	175	16,57 %	38,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PORTILLO	38,67 %	29,33 %	12,00 %	1,33 %	14,67 %	1,33 %	6,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	3,70 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	45,61 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	68,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	45,45 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		175	42,86 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUEBLA DE SANABRIA	55,29 %	85	20,00 %	36,17 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	36,17 %	42,55 %	17,02 %	2,13 %	2,13 %	4,26 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	67	53,73 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		85	55,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUENTE DOMINGO FLOREZ	52,63 %	38	15,79 %	30,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	28	57,14 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	38	52,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION
PUENTE DOMINGO FLOREZ	30,00 %	65,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUERTA NUEVA	68,36 %	256	28,52 %	41,71 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	26	30,77 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	87,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	177	63,28 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	24	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	57,14 %
	Otitis media, no especificada	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		256	68,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUERTA NUEVA	0,57 %	41,71 %	34,86 %	16,00 %	0,57 %	1,14 %	4,57 %	0,57 %	6,86 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
QUINTANAR DE LA SIERRA	45,65 %	46	13,04 %	28,57 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	28,57 %	47,62 %	4,76 %	4,76 %	14,29 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	36	36,11 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		46	45,65 %

RIAÑO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.
 2025-01
 2025-03
 2025-04
 2025-05
 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIAÑO	57,14 %	21	4,76 %	8,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	57,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAÑO	8,33 %	16,67 %	58,33 %	8,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
RIAZA	71,05 %	76	26,32 %	37,04 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
							H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
							H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	50,00 %
							H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	56	71,43 %
							H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	100,00 %
							H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
								TOTAL PACIENTES Otitis	76	71,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	37,04 %	57,41 %	1,85 %	1,85 %	3,70 %	11,11 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

RIBERA DEL ESLA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ESLA	59,38 %	32	21,88 %	36,84 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	47,06 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	32	59,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ESLA	36,84 %	5,26 %	36,84 %	5,26 %	10,53 %	5,26 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ORBIGO	47,12 %	278	16,19 %	34,35 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ORBIGO	33,59 %	0,76 %	44,27 %	14,50 %	3,05 %	6,87 %	3,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	7,14 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	224	45,09 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	13	61,54 %
TOTAL PACIENTES Otitis		278	47,12 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROA	45,68 %	81	9,88 %	21,62 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	21,62 %	64,86 %	2,70 %	2,70 %	8,11 %	13,51 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	57	40,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	57,14 %
66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	81	45,68 %

ROBLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROBLEDA	46,43 %	28	14,29 %	30,77 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	23	47,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	28	46,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROBLEDA	30,77 %	46,15 %	7,69 %	7,69 %	15,38 %	15,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA I	48,18 %	137	16,06 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA I	33,33 %	43,94 %	7,58 %	3,03 %	15,15 %	3,03 %	6,06 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	18	5,56 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	106	51,89 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		137	48,18 %

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA II	37,11 %	159	10,06 %	27,12 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA II	27,12 %	45,76 %	11,86 %	11,86 %	8,47 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	17,65 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	42,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	111	38,74 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	30,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	40,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	159	37,11 %

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-04	2025-06	2025-08	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SACRAMENIA		5		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	
	TOTAL PACIENTES Otitis	5	

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAHAGUN	55,93 %	59	18,64 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	33,33 %	36,36 %	12,12 %	18,18 %	6,06 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	44	59,09 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	59	55,93 %

SALAS DE LOS INFANTES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALAS DE LOS INFANTES	50,00 %	46	17,39 %	34,78 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALAS DE LOS INFANTES	34,78 %	56,52 %	4,35 %	8,70 %	4,35 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	51,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	46	50,00 %

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALDAÑA	36,71 %	79	18,99 %	51,72 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALDAÑA	51,72 %	44,83 %	10,34 %	13,79 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	67	38,81 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	79	36,71 %

SAN AGUSTIN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
SAN AGUSTIN	57,85 %	223	14,35 %	24,81 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
							TOTAL PACIENTES Otitis		223	57,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN AGUSTIN	24,03 %	0,78 %	49,61 %	19,38 %	1,55 %	9,30 %	4,65 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
SAN ANDRES DEL RABANEI	49,36 %	235	20,43 %	41,38 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABAN	41,38 %	34,48 %	11,21 %	7,76 %	6,90 %	1,72 %	3,45 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	55,26 %	76	18,42 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
SAN ESTEBAN DE GORMA	33,33 %	47,62 %	19,05 %	2,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	8,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	48	60,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		76	55,26 %

SAN ILDEFONSO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ILDEFONSO	57,65 %	85	11,76 %	20,41 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	63	58,73 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	85	57,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ILDEFONSO	20,41 %	28,57 %	48,98 %	6,12 %	4,08 %	2,04 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JOSE	70,05 %	187	9,09 %	12,98 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	12,98 %	25,19 %	57,25 %	0,76 %	6,87 %	0,76 %	6,87 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	144	72,22 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	76,92 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	71,43 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		187	70,05 %

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JUAN	55,15 %	165	10,30 %	18,68 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JUAN	18,68 %	37,36 %	30,77 %	4,40 %	5,49 %	7,69 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	13,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	118	54,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	63,64 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		165	55,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN LEONARDO DE YAGUE	60,00 %	50	26,00 %	43,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGU	43,33 %	43,33 %	3,33 %	3,33 %	6,67 %	6,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	59,46 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		50	60,00 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PABLO	51,40 %	107	17,76 %	34,55 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	34,55 %	34,55 %	16,36 %	1,82 %	5,45 %	10,91 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	66,67 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	76	43,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		107	51,40 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO DEL ARROYO	55,26 %	38	18,42 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	29	51,72 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	38	55,26 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO DEL ARROYO	4,76 %	33,33 %	38,10 %	14,29 %	9,52 %	9,52 %
TOTAL GAP	0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO MANRIQUE	73,33 %	15	6,67 %	9,09 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	13	61,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		15	73,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION
SAN PEDRO MANRIQUE	9,09 %	9,09 %	81,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA CLARA	56,85 %	146	19,86 %	34,94 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA CLARA	34,94 %	44,58 %	14,46 %	1,20 %	4,82 %	4,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	85,71 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	111	57,66 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	62,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	27,27 %
TOTAL PACIENTES Otitis		146	56,85 %

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA ELENA	70,97 %	186	31,18 %	43,94 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA ELENA	43,94 %	28,03 %	21,97 %	3,79 %	6,06 %	6,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	25	24,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	71,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	25	88,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	86,96 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	186	70,97 %

SANTA MARIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARIA	49,04 %	157	17,20 %	35,06 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARIA	35,06 %	32,47 %	19,48 %	5,19 %	10,39 %	2,60 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	29,17 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	120	50,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	33,33 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		157	49,04 %

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARTA	55,86 %	324	13,27 %	23,76 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO
SANTA MARTA	23,76 %	20,99 %	53,59 %	1,10 %	1,10 %	6,63 %	4,97 %	0,55 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %	0,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	37,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	276	56,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	62,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		324	55,86 %

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAYAGO	50,79 %	63	15,87 %	31,25 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
SAYAGO	31,25 %	53,13 %	18,75 %	6,25 %	3,13 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	0,35 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	44	45,45 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	63	50,79 %

SEDANO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-04 2025-06 2025-07 2025-08

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEDANO	33,33 %	9	22,22 %	66,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	9	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SEDANO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA I	52,84 %	229	27,51 %	52,07 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	52,07 %	37,19 %	0,83 %	4,13 %	1,65 %	4,96 %	4,13 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	0,10 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	28	17,86 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	153	52,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	21	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	40,00 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	2	50,00 %
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		229	52,84 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA II	59,22 %	255	27,06 %	45,70 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA II	45,70 %	33,77 %	3,31 %	3,97 %	3,97 %	14,57 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	23,53 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	189	52,91 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	29	82,76 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	62,50 %
70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	255	59,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA III	63,39 %	112	32,14 %	50,70 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA III	50,70 %	38,03 %	7,04 %	1,41 %	5,63 %	1,41 %	4,23 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	37,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	72	56,94 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		112	63,39 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA RURAL	50,38 %	262	21,37 %	42,42 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA RURAL	42,42 %	45,45 %	11,36 %	0,76 %	2,27 %	5,30 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	7,14 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	21	80,95 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	173	42,20 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	28	82,14 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	82,61 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	9,09 %
TOTAL PACIENTES Otitis		262	50,38 %

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEPULVEDA	79,03 %	62	33,87 %	42,86 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	42,86 %	48,98 %	6,12 %	4,08 %	2,04 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	47	76,60 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	71,43 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	62	79,03 %

SERRADA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SERRADA	46,15 %	91	10,99 %	23,81 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
SERRADA	23,81 %	57,14 %	16,67 %	4,76 %	4,76 %	2,38 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	12	16,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	45,59 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		91	46,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA NORTE	49,55 %	224	19,64 %	39,64 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	38,74 %	0,90 %	27,03 %	27,03 %	8,11 %	4,50 %	4,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	72,73 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	157	42,04 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	20	95,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	73,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		224	49,55 %

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA RURAL	56,41 %	156	22,44 %	39,77 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	39,77 %	38,64 %	21,59 %	1,14 %	2,27 %	3,41 %	5,68 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	45,45 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	103	50,49 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	42,86 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		156	56,41 %

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA SUR	47,06 %	255	23,14 %	49,17 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA SUR	49,17 %	30,00 %	12,50 %	0,83 %	0,83 %	5,83 %	5,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	25	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	72,73 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	196	44,39 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	83,33 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	9	55,56 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		255	47,06 %

SORIA TARDE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA TARDE	66,67 %	51	43,14 %	64,71 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	62,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	19	63,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	84,62 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	51	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA TARDE	64,71 %	5,88 %	17,65 %	14,71 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	8,01 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
SOTILLO DE LA ADRADA	51,15 %	174	12,07 %	23,60 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	23,60 %	35,96 %	19,10 %	1,12 %	1,12 %	14,61 %	10,11 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SUR	40,65 %	214	16,82 %	41,38 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	55,56 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	175	41,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	55,56 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	40,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		214	40,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	37,93 %	3,45 %	1,15 %	34,48 %	10,34 %	1,15 %	8,05 %	4,60 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TAMAMES	57,58 %	33	21,21 %	36,84 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	26	57,69 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	33	57,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TAMAMES	36,84 %	42,11 %	10,53 %	10,53 %	5,26 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP										

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORDESILLAS	57,64 %	144	15,28 %	26,51 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	25,30 %	1,20 %	37,35 %	12,05 %	1,20 %	10,84 %	14,46 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	118	55,08 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	16,67 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		144	57,64 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORENO	60,53 %	38	21,05 %	34,78 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS
TORENO	34,78 %	60,87 %	4,35 %	8,70 %	4,35 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	66,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	38	60,53 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORO	49,74 %	193	17,10 %	34,38 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORO	34,38 %	45,83 %	9,38 %	1,04 %	1,04 %	13,54 %	2,08 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	36,84 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	158	49,37 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		193	49,74 %

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORQUEMADA	38,46 %	52	25,00 %	65,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
TORQUEMADA	60,00 %	5,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,13 %	38,34 %	2,76 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	39	41,03 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	40,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	20,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	52	38,46 %

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
TORTOLA	43,58 %	257	23,35 %	53,57 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	53,57 %	0,89 %	34,82 %	8,04 %	0,89 %	3,57 %	1,79 %	7,14 %
TOTAL GAP	35,54 %	0,08 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TROBAJO DEL CAMINO - VA	55,04 %	258	26,74 %	48,59 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TROBAJO DEL CAMINO - V	48,59 %	33,80 %	13,38 %	1,41 %	7,04 %	2,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	33	18,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	70,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	196	59,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	62,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	77,78 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		258	55,04 %

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TUDELA	39,13 %	161	12,42 %	31,75 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TUDELA	31,75 %	50,79 %	9,52 %	3,17 %	9,52 %	1,59 %	3,17 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	109	36,70 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		161	39,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05			
CGF AP		% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01				
UNIVERSIDAD CENTRO		46,62 %	133	18,05 %	38,71 %				
TOTAL GAP		52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %				
						Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
						H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	14,29 %
						H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
						H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	99	47,47 %
						H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
						H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
						H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
						TOTAL PACIENTES Otitis		133	46,62 %
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico		J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
UNIVERSIDAD CENTRO		1,61 %	38,71 %	37,10 %	11,29 %	8,06 %	3,23 %	8,06 %	
TOTAL GAP		0,06 %	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %	

VALDERAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALDERAS	59,32 %	59	22,03 %	37,14 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
VALDERAS	37,14 %	40,00 %	22,86 %	8,57 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	43,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		59	59,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08	2026-09	2026-10	2026-11	2026-12	2027-01	2027-02	2027-03	2027-04	2027-05	2027-06	2027-07	2027-08	2027-09	2027-10	2027-11	2027-12	2028-01	2028-02	2028-03	2028-04	2028-05	2028-06	2028-07	2028-08	2028-09	2028-10	2028-11	2028-12	2029-01	2029-02	2029-03	2029-04	2029-05	2029-06	2029-07	2029-08	2029-09	2029-10	2029-11	2029-12	2030-01	2030-02	2030-03	2030-04	2030-05	2030-06	2030-07	2030-08	2030-09	2030-10	2030-11	2030-12	2031-01	2031-02	2031-03	2031-04	2031-05	2031-06	2031-07	2031-08	2031-09	2031-10	2031-11	2031-12	2032-01	2032-02	2032-03	2032-04	2032-05	2032-06	2032-07	2032-08	2032-09	2032-10	2032-11	2032-12	2033-01	2033-02	2033-03	2033-04	2033-05	2033-06	2033-07	2033-08	2033-09	2033-10	2033-11	2033-12	2034-01	2034-02	2034-03	2034-04	2034-05	2034-06	2034-07	2034-08	2034-09	2034-10	2034-11	2034-12	2035-01	2035-02	2035-03	2035-04	2035-05	2035-06	2035-07	2035-08	2035-09	2035-10	2035-11	2035-12	2036-01	2036-02	2036-03	2036-04	2036-05	2036-06	2036-07	2036-08	2036-09	2036-10	2036-11	2036-12	2037-01	2037-02	2037-03	2037-04	2037-05	2037-06	2037-07	2037-08	2037-09	2037-10	2037-11	2037-12	2038-01	2038-02	2038-03	2038-04	2038-05	2038-06	2038-07	2038-08	2038-09	2038-10	2038-11	2038-12	2039-01	2039-02	2039-03	2039-04	2039-05	2039-06	2039-07	2039-08	2039-09	2039-10	2039-11	2039-12	2040-01	2040-02	2040-03	2040-04	2040-05	2040-06	2040-07	2040-08	2040-09	2040-10	2040-11	2040-12	2041-01	2041-02	2041-03	2041-04	2041-05	2041-06	2041-07	2041-08	2041-09	2041-10	2041-11	2041-12	2042-01	2042-02	2042-03	2042-04	2042-05	2042-06	2042-07	2042-08	2042-09	2042-10	2042-11	2042-12	2043-01	2043-02	2043-03	2043-04	2043-05	2043-06	2043-07	2043-08	2043-09	2043-10	2043-11	2043-12	2044-01	2044-02	2044-03	2044-04	2044-05	2044-06	2044-07	2044-08	2044-09	2044-10	2044-11	2044-12	2045-01	2045-02	2045-03	2045-04	2045-05	2045-06	2045-07	2045-08	2045-09	2045-10	2045-11	2045-12	2046-01	2046-02	2046-03	2046-04	2046-05	2046-06	2046-07	2046-08	2046-09	2046-10	2046-11	2046-12	2047-01	2047-02	2047-03	2047-04	2047-05	2047-06	2047-07	2047-08	2047-09	2047-10	2047-11	2047-12	2048-01	2048-02	2048-03	2048-04	2048-05	2048-06	2048-07	2048-08	2048-09	2048-10	2048-11	2048-12	2049-01	2049-02	2049-03	2049-04	2049-05	2049-06	2049-07	2049-08	2049-09	2049-10	2049-11	2049-12	2050-01	2050-02	2050-03	2050-04	2050-05	2050-06	2050-07	2050-08	2050-09	2050-10	2050-11	2050-12	2051-01	2051-02	2051-03	2051-04	2051-05	2051-06	2051-07	2051-08	2051-09	2051-10	2051-11	2051-12	2052-01	2052-02	2052-03	2052-04	2052-05	2052-06	2052-07	2052-08	2052-09	2052-10	2052-11	2052-12	2053-01	2053-02	2053-03	2053-04	2053-05	2053-06	2053-07	2053-08	2053-09	2053-10	2053-11	2053-12	2054-01	2054-02	2054-03	2054-04	2054-05	2054-06	2054-07	2054-08	2054-09	2054-10	2054-11	2054-12	2055-01	2055-02	2055-03	2055-04	2055-05	2055-06	2055-07	2055-08	2055-09	2055-10	2055-11	2055-12	2056-01	2056-02	2056-03	2056-04	2056-05	2056-06	2056-07	2056-08	2056-09	2056-10	2056-11	2056-12	2057-01	2057-02	2057-03	2057-04	2057-05	2057-06	2057-07	2057-08	2057-09	2057-10	2057-11	2057-12	2058-01	2058-02	2058-03	2058-04	2058-05	2058-06	2058-07	2058-08	2058-09	2058-10	2058-11	2058-12	2059-01	2059-02	2059-03	2059-04	2059-05	2059-06	2059-07	2059-08	2059-09	2059-10	2059-11	2059-12	2060-01	2060-02	2060-03	2060-04	2060-05	2060-06	2060-07	2060-08	2060-09	2060-10	2060-11	2060-12	2061-01	2061-02	2061-03	2061-04	2061-05	2061-06	2061-07	2061-08	2061-09	2061-10	2061-11	2061-12	2062-01	2062-02	2062-03	2062-04	2062-05	2062-06	2062-07	2062-08	2062-09	2062-10	2062-11	2062-12	2063-01	2063-02	2063-03	2063-04	2063-05	2063-06	2063-07	2063-08	2063-09	2063-10	2063-11	2063-12	2064-01	2064-02	2064-03	2064-04	2064-05	2064-06	2064-07	2064-08	2064-09	2064-10	2064-11	2064-12	2065-01	2065-02	2065-03	2065-04	2065-05	2065-06	2065-07	2065-08	2065-09	2065-10	2065-11	2065-12	2066-01	2066-02	2066-03	2066-04	2066-05	2066-06	2066-07	2066-08	2066-09	2066-10	2066-11	2066-12	2067-01	2067-02	2067-03	2067-04	2067-05	2067-06	2067-07	2067-08	2067-09	2067-10	2067-11	2067-12	2068-01	2068-02	2068-03	2068-04	2068-05	2068-06	2068-07	2068-08	2068-09	2068-10	2068-11	2068-12	2069-01	2069-02	2069-03	2069-04	2069-05	2069-06	2069-07	2069-08	2069-09	2069-10	2069-11	2069-12	2070-01	2070-02	2070-03	2070-04	2070-05	2070-06	2070-07	2070-08	2070-09	2070-10	2070-11	2070-12	2071-01	2071-02	2071-03	2071-04	2071-05	2071-06	2071-07	2071-08	2071-09	2071-10	2071-11	2071-12	2072-01	2072-02	2072-03	2072-04	2072-05	2072-06	2072-07	2072-08	2072-09	2072-10	2072-11	2072-12	2073-01	2073-02	2073-03	2073-04	2073-05	2073-06	2073-07	2073-08	2073-09	2073-10	2073-11	2073-12	2074-01	2074-02	2074-03	2074-04	2074-05	2074-06	2074-07	2074-08	2074-09	2074-10	2074-11	2074-12	2075-01	2075-02	2075-03	2075-04	2075-05	2075-06	2075-07	2075-08	2075-09	2075-10	2075-11	2075-12	2076-01	2076-02	2076-03	2076-04	2076-05	2076-06	2076-07	2076-08	2076-09	2076-10	2076-11	2076-12	2077-01	2077-02	2077-03	2077-04	2077-05	2077-06	2077-07	2077-08	2077-09	2077-10	2077-11	2077-12	2078-01	2078-02	2078-03	2078-04	2078-05	2078-06	2078-07	2078-08	2078-09	2078-10	2078-11	2078-12	2079-01	2079-02	2079-03	2079-04	2079-05	2079-06	2079-07	2079-08	2079-09	2079-10	2079-11	2079-12	2080-01	2080-02	2080-03	2080-04	2080-05	2080-06	2080-07	2080-08	2080-09	2080-10	2080-11	2080-12	2081-01	2081-02	2081-03	2081-04	2081-05	2081-06	2081-07	2081-08	2081-09	2081-10	2081-11	2081-12	2082-01	2082-02	2082-03	2082-04	2082-05	2082-06	2082-07	2082-08	2082-09	2082-10	2082-11	2082-12	2083-01	2083-02	2083-03	2083-04	2083-05	2083-06	2083-07	2083-08	2083-09	2083-10	2083-11	2083-12	2084-01	2084-02	2084-03	2084-04	2084-05	2084-06	2084-07	2084-08	2084-09	2084-10	2084-11	2084-12	2085-01	2085-02	2085-03	2085-04	2085-05	2085-06	2085-07	2085-08	2085-09	2085-10	2085-11	2085-12	2086-01	2086-02	2086-03	2086-04	2086-05	2086-06	2086-07	2086-08	2086-09	2086-10	2086-11	2086-12	2087-01	2087-02	2087-03	2087-04	2087-05	2087-06	2087-07	2087-08	2087-09	2087-10	2087-11	2087-12	2088-01	2088-02	2088-03	2088-04	2088-05	2088-06	2088-07	2088-08	2088-09	2088-10	2088-11	2088-12	2089-01	2089-02	2089-03	2089-04	2089-05	2089-06	2089-07	2089-08	2089-09	2089-10	2089-11	2089-12	2090-01	2090-02	2090-03	2090-04	2090-05	2090-06	2090-07	2090-08	2090-09	2090-10	2090-11	2090-12	2091-01	2091-02	2091-03	2091-04	2091-05	2091-06	2091-07	2091-08	2091-09	2091-10	2091-11	2091-12	2092-01	2092-02	2092-03	2092-04	2092-05	2092-06	2092-07	2092-08	2092-09	2092-10	2092-11	2092-12	2093-01	2093-02	2093-03	2093-04	2093-05	2093-06	2093-07	2093-08	2093-09	2093-10	2093-11	2093-12	2094-01	2094-02	2094-03	2094-04	2094-05	2094-06	2094-07	2094-08	2094-09	2094-10	2094-11	2094-12	2095-01	2095-02	2095-03	2095-04	2095-05	2095-06	2095-07	2095-08	2095-09	2095-10	2095-11	2095-12	2096-01	2096-02	2096-03	2096-04	2096-05	2096-06	2096-07	2096-08	2096-09	2096-10	2096-11	2096-12	2097-01	2097-02	2097-03	2097-04	2097-05	2097-06	2097-07	2097-08	2097-09	2097-10	2097-11	2097-12	2098-01	2098-02	2098-03	2098-04	2098-05	2098-06	2098-07	2098-08	2098-09	2098-10	2098-11	2098-12	2099-01	2099-02	2099-03	2099-04	2099-05	2099-06	2099-07	2099-08	2099-09	2099-10	2099-11	2099-12	2100-01	2100-02	2100-03	2100-04	2100-05	2100-06	2100-07	2100-08	2100-09	2100-10	2100-11	2100-12	2101-01	2101-02	2101-03	2101-04	2101-05	2101-06	2101-07	2101-08	2101-09	2101-10	2101-11	2101-12	2102-01	2102-02	2102-03	2102-04	2102-05	2102-06	2102-07	2102-08	2102-09	2102-10	2102-11	2102-12	2103-01	2103-02	2103-03	2103-04	2103-05	2103-06	2103-07	2103-08	2103-09	2103-10	2103-11	2103-12	2104-01	2104-02	2104-03	2104-04	2104-05	2104-06	2104-07	2104-08	2104-09	2104-10	2104-11	2104-12	2105-01	2105-02	2105-03	2105-04	2105-05	2105-06	2105-07	2105-08	2105-09	2105-10	2105-11	2105-12	2106-01	2106-02	2106-03	2106-04	2106-05	2106-06	2106-07	2106-08	2106-09	2106-10	2106-11	2106-12	2107-01	2107-02	2107-03	2107-04	2107-05	2107-06	2107-07	2107-08	2107-09	2107-10	2107-11	2107-12	2108-01	2108-02	2108-03	2108-04	2108-05	2108-06	2108-07	2108-08	2108-09	2108-10	2108-11	2108-12	2109-01	2109-02	2109-03	2109-04	2109-05	2109-06	2109-07	2109-08	2109-09	2109-10	2109-11	2109-12	2110-01	2110-02	2110-03	2110-04	2110-05	2110-06	2110-07	2110-08	2110-09	2110-10	2110
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL I	54,24 %	118	31,36 %	57,81 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL I	57,81 %	25,00 %	9,38 %	9,38 %	1,56 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	97	56,70 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	
TOTAL PACIENTES Otitis		118	54,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL II	35,09 %	114	12,28 %	35,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL II	35,00 %	52,50 %	7,50 %	2,50 %	7,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	16	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	89	34,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	114	35,09 %

VALLE DE LOSA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE LOSA	66,67 %	9	22,22 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	9	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VALLE DE LOSA	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE MENA	50,00 %	78	6,41 %	12,82 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	78	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE MENA	12,82 %	69,23 %	5,13 %	5,13 %	5,13 %	12,82 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-04 2025-05 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE TOBALINA	59,09 %	22		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	21	61,90 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	22	59,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
VALLE DE TOBALINA	92,31 %	7,69 %
TOTAL GAP	38,34 %	2,76 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE VALDEBEZANA	75,00 %	12	25,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	70,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		12	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE VALDEBEZANA	33,33 %	33,33 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

VENTA DE BAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
VENTA DE BAÑOS	44,36 %	133	18,80 %	42,37 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
								TOTAL PACIENTES Otitis	133	44,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	42,37 %	37,29 %	13,56 %	1,69 %	5,08 %	5,08 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIDRIALES	74,29 %	35	14,29 %	19,23 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	26	69,23 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		35	74,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIDRIALES	19,23 %	46,15 %	50,00 %	11,54 %	3,85 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLABLINO	61,90 %	126	12,70 %	20,51 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS , INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACTA MASA	J01DC / CEFALOSPO RINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLABLINO	20,51 %	61,54 %	12,82 %	2,56 %	7,69 %	1,28 %	8,97 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	23,53 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	96	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	77,78 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		126	61,90 %

VILLACASTIN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLACASTIN	54,55 %	44	29,55 %	54,17 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01XC / ESTEROIDES ANTIBACTERIANOS
VILLACASTIN	54,17 %	25,00 %	8,33 %	8,33 %	4,17 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	0,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	23	47,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	44	54,55 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLADA	75,00 %	24	12,50 %	16,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	64,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	24	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	16,67 %	50,00 %	16,67 %	27,78 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	7,23 %

VILLADIEGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis	
--------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01			
VILLADIEGO	50,00 %	40	15,00 %	30,00 %			
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
	VILLADIEGO	30,00 %	25,00 %	25,00 %	15,00 %	5,00 %	10,00 %
	TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	25,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	29	55,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	40	50,00 %

VILLAFRANCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRANCA	56,96 %	79	15,19 %	26,67 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRANCA	26,67 %	48,89 %	8,89 %	2,22 %	15,56 %	13,33 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	57	47,37 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		79	56,96 %

VILLAFRECHOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRECHOS	60,98 %	41	19,51 %	32,00 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRECHOS	32,00 %	40,00 %	4,00 %	8,00 %	16,00 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	36	66,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		41	60,98 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01						
VILLALON DE CAMPOS	66,67 %	24	25,00 %	37,50 %						
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %						
							TOTAL PACIENTES Otitis			
							24			
							66,67 %			

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALON DE CAMPOS	37,50 %	31,25 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	6,25 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLALPANDO	50,00 %	48	22,92 %	45,83 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
VILLALPANDO	45,83 %	37,50 %	4,17 %	4,17 %	12,50 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	42	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	48	50,00 %

VILLAMURIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAMURIEL	44,44 %	135	14,81 %	33,33 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAMURIEL	33,33 %	20,00 %	33,33 %	18,33 %	6,67 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	102	48,04 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	38,46 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	20,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		135	44,44 %

VILLARCAYO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARCAYO	67,44 %	86	19,77 %	29,31 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARCAYO	29,31 %	41,38 %	10,34 %	5,17 %	12,07 %	8,62 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	66,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	86	67,44 %

VILLARRAMIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARRAMIEL	61,90 %	21	38,10 %	61,54 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	13	46,15 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	21	61,90 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS
VILLARRAMIEL	61,54 %	30,77 %	7,69 %	7,69 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	0,38 %

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLORIA	40,35 %	114	7,02 %	17,39 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLORIA	17,39 %	52,17 %	15,22 %	2,17 %	4,35 %	2,17 %	13,04 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	0,35 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	95	35,79 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		114	40,35 %

VIRGEN CONCHA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIRGEN CONCHA	53,29 %	304	20,07 %	37,65 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIRGEN CONCHA	37,65 %	45,06 %	11,11 %	4,94 %	9,26 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	23	13,04 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	42,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	197	51,78 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	37	67,57 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	35	62,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	75,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	304	53,29 %

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis	
--------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01		
VITIGUDINO	46,15 %	91	9,89 %	21,43 %		
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %		

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	64	43,75 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	62,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	57,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		91	46,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VITIGUDINO	21,43 %	61,90 %	4,76 %	2,38 %	7,14 %	11,90 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01	
CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01							
ZAMORA NORTE	48,03 %	152	12,50 %	26,03 %							
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %							
									TOTAL PACIENTES Otitis	152	48,03 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA NORTE	26,03 %	31,51 %	31,51 %	2,74 %	12,33 %	5,48 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ZAMORA SUR	43,72 %	199	17,09 %	39,08 %
TOTAL GAP	52,45 %	32.780	18,71 %	35,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA SUR	39,08 %	31,03 %	21,84 %	2,30 %	5,75 %	5,75 %
TOTAL GAP	35,54 %	38,34 %	15,08 %	2,76 %	8,01 %	7,23 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	16	31,25 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	163	42,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	13	23,08 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	199	43,72 %