

Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

Gerencia AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GAP ÁVILA	69,91 %	1.499	27,02 %	38,65 %
GAP BURGOS	72,56 %	3.145	22,23 %	30,63 %
GAP LEÓN	72,87 %	2.879	18,51 %	25,41 %
GAP EL BIERZO	68,41 %	1.545	13,40 %	19,58 %
GAP PALENCIA	70,65 %	1.506	18,26 %	25,85 %
GAP SALAMANCA	66,81 %	2.790	15,88 %	23,77 %
GAP SEGOVIA	74,53 %	1.602	27,65 %	37,10 %
GAP SORIA	70,00 %	900	24,11 %	34,44 %
GAP VALLADOLID OESTE	61,89 %	2.430	21,52 %	34,77 %
GAP VALLADOLID ESTE	63,59 %	2.255	23,19 %	36,47 %
GAP ZAMORA	69,88 %	1.338	17,86 %	25,56 %
TOTAL GRS	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1.584	77,97 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9.848	70,55 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	995	57,89 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	988	71,76 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	135	65,19 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8.986	64,87 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	22.536	69,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA		35,50 %		0,18 %	30,06 %	0,44 %	11,66 %	4,47 %	0,53 %	11,04 %	0,09 %	6,05 %	
GAP BURGOS	0,04 %	27,82 %	0,12 %		35,21 %	0,04 %	6,39 %	7,35 %	0,16 %	12,67 %	0,24 %	9,91 %	0,04 %
GAP LEÓN	0,22 %	23,14 %	0,04 %		27,97 %	0,04 %	11,57 %	5,65 %	0,13 %	12,83 %	0,70 %	17,70 %	
GAP EL BIERZO	0,09 %	17,94 %	0,09 %		34,15 %	0,96 %	11,67 %	5,31 %	0,44 %	12,46 %	0,09 %	16,81 %	
GAP PALENCIA	0,09 %	23,50 %		0,09 %	31,03 %	0,26 %	3,68 %	8,55 %	0,09 %	13,25 %	0,26 %	19,15 %	0,09 %
GAP SALAMANCA	0,05 %	21,27 %	0,05 %		33,64 %		15,06 %	5,20 %	0,10 %	13,47 %	0,34 %	10,78 %	0,05 %
GAP SEGOVIA	0,38 %	33,90 %	0,08 %		33,51 %	0,08 %	6,60 %	2,45 %	0,38 %	14,42 %	0,31 %	7,90 %	
GAP SORIA	0,14 %	30,78 %			27,23 %		16,03 %	5,39 %		12,91 %	0,28 %	7,23 %	
GAP VALLADOLID OESTE	0,55 %	31,96 %	0,25 %		31,03 %	0,18 %	7,33 %	2,83 %		14,16 %	0,86 %	10,84 %	
GAP VALLADOLID ESTE	0,06 %	33,29 %	0,13 %		28,56 %	0,06 %	8,56 %	3,90 %	0,26 %	14,31 %	1,02 %	9,84 %	
GAP ZAMORA		23,55 %			27,98 %	0,20 %	12,32 %	5,02 %	0,30 %	16,45 %	0,30 %	13,89 %	
TOTAL GRS	0,15 %	27,15 %	0,08 %	0,02 %	31,32 %	0,17 %	9,82 %	5,21 %	0,20 %	13,39 %	0,44 %	12,02 %	0,02 %

Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	83,33 %	30	16,67 %	20,00 %
AGUILAR DE CAMPOO	62,03 %	79	11,39 %	18,37 %
ALAEJOS	66,67 %	24	12,50 %	18,75 %
ALBA DE TORMES	59,65 %	114	30,70 %	51,47 %
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	66,67 %	21	4,76 %	7,14 %
ALISTE	58,33 %	36	30,56 %	52,38 %
ALMAZAN	79,41 %	68	19,12 %	24,07 %
ALTA SANABRIA	33,33 %	3		
ANTONIO GUTIERREZ	72,58 %	361	19,94 %	27,48 %
ARANDA NORTE	74,70 %	166	26,51 %	35,48 %
ARANDA RURAL	81,11 %	90	14,44 %	17,81 %
ARANDA SUR	73,38 %	139	16,55 %	22,55 %
ARCOS DE JALON	77,78 %	27	11,11 %	14,29 %
ARENAS DE SAN PEDRO	75,51 %	98	28,57 %	37,84 %
AREVALO	65,28 %	144	19,44 %	29,79 %
ARMUNIA	70,00 %	130	10,77 %	15,38 %
ARTURO EYRIES	63,30 %	109	17,43 %	27,54 %
ASTORGA I	68,00 %	125	12,80 %	18,82 %
ASTORGA II	63,16 %	38		
AVILA ESTACION	71,72 %	198	31,31 %	43,66 %
AVILA NORTE	72,22 %	108	25,00 %	34,62 %
AVILA RURAL	75,32 %	77	36,36 %	48,28 %
AVILA SUR ESTE	67,52 %	157	14,65 %	21,70 %
AVILA SUR OESTE	74,00 %	150	26,67 %	36,04 %
BABIA	80,00 %	10	40,00 %	50,00 %
BALTANAS	92,00 %	25	4,00 %	4,35 %
BAÑEZA I	76,92 %	104	21,15 %	27,50 %
BAÑEZA II	73,26 %	86	22,09 %	30,16 %
BARCO DE AVILA	77,55 %	49	26,53 %	34,21 %
BARRIO ESPAÑA	65,71 %	70	35,71 %	54,35 %
BEJAR	68,87 %	151	25,83 %	37,50 %
BELORADO	84,62 %	52	32,69 %	38,64 %
BEMBIBRE	70,12 %	164	21,34 %	30,43 %
BENAVENTE NORTE	72,38 %	105	26,67 %	36,84 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1.584	77,97 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9.848	70,55 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	995	57,89 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	988	71,76 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	135	65,19 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8.986	64,87 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	22.536	69,05 %

BENAVENTE SUR	71,43 %	161	23,60 %	33,04 %
BERLANGA DE DUERO	90,91 %	11	27,27 %	30,00 %
BOÑAR	65,22 %	23	21,74 %	33,33 %
BRIVIESCA	64,52 %	62	14,52 %	22,50 %
BURGO DE OSMA	68,52 %	54	16,67 %	24,32 %
BURGOHONDO	60,78 %	51	9,80 %	16,13 %
BURGOS RURAL NORTE	68,18 %	88	25,00 %	36,67 %
BURGOS RURAL SUR	69,77 %	86	10,47 %	15,00 %
CACABELOS	65,14 %	175	6,29 %	9,65 %
CALZADA DE VALDUNCIEL	57,14 %	28		
CAMARZANA DE TERA	58,33 %	24	8,33 %	14,29 %
CAMPOS LAMPREANA	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	76,92 %	78	23,08 %	30,00 %
CANDELEDA	74,24 %	66	40,91 %	55,10 %
CANTALAPIEDRA	64,29 %	14	7,14 %	11,11 %
CANTALEJO	78,65 %	89	39,33 %	50,00 %
CANTERAC	62,07 %	58	15,52 %	25,00 %
CAPUCHINOS	60,20 %	98	10,20 %	16,95 %
CARBAJALES DE ALBA	28,57 %	7		
CARBALLEDA	69,23 %	13	23,08 %	33,33 %
CARBONERO	77,24 %	145	31,03 %	40,18 %
CARRION DE LOS CONDES	70,00 %	50	26,00 %	37,14 %
CASA DEL BARCO	61,36 %	132	28,03 %	45,68 %
CEBREROS	61,67 %	60	33,33 %	54,05 %
CENTRO-GAMAZO	66,95 %	118	16,95 %	25,32 %
CERVERA DE PISUERGA	81,58 %	38	31,58 %	38,71 %
CIGALES	51,67 %	60	21,67 %	41,94 %
CIRCULAR	53,54 %	99	9,09 %	16,98 %
CIRCUNVALACION	54,05 %	148	25,00 %	46,25 %
CISTIerna	48,15 %	54	18,52 %	38,46 %
CIUDAD RODRIGO	73,10 %	145	20,69 %	28,30 %
CONDADO DE TREVIÑO	83,33 %	24	8,33 %	10,00 %
CONDESA	71,91 %	178	12,92 %	17,97 %
CORRALES	84,62 %	26	15,38 %	18,18 %
CRISTOBAL ACOSTA	74,78 %	115	15,65 %	20,93 %
CRUCERO	74,76 %	103	24,27 %	32,47 %
CUELLAR	72,59 %	135	9,63 %	13,27 %
CUENCA DEL BERNESGA	83,19 %	119	25,21 %	30,30 %
DELICIAS I	65,85 %	284	15,85 %	24,06 %
DELICIAS II	63,16 %	133	18,05 %	28,57 %
DESCONOCIDO	33,33 %	3	33,33 %	100,00 %

EL EJIDO	75,88 %	170	20,59 %	27,13 %
EL ESPINAR	64,58 %	96	22,92 %	35,48 %
ERAS DEL BOSQUE	76,04 %	217	12,44 %	16,36 %
ESGUEVILLAS	87,50 %	8	25,00 %	28,57 %
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	53,85 %	26		
FABERO	63,75 %	80	21,25 %	33,33 %
FONTIVEROS	71,43 %	28	21,43 %	30,00 %
FROMISTA	78,57 %	28	10,71 %	13,64 %
FUENTEGUINALDO	60,00 %	5	20,00 %	33,33 %
FUENTESAUCO	93,75 %	32	62,50 %	66,67 %
FUENTES DE OÑORO	54,55 %	11	9,09 %	16,67 %
GAMONAL-ANTIGUA	66,67 %	165	27,27 %	40,91 %
GARCIA LORCA	72,84 %	81	7,41 %	10,17 %
GARRIDO NORTE	55,71 %	140	14,29 %	25,64 %
GARRIDO SUR	52,20 %	205	13,66 %	26,17 %
GOMARA	100,00 %	4	25,00 %	25,00 %
GREDOS	57,14 %	14	50,00 %	87,50 %
GUARDO	60,64 %	94	9,57 %	15,79 %
GUAREÑA	70,27 %	37	21,62 %	30,77 %
GUIJUELO	70,59 %	119	8,40 %	11,90 %
HERRERA DE PISUERGA	60,61 %	66	21,21 %	35,00 %
HUERTA DEL REY	63,18 %	258	19,38 %	30,67 %
HUERTA DE REY	78,57 %	14	28,57 %	36,36 %
IGNACIO LOPEZ SAIZ	75,00 %	96	11,46 %	15,28 %
ISCAR	69,44 %	108	22,22 %	32,00 %
JARDINILLOS	77,61 %	134	33,58 %	43,27 %
JOSE AGUADO	81,48 %	243	13,58 %	16,67 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	73,08 %	156	21,79 %	29,82 %
LA ALAMEDILLA	67,07 %	164	25,00 %	37,27 %
LA ALBERCA	65,22 %	23	17,39 %	26,67 %
LA CABRERA	66,67 %	6		
LA FUENTE SAN ESTEBAN	77,78 %	18	16,67 %	21,43 %
LAGUNA DE DUERO	63,08 %	260	24,23 %	38,41 %
LA MAGDALENA	89,66 %	29	34,48 %	38,46 %
LANZAHITA	66,67 %	27	11,11 %	16,67 %
LA PALOMERA	68,48 %	257	19,84 %	28,98 %
LA PUEBLA	70,48 %	210	15,24 %	21,62 %
LAS HUEL GAS	73,96 %	96	27,08 %	36,62 %
LA SIERRA	81,25 %	32	28,13 %	34,62 %
LAS NAVAS DEL MARQUES	69,44 %	108	38,89 %	56,00 %
LAS TORRES	78,95 %	114	39,47 %	50,00 %

LA VICTORIA	65,19 %	135	28,89 %	44,32 %
LEDESMA	48,15 %	27	7,41 %	15,38 %
LERMA	72,73 %	55	3,64 %	5,00 %
LINARES DE RIOFRIO	70,00 %	20	10,00 %	14,29 %
LOS COMUNEROS	62,40 %	125	15,20 %	24,36 %
LOS CUBOS	74,05 %	131	26,72 %	36,08 %
LUMBRALES	57,89 %	19	10,53 %	18,18 %
MADRIGAL ALTAS TORRES	77,78 %	9	66,67 %	85,71 %
MAGDALENA	70,27 %	74	47,30 %	67,31 %
MANSILLA DE LAS MULAS	76,27 %	59	3,39 %	4,44 %
MATALLANA DE TORIO	63,64 %	22	18,18 %	28,57 %
MATILLA DE LOS CAÑOS	89,66 %	29	6,90 %	7,69 %
MAYORGA DE CAMPOS	77,78 %	9	11,11 %	14,29 %
MEDINA DEL CAMPO RURAL	67,29 %	107	18,69 %	27,78 %
MEDINA DEL CAMPO URBANO	67,11 %	301	29,57 %	44,06 %
MEDINA DE POMAR	69,35 %	62	25,81 %	37,21 %
MEDINA DE RIOSECO	39,24 %	79	16,46 %	41,94 %
MELGAR DE FERNAMENTAL	67,74 %	31	22,58 %	33,33 %
MIGUEL ARMIJO	68,15 %	135	23,70 %	34,78 %
MIRANDA DEL CASTAÑAR	63,64 %	11		
MIRANDA ESTE	67,83 %	286	31,12 %	45,88 %
MIRANDA OESTE	74,46 %	372	31,99 %	42,96 %
MOMBELTRAN	59,09 %	22	9,09 %	15,38 %
MOTA DEL MARQUES	66,67 %	9	11,11 %	16,67 %
MUÑANA	55,00 %	20	35,00 %	63,64 %
MUÑICO	66,67 %	3		
NAVA DE LA ASUNCION	73,33 %	135	25,19 %	34,34 %
OLMEDO	79,55 %	44	22,73 %	28,57 %
OLVEGA	70,21 %	47	38,30 %	54,55 %
OSORNO	83,33 %	12	25,00 %	30,00 %
PALENCIA RURAL	75,00 %	52	28,85 %	38,46 %
PAMPLIEGA	62,50 %	8		
PARADA DE MOLINO	75,35 %	142	13,38 %	17,76 %
PAREDES DE NAVA	81,25 %	32	62,50 %	76,92 %
PARQUESOL	58,13 %	289	17,30 %	29,76 %
PEDROSILLO EL RALO	83,78 %	37	5,41 %	6,45 %
PEÑAFIEL	68,12 %	69	17,39 %	25,53 %
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	78,18 %	55	20,00 %	25,58 %

PERIURBANA NORTE	71,58 %	190	15,79 %	22,06 %
PERIURBANA SUR	75,18 %	141	17,73 %	23,58 %
PIEDRAHITA	81,25 %	32	46,88 %	57,69 %
PILARICA	65,75 %	146	23,29 %	35,42 %
PINARES-COVALEDA	83,56 %	73	39,73 %	47,54 %
PINTOR OLIVA	70,75 %	212	11,32 %	16,00 %
PISUERGA	66,53 %	239	22,59 %	33,96 %
PIZARRALES	65,65 %	131	6,87 %	10,47 %
PLAZA DEL EJERCITO	57,86 %	159	31,45 %	54,35 %
PONFERRADA I	70,20 %	245	8,16 %	11,63 %
PONFERRADA II	62,09 %	277	15,16 %	24,42 %
PONFERRADA III	76,33 %	207	9,66 %	12,66 %
PONFERRADA IV	72,73 %	143	11,89 %	16,35 %
PORTILLO	66,36 %	107	18,69 %	28,17 %
PUEBLA DE SANABRIA	75,00 %	36	11,11 %	14,81 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ	63,16 %	38	15,79 %	25,00 %
PUERTA NUEVA	63,80 %	163	15,34 %	24,04 %
QUINTANAR DE LA SIERRA	82,05 %	39	20,51 %	25,00 %
RIAÑO	68,42 %	19	5,26 %	7,69 %
RIAZA	72,22 %	54	22,22 %	30,77 %
RIBERA DEL ESLA	58,82 %	17		
RIBERA DEL ORBIGO	76,47 %	153	30,72 %	40,17 %
ROA	50,00 %	44	13,64 %	27,27 %
ROBLEDA	87,50 %	8		
RONDILLA I	52,63 %	76	21,05 %	40,00 %
RONDILLA II	62,35 %	85	22,35 %	35,85 %
SACRAMENIA	75,00 %	4	25,00 %	33,33 %
SAHAGUN	87,50 %	40	25,00 %	28,57 %
SALAS DE LOS INFANTES	82,93 %	41	26,83 %	32,35 %
SALDAÑA	60,00 %	45	22,22 %	37,04 %
SAN AGUSTIN	76,22 %	164	17,68 %	23,20 %
SAN ANDRES DEL RABANEDO	73,08 %	156	19,23 %	26,32 %
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	81,08 %	37	27,03 %	33,33 %
SAN ILDEFONSO	58,33 %	48	18,75 %	32,14 %
SAN JOSE	69,23 %	91	7,69 %	11,11 %
SAN JUAN	54,14 %	133	11,28 %	20,83 %
SAN LEONARDO DE YAGUE	71,79 %	39	23,08 %	32,14 %
SAN PABLO	64,81 %	108	19,44 %	30,00 %
SAN PEDRO DEL ARROYO	58,33 %	12	16,67 %	28,57 %
SAN PEDRO MANRIQUE	64,29 %	14		
SANTA CLARA	74,38 %	121	9,92 %	13,33 %

SANTA ELENA	68,52 %	108	25,93 %	37,84 %
SANTA MARIA	65,56 %	90	22,22 %	33,90 %
SANTA MARTA	72,78 %	158	13,29 %	18,26 %
SAYAGO	52,17 %	23		
SEDANO	80,00 %	5	20,00 %	25,00 %
SEGOVIA I	72,46 %	207	34,30 %	47,33 %
SEGOVIA II	76,59 %	205	28,78 %	37,58 %
SEGOVIA III	78,69 %	122	31,15 %	39,58 %
SEGOVIA RURAL	76,15 %	239	25,94 %	34,07 %
SEPULVEDA	86,67 %	30	23,33 %	26,92 %
SERRADA	50,00 %	38	15,79 %	31,58 %
SORIA NORTE	60,12 %	163	23,93 %	39,80 %
SORIA RURAL	63,64 %	99	26,26 %	41,27 %
SORIA SUR	66,34 %	202	18,81 %	28,36 %
SORIA TARDE	72,73 %	33	42,42 %	58,33 %
SOTILLO DE LA ADRADA	65,15 %	66	21,21 %	32,56 %
SUR	55,92 %	245	25,31 %	45,26 %
TABARA	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
TAMAMES	62,50 %	8	12,50 %	20,00 %
TEJARES	68,13 %	91	13,19 %	19,35 %
TORDESILLAS	71,68 %	113	24,78 %	34,57 %
TORENO	72,00 %	25	32,00 %	44,44 %
TORO	61,40 %	57	12,28 %	20,00 %
TORQUEMADA	50,00 %	18	27,78 %	55,56 %
TORTOLA	64,29 %	112	27,68 %	43,06 %
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	66,05 %	162	17,28 %	26,17 %
TUDELA	45,05 %	91	5,49 %	12,20 %
UNIVERSIDAD CENTRO	69,79 %	96	16,67 %	23,88 %
VALDERAS	75,86 %	29	24,14 %	31,82 %
VALENCIA DE DON JUAN	72,00 %	100	16,00 %	22,22 %
VALLADOLID RURAL I	73,97 %	73	32,88 %	44,44 %
VALLADOLID RURAL II	66,27 %	83	19,28 %	29,09 %
VALLE DE LOSA	100,00 %	3		
VALLE DE MENA	64,29 %	28	3,57 %	5,56 %
VALLE DE TOBALINA	87,50 %	8	37,50 %	42,86 %
VALLE DE VALDEBEZANA	66,67 %	3	33,33 %	50,00 %
VENTA DE BAÑOS	65,43 %	81	20,99 %	32,08 %
VIDRIALES	76,47 %	17	11,76 %	15,38 %
VILLABLINO	60,17 %	118	22,88 %	38,03 %
VILLACASTIN	51,61 %	31	19,35 %	37,50 %
VILLADA	61,90 %	21	4,76 %	7,69 %

VILLADIEGO	66,67 %	18	5,56 %	8,33 %
VILLAFRANCA	74,36 %	78	5,13 %	6,90 %
VILLAFRECHOS	84,21 %	19	42,11 %	50,00 %
VILLALON DE CAMPOS	41,67 %	12	8,33 %	20,00 %
VILLALPANDO	83,33 %	24	33,33 %	40,00 %
VILLAMURIEL	70,00 %	80	15,00 %	21,43 %
VILLARCAYO	75,61 %	41	26,83 %	35,48 %
VILLARRAMIEL	46,67 %	15	20,00 %	42,86 %
VILLORIA	63,89 %	36	11,11 %	17,39 %
VIRGEN CONCHA	72,46 %	207	13,53 %	18,67 %
VITIGUDINO	67,92 %	53	16,98 %	25,00 %
ZAMORA NORTE	75,41 %	61	16,39 %	21,74 %
ZAMORA SUR	64,29 %	70	14,29 %	22,22 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
AGREDA		18,52 %			44,44 %		22,22 %			14,81 %			
AGUILAR DE CAMPOO		16,36 %		1,82 %	43,64 %	5,45 %	1,82 %	9,09 %		10,91 %		10,91 %	
ALAEJOS		18,75 %			6,25 %		31,25 %	18,75 %		12,50 %		12,50 %	
ALBA DE TORMES		47,95 %			28,77 %		12,33 %			6,85 %		4,11 %	
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		5,88 %			23,53 %		11,76 %	5,88 %		35,29 %		17,65 %	
ALISTE		50,00 %			18,18 %		18,18 %			9,09 %		4,55 %	
ALMAZAN		22,03 %			45,76 %		13,56 %	3,39 %		8,47 %		6,78 %	
ALTA SANABRIA					100,00 %								
ANTONIO GUTIERREZ	1,80 %	25,90 %			31,65 %		13,67 %	5,04 %		8,63 %	2,16 %	11,15 %	
ARANDA NORTE		31,65 %			37,41 %		3,60 %	7,19 %		10,79 %	0,72 %	8,63 %	
ARANDA RURAL		16,25 %			32,50 %		22,50 %	7,50 %		13,75 %		7,50 %	
ARANDA SUR		20,72 %			38,74 %		4,50 %	4,50 %		17,12 %		14,41 %	
ARCOS DE JALON		13,64 %			22,73 %		36,36 %	4,55 %		18,18 %		4,55 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARENAS DE SAN PEDRO		35,00 %			31,25 %	1,25 %	2,50 %	10,00 %		18,75 %		1,25 %	
AREVALO		25,69 %			45,87 %	1,83 %	7,34 %	0,92 %	0,92 %	8,26 %	0,92 %	8,26 %	
ARMUNIA		14,43 %			26,80 %		16,49 %	15,46 %		16,49 %		10,31 %	
ARTURO EYRIES		26,76 %			39,44 %		7,04 %	2,82 %		15,49 %	5,63 %	2,82 %	
ASTORGA I		17,78 %			34,44 %		6,67 %	2,22 %		16,67 %		22,22 %	
ASTORGA II					23,08 %		7,69 %	3,85 %		42,31 %		23,08 %	
AVILA ESTACION		39,24 %		0,63 %	29,75 %		15,19 %	2,53 %	1,90 %	8,23 %		2,53 %	
AVILA NORTE		31,76 %			35,29 %		17,65 %	1,18 %		5,88 %		8,24 %	
AVILA RURAL		43,75 %			20,31 %		9,38 %	1,56 %	1,56 %	7,81 %		15,63 %	
AVILA SUR ESTE		20,54 %			42,86 %		14,29 %	3,57 %		10,71 %		8,04 %	
AVILA SUR OESTE		32,79 %		0,82 %	24,59 %		16,39 %	9,84 %		11,48 %		4,10 %	
BABIA		36,36 %			27,27 %		9,09 %			9,09 %		18,18 %	
BALTANAS		3,45 %			3,45 %			37,93 %		10,34 %		44,83 %	
BAÑEZA I		25,58 %			18,60 %	1,16 %	16,28 %	2,33 %		16,28 %	4,65 %	15,12 %	
BAÑEZA II		27,94 %			26,47 %		20,59 %	1,47 %		10,29 %		13,24 %	
BARCO DE AVILA		31,71 %			26,83 %		12,20 %	2,44 %		24,39 %		2,44 %	
BARRIO ESPAÑA		53,19 %			12,77 %		8,51 %	4,26 %		10,64 %		10,64 %	
BEJAR		33,05 %			33,05 %		12,71 %			10,17 %		11,02 %	
BELORADO		36,17 %			46,81 %		6,38 %	2,13 %		4,26 %		4,26 %	
BEMBIBRE		28,69 %			40,16 %		3,28 %	8,20 %		11,48 %		8,20 %	
BENAVENTE NORTE		34,57 %			27,16 %	1,23 %	8,64 %	1,23 %		16,05 %		11,11 %	
BENAVENTE SUR		29,69 %			22,66 %	0,78 %	15,63 %	7,03 %	2,34 %	16,41 %		5,47 %	
BERLANGA DE DUERO		25,00 %			33,33 %		16,67 %			8,33 %		16,67 %	
BOÑAR		29,41 %			47,06 %		5,88 %			11,76 %		5,88 %	
BRIVIESCA		20,45 %			36,36 %			2,27 %	2,27 %	15,91 %		22,73 %	
BURGO DE OSMÁ		21,43 %			26,19 %		35,71 %	9,52 %		4,76 %	2,38 %		
BURGOHONDO		15,63 %			34,38 %		6,25 %			34,38 %		9,38 %	
BURGOS RURAL NORTE		33,33 %			22,73 %		4,55 %	12,12 %		15,15 %		12,12 %	
BURGOS RURAL SUR		14,06 %			45,31 %		7,81 %	9,38 %		7,81 %		15,63 %	
CACABELOS		8,53 %			26,36 %		5,43 %	14,73 %	0,78 %	16,28 %		27,91 %	
CALZADA DE VALDUNCIEL					11,11 %		16,67 %	38,89 %		27,78 %		5,56 %	
CAMARZANA DE TERA		13,33 %			26,67 %		20,00 %			26,67 %		13,33 %	
CAMPOS LAMPREANA		25,00 %			37,50 %		12,50 %					25,00 %	
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS		27,27 %			46,97 %		3,03 %	7,58 %		10,61 %		4,55 %	
CANDELEDA		52,94 %			9,80 %			25,49 %	1,96 %	5,88 %		3,92 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANTALAPIEDRA		11,11 %			33,33 %		11,11 %			33,33 %		11,11 %	
CANTALEJO		45,45 %			25,97 %		1,30 %		1,30 %	18,18 %		7,79 %	
CANTERAC		21,95 %			26,83 %		9,76 %	9,76 %	4,88 %	21,95 %	2,44 %	2,44 %	
CAPUCHINOS		16,67 %			36,67 %		31,67 %	5,00 %		5,00 %		5,00 %	
CARBAJALES DE ALBA					50,00 %							50,00 %	
CARBALLEDA		33,33 %			33,33 %							33,33 %	
CARBONERO	0,81 %	36,29 %			37,90 %		9,68 %			7,26 %		8,06 %	
CARRION DE LOS CONDES		35,14 %			29,73 %					16,22 %		18,92 %	
CASA DEL BARCO	1,11 %	41,11 %			22,22 %		3,33 %	1,11 %		14,44 %		16,67 %	
CEBREROS		51,28 %			15,38 %		2,56 %			25,64 %		5,13 %	
CENTRO-GAMAZO		23,26 %			33,72 %		8,14 %	3,49 %		17,44 %	1,16 %	12,79 %	
CERVERA DE PISUERGA		35,29 %			23,53 %					38,24 %		2,94 %	
CIGALES		40,63 %			21,88 %		6,25 %	3,13 %		12,50 %		15,63 %	
CIRCULAR		16,36 %			27,27 %		16,36 %	3,64 %		23,64 %	1,82 %	10,91 %	
CIRCUNVALACION		44,05 %			33,33 %		3,57 %	2,38 %		13,10 %	1,19 %	2,38 %	
CISTIERNA		35,71 %			35,71 %		3,57 %	7,14 %		10,71 %		7,14 %	
CIUDAD RODRIGO		25,00 %			44,17 %		8,33 %	7,50 %		10,83 %		4,17 %	
CONDADO DE TREVIÑO		9,52 %			80,95 %		4,76 %			4,76 %			
CONDESA		16,55 %			33,09 %		12,95 %	9,35 %	1,44 %	5,04 %	0,72 %	20,86 %	
CORRALES		16,00 %			48,00 %		12,00 %			12,00 %		12,00 %	
CRISTOBAL ACOSTA		18,95 %			35,79 %		11,58 %	13,68 %		8,42 %		11,58 %	
CRUCERO		31,25 %			30,00 %		16,25 %	2,50 %		11,25 %		8,75 %	
CUELLAR	1,96 %	12,75 %			38,24 %		28,43 %	1,96 %		8,82 %		7,84 %	
CUENCA DEL BERNESGA		26,55 %			21,24 %		0,88 %	5,31 %		16,81 %		29,20 %	
DELICIAS I		22,50 %			38,50 %	0,50 %	7,00 %	1,50 %		20,50 %	1,00 %	8,50 %	
DELICIAS II		26,09 %			33,70 %		3,26 %	3,26 %		15,22 %	1,09 %	17,39 %	
DESCONOCIDO		100,00 %											
EL EJIDO		24,48 %			34,27 %		15,38 %	1,40 %	0,70 %	8,39 %		15,38 %	
EL ESPINAR		32,84 %			34,33 %		5,97 %	8,96 %		7,46 %	1,49 %	8,96 %	
ERAS DEL BOSQUE		15,17 %			42,70 %		4,49 %	9,55 %		10,67 %		16,85 %	0,56 %
ESGUEVILLAS		25,00 %			50,00 %		12,50 %	12,50 %					
ESPINOSA DE LOS MONTEROS					64,29 %		7,14 %			21,43 %		7,14 %	
FABERO		31,48 %			29,63 %	1,85 %	16,67 %	5,56 %		9,26 %		5,56 %	
FONTIVEROS		28,57 %			42,86 %		14,29 %			4,76 %		9,52 %	
FROMISTA		13,04 %			34,78 %		4,35 %			21,74 %		26,09 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FUENTEGUINALDO		33,33 %					33,33 %					33,33 %	
FUENTESAUCO	2,94 %	58,82 %			11,76 %		5,88 %	11,76 %		8,82 %			
FUENTES DE OÑORO		16,67 %			33,33 %		16,67 %	16,67 %				16,67 %	
GAMONAL-ANTIGUA		38,14 %			35,59 %		0,85 %	6,78 %		10,17 %		8,47 %	
GARCIA LORCA		9,09 %			62,12 %			1,52 %		16,67 %		10,61 %	
GARRIDO NORTE		23,81 %			21,43 %		16,67 %	9,52 %		20,24 %		8,33 %	
GARRIDO SUR		24,14 %			38,79 %		11,21 %	3,45 %		12,93 %		9,48 %	
GOMARA		16,67 %			16,67 %		16,67 %			16,67 %	16,67 %	16,67 %	
GREDOS		77,78 %			11,11 %		11,11 %						
GUARDO		13,85 %			27,69 %			6,15 %		24,62 %		27,69 %	
GUAREÑA		30,77 %			19,23 %		11,54 %	15,38 %		15,38 %		7,69 %	
GUIJUELO		10,10 %			21,21 %		33,33 %	7,07 %		6,06 %		22,22 %	
HERRERA DE PISUERGA	2,38 %	33,33 %			30,95 %					21,43 %	4,76 %	7,14 %	
HUERTA DEL REY		27,01 %	1,72 %		33,33 %		11,49 %	4,02 %		6,90 %		15,52 %	
HUERTA DE REY		33,33 %			16,67 %					16,67 %		33,33 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ		13,75 %			25,00 %		1,25 %	46,25 %		6,25 %		7,50 %	
ISCAR		28,92 %			36,14 %		12,05 %	1,20 %		14,46 %		7,23 %	
JARDINILLOS		39,13 %			32,17 %		2,61 %	2,61 %		13,91 %		9,57 %	
JOSE AGUADO		15,64 %			33,65 %		13,74 %	4,74 %		14,69 %		17,54 %	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		27,20 %			38,40 %		8,00 %	6,40 %		12,80 %		7,20 %	
LA ALAMEDILLA		31,78 %			34,88 %		6,20 %	3,10 %		17,83 %		6,20 %	
LA ALBERCA		21,05 %			36,84 %		21,05 %	5,26 %		5,26 %		10,53 %	
LA CABRERA					50,00 %					25,00 %		25,00 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN		21,43 %			42,86 %		28,57 %	7,14 %					
LAGUNA DE DUERO	2,13 %	33,51 %			30,32 %		10,64 %	4,79 %		9,57 %	0,53 %	8,51 %	
LA MAGDALENA		38,46 %			42,31 %		3,85 %			3,85 %		11,54 %	
LANZAHITA		16,67 %			5,56 %		72,22 %	5,56 %					
LA PALOMERA		26,15 %			19,49 %		13,33 %	8,72 %		13,85 %	0,51 %	17,95 %	
LA PUEBLA		19,88 %			40,37 %		9,32 %	10,56 %		4,97 %		14,91 %	
LAS HUEL GAS		34,67 %			37,33 %		1,33 %	9,33 %		10,67 %		6,67 %	
LA SIERRA		32,14 %			53,57 %					14,29 %			
LAS NAVAS DEL MARQUES		51,22 %			14,63 %	2,44 %	9,76 %	2,44 %		10,98 %		8,54 %	
LAS TORRES		45,83 %	1,04 %		29,17 %		3,13 %	4,17 %		3,13 %		13,54 %	
LA VICTORIA		40,63 %			21,88 %		5,21 %	6,25 %		8,33 %	1,04 %	16,67 %	
LEDESMA		15,38 %			38,46 %		7,69 %			38,46 %			
LERMA		4,65 %			39,53 %			6,98 %		39,53 %		9,30 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LINARES DE RIOFRIO		14,29 %			50,00 %			7,14 %		21,43 %		7,14 %	
LOS COMUNEROS		21,35 %			32,58 %		4,49 %	5,62 %		17,98 %		17,98 %	
LOS CUBOS		31,82 %			32,73 %		2,73 %	9,09 %		8,18 %	0,91 %	14,55 %	
LUMBRALES		14,29 %			42,86 %		21,43 %			21,43 %			
MADRIGAL ALTAS TORRES		85,71 %					14,29 %						
MAGDALENA		57,63 %	1,69 %		13,56 %			5,08 %		16,95 %		5,08 %	
MANSILLA DE LAS MULAS		3,70 %			29,63 %		5,56 %	16,67 %		20,37 %		24,07 %	
MATALLANA DE TORIO		21,05 %			31,58 %			5,26 %		5,26 %		36,84 %	
MATILLA DE LOS CAÑOS		7,41 %			7,41 %		18,52 %	7,41 %		55,56 %		3,70 %	
MAYORGA DE CAMPOS	14,29 %	14,29 %			28,57 %					14,29 %		28,57 %	
MEDINA DEL CAMPO RURAL		24,39 %			29,27 %		12,20 %	1,22 %	1,22 %	21,95 %	2,44 %	7,32 %	
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,44 %	39,38 %			26,55 %	0,44 %	6,19 %	0,44 %		16,81 %		9,73 %	
MEDINA DE POMAR	2,22 %	35,56 %			22,22 %		6,67 %	2,22 %		17,78 %		13,33 %	
MEDINA DE RIOSECO		36,11 %			38,89 %		5,56 %	5,56 %		8,33 %	2,78 %	2,78 %	
MELGAR DE FERNAMENTAL		33,33 %			23,81 %					38,10 %		4,76 %	
MIGUEL ARMIJO		29,63 %			37,04 %		6,48 %	4,63 %		7,41 %		14,81 %	
MIRANDA DEL CASTAÑAR					62,50 %		12,50 %			25,00 %			
MIRANDA ESTE		41,20 %			34,72 %	0,46 %	6,02 %	1,39 %	0,46 %	11,11 %	0,46 %	4,17 %	
MIRANDA OESTE		38,51 %			24,92 %		9,71 %	7,12 %	0,32 %	13,59 %		5,83 %	
MOMBELTRAN		15,38 %			53,85 %		15,38 %	15,38 %					
MOTA DEL MARQUES		11,11 %			33,33 %		22,22 %			22,22 %		11,11 %	
MUÑANA		53,85 %			30,77 %							15,38 %	
MUÑICO					100,00 %								
NAVA DE LA ASUNCION		29,57 %			29,57 %		5,22 %	9,57 %		14,78 %		11,30 %	
OLMEDO		25,00 %			35,00 %		20,00 %			2,50 %	2,50 %	15,00 %	
OLVEGA		47,37 %			26,32 %		2,63 %	2,63 %		15,79 %		5,26 %	
OSORNO		30,00 %			40,00 %		10,00 %	10,00 %		10,00 %			
PALENCIA RURAL		34,88 %			11,63 %		2,33 %	6,98 %	2,33 %	11,63 %		30,23 %	
PAMPLIEGA							20,00 %			20,00 %		60,00 %	
PARADA DE MOLINO		16,96 %			13,39 %		11,61 %	5,36 %		37,50 %	0,89 %	14,29 %	
PAREDES DE NAVA		71,43 %			3,57 %		3,57 %					21,43 %	
PARQUESOL		28,00 %	0,57 %		29,14 %	0,57 %	2,86 %	5,14 %		17,14 %	0,57 %	16,00 %	
PEDROSILLO EL RALO		5,00 %			17,50 %		37,50 %			25,00 %		15,00 %	
PEÑAFIEL		25,00 %			20,83 %		6,25 %	2,08 %		16,67 %	2,08 %	27,08 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		22,00 %			28,00 %		18,00 %			22,00 %		10,00 %	
PERIURBANA NORTE		19,87 %			40,40 %		18,54 %	7,28 %	1,32 %	5,96 %		6,62 %	
PERIURBANA SUR		21,19 %			35,59 %		13,56 %			24,58 %		4,24 %	0,85 %
PIEDRAHITA		51,72 %			27,59 %		10,34 %			6,90 %		3,45 %	
PILARICA		32,08 %			30,19 %		16,04 %	0,94 %		10,38 %	1,89 %	8,49 %	
PINARES-COVALEDA		39,73 %			9,59 %		16,44 %	5,48 %		24,66 %		4,11 %	
PINTOR OLIVA		14,20 %			27,81 %		2,37 %	20,71 %		8,88 %		26,04 %	
PISUERGA		32,93 %			34,15 %		6,10 %			19,51 %	0,61 %	6,71 %	
PIZARRALES	1,10 %	9,89 %			42,86 %		10,99 %	10,99 %		7,69 %		16,48 %	
PLAZA DEL EJERCITO	1,04 %	52,08 %			25,00 %		5,21 %			7,29 %	3,13 %	6,25 %	
PONFERRADA I		10,75 %			36,56 %		15,59 %	8,06 %		10,22 %		18,82 %	
PONFERRADA II		21,24 %	0,52 %		30,05 %	1,04 %	21,24 %	2,07 %		8,81 %		15,03 %	
PONFERRADA III		11,70 %			36,26 %	3,51 %	15,20 %	2,34 %		18,71 %		12,28 %	
PONFERRADA IV		15,60 %			45,87 %	1,83 %	10,09 %			12,84 %		13,76 %	
PORTILLO		25,00 %	1,32 %		40,79 %		10,53 %	1,32 %		9,21 %	1,32 %	10,53 %	
PUEBLA DE SANABRIA		13,79 %			34,48 %		10,34 %	3,45 %		20,69 %		17,24 %	
PUEBLO DOMINGO FLOREZ	3,70 %	22,22 %			59,26 %					14,81 %			
PUERTA NUEVA		22,32 %			33,93 %		17,86 %	1,79 %		11,61 %		12,50 %	
QUINTANAR DE LA SIERRA		21,62 %			21,62 %		5,41 %	2,70 %		35,14 %	2,70 %	10,81 %	
RIAÑO		7,69 %			7,69 %		30,77 %					53,85 %	
RIAZA	2,44 %	29,27 %			41,46 %		2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %		17,07 %	
RIBERA DEL ESLA					50,00 %		20,00 %	10,00 %		20,00 %			
RIBERA DEL ORBIGO		35,38 %	0,77 %		28,46 %		10,77 %	0,77 %		10,00 %	0,77 %	13,08 %	
ROA		26,09 %			56,52 %		8,70 %			4,35 %		4,35 %	
ROBLEDA					50,00 %		25,00 %	12,50 %				12,50 %	
RONDILLA I		36,36 %			25,00 %		4,55 %	6,82 %		11,36 %	2,27 %	13,64 %	
RONDILLA II		33,33 %			33,33 %		8,77 %	1,75 %		15,79 %		7,02 %	
SACRAMENIA		25,00 %			50,00 %		25,00 %						
SAHAGUN		23,81 %			7,14 %		7,14 %	2,38 %		38,10 %	2,38 %	19,05 %	
SALAS DE LOS INFANTES		30,56 %			38,89 %		2,78 %	2,78 %		13,89 %	5,56 %	5,56 %	
SALDAÑA		37,04 %			33,33 %		7,41 %			11,11 %		11,11 %	
SAN AGUSTIN		19,85 %	1,47 %		35,29 %		13,24 %	5,15 %	0,74 %	13,97 %		9,56 %	0,74 %
SAN ANDRES DEL RABANEDO		24,39 %			34,96 %		7,32 %	6,50 %		6,50 %		20,33 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	3,03 %	30,30 %			33,33 %		9,09 %	6,06 %		6,06 %		12,12 %	
SAN ILDEFONSO		31,03 %			37,93 %		10,34 %	6,90 %		6,90 %		6,90 %	
SAN JOSE		10,29 %			19,12 %		48,53 %	2,94 %		8,82 %		10,29 %	
SAN JUAN		20,27 %			27,03 %		12,16 %	2,70 %		17,57 %		20,27 %	
SAN LEONARDO DE YAGUE		30,00 %			26,67 %		3,33 %			10,00 %		30,00 %	
SAN PABLO		26,25 %			31,25 %		3,75 %	18,75 %		12,50 %	1,25 %	6,25 %	
SAN PEDRO DEL ARROYO		28,57 %			57,14 %					14,29 %			
SAN PEDRO MANRIQUE					36,36 %		45,45 %	9,09 %		9,09 %			
SANTA CLARA		12,24 %			38,78 %		6,12 %	16,33 %		7,14 %		19,39 %	
SANTA ELENA		35,00 %			28,75 %		6,25 %	11,25 %		8,75 %	1,25 %	8,75 %	
SANTA MARIA		31,25 %			12,50 %		12,50 %	17,19 %		18,75 %		7,81 %	
SANTA MARTA		16,00 %	0,80 %		32,80 %		12,00 %	4,00 %		8,80 %		25,60 %	
SAYAGO					69,23 %		15,38 %	7,69 %				7,69 %	
SEDANO		25,00 %			25,00 %		25,00 %			25,00 %			
SEGOVIA I		43,03 %			24,85 %		4,85 %	1,82 %		13,33 %	0,61 %	11,52 %	
SEGOVIA II		32,95 %	0,57 %		40,34 %		5,68 %		1,70 %	16,48 %		2,27 %	
SEGOVIA III		34,23 %			31,53 %		1,80 %	0,90 %		22,52 %	0,90 %	8,11 %	
SEGOVIA RURAL		33,16 %			32,09 %		2,67 %			22,99 %	0,53 %	8,56 %	
SEPULVEDA		25,00 %			39,29 %	3,57 %	3,57 %	3,57 %		17,86 %		7,14 %	
SERRADA		27,27 %			22,73 %		13,64 %	13,64 %		4,55 %	4,55 %	13,64 %	
SORIA NORTE		37,86 %			26,21 %		12,62 %	6,80 %		11,65 %		4,85 %	
SORIA RURAL		37,14 %			22,86 %		15,71 %	5,71 %		11,43 %		7,14 %	
SORIA SUR		25,00 %			28,29 %		16,45 %	7,24 %		14,47 %		8,55 %	
SORIA TARDE		51,85 %			22,22 %		7,41 %	3,70 %		7,41 %		7,41 %	
SOTILLO DE LA ADRADA		29,79 %			40,43 %		6,38 %	2,13 %		12,77 %		8,51 %	
SUR		40,52 %			22,88 %	0,65 %	8,50 %	2,61 %		13,73 %		11,11 %	
TABARA		20,00 %			20,00 %		50,00 %					10,00 %	
TAMAMES		12,50 %			50,00 %		12,50 %			12,50 %	12,50 %		
TEJARES		17,91 %			41,79 %		2,99 %	10,45 %		16,42 %		10,45 %	
TORDESILLAS	2,35 %	32,94 %			23,53 %		5,88 %	7,06 %		11,76 %		16,47 %	
TORENO		42,11 %			42,11 %					5,26 %		10,53 %	
TORO		18,92 %			37,84 %		21,62 %	5,41 %		10,81 %		5,41 %	
TORQUEMADA		55,56 %			11,11 %			11,11 %		22,22 %			
TORTOLA		41,33 %			21,33 %		4,00 %	5,33 %	1,33 %	18,67 %	1,33 %	6,67 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN		22,76 %			29,27 %		10,57 %	0,81 %		10,57 %		26,02 %	
TUDELA		10,87 %			45,65 %		13,04 %			15,22 %		15,22 %	
UNIVERSIDAD CENTRO		21,92 %			28,77 %		8,22 %	15,07 %		9,59 %		16,44 %	
VALDERAS		24,14 %			24,14 %		13,79 %	6,90 %		20,69 %		10,34 %	
VALENCIA DE DON JUAN		19,75 %			12,35 %		3,70 %	9,88 %		16,05 %	2,47 %	35,80 %	
VALLADOLID RURAL I		42,86 %			33,93 %		3,57 %	3,57 %		10,71 %		5,36 %	
VALLADOLID RURAL II		25,81 %			38,71 %		8,06 %			20,97 %		6,45 %	
VALLE DE LOSA					66,67 %					33,33 %			
VALLE DE MENA		5,00 %			50,00 %		5,00 %			15,00 %		25,00 %	
VALLE DE TOBALINA		42,86 %					42,86 %			14,29 %			
VALLE DE VALDEBEZANA		50,00 %					50,00 %						
VENTA DE BAÑOS		28,81 %			32,20 %		3,39 %	1,69 %		18,64 %	1,69 %	13,56 %	
VIDRIALES		14,29 %			42,86 %		14,29 %			7,14 %		21,43 %	
VILLABLINO		35,53 %			26,32 %		5,26 %	1,32 %	5,26 %	15,79 %	1,32 %	9,21 %	
VILLACASTIN		37,50 %			43,75 %		6,25 %	6,25 %				6,25 %	
VILLADA		5,56 %			27,78 %		11,11 %	5,56 %		27,78 %		22,22 %	
VILLADIEGO		8,33 %			83,33 %		8,33 %						
VILLAFRANCA		6,45 %			17,74 %		4,84 %	8,06 %		6,45 %		56,45 %	
VILLAFRECHOS		44,44 %			16,67 %		22,22 %			16,67 %			
VILLALON DE CAMPOS		20,00 %			20,00 %		60,00 %						
VILLALPANDO		40,00 %			30,00 %		15,00 %			15,00 %			
VILLAMURIEL		20,69 %			10,34 %		3,45 %	1,72 %		17,24 %		46,55 %	
VILLARCAYO		30,56 %			50,00 %		5,56 %			8,33 %		5,56 %	
VILLARRAMIEL		30,00 %			50,00 %					20,00 %			
VILLORIA		12,50 %			21,88 %		21,88 %	3,13 %		6,25 %	18,75 %	15,63 %	
VIRGEN CONCHA		16,47 %			27,06 %		7,65 %	3,53 %		15,88 %	0,59 %	28,82 %	
VITIGUDINO		21,43 %			35,71 %		9,52 %	2,38 %		26,19 %		4,76 %	
ZAMORA NORTE		19,23 %			40,38 %		11,54 %	13,46 %		9,62 %		5,77 %	
ZAMORA SUR		20,41 %			20,41 %		8,16 %	6,12 %		24,49 %		20,41 %	
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	0,08 %	0,02 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %	0,02 %

AGREDA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	83,33 %	30	16,67 %	20,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	20	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	30	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AGREDA	18,52 %	44,44 %	22,22 %	14,81 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

AGUILAR DE CAMPOO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGUILAR DE CAMPOO	62,03 %	79	11,39 %	18,37 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	56,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	44	61,36 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	82	62,03 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGUILAR DE CAMPOO	16,36 %	1,82 %	43,64 %	5,45 %	1,82 %	9,09 %	10,91 %	10,91 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,02 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ALAEJOS			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALAEJOS	66,67 %	24	12,50 %	18,75 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	58,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	26	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALAEJOS	18,75 %	6,25 %	31,25 %	18,75 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ALBA DE TORMES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALBA DE TORMES	59,65 %	114	30,70 %	51,47 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	62,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	46	54,35 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	77,78 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	22,22 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	63,04 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	119	59,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALBA DE TORMES	47,95 %	28,77 %	12,33 %	6,85 %	4,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

ALDEADAVILA DE LA RIBE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	66,67 %	21	4,76 %	7,14 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	7	71,43 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	13	61,54 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	21	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	5,88 %	23,53 %	11,76 %	5,88 %	35,29 %	17,65 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ALISTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALISTE	58,33 %	36	30,56 %	52,38 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	7	28,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	36	58,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALISTE	50,00 %	18,18 %	18,18 %	9,09 %	4,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

ALMAZAN				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALMAZAN	79,41 %	68	19,12 %	24,07 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	45	82,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	77,78 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	9	55,56 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	71	79,41 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALMAZAN	22,03 %	45,76 %	13,56 %	3,39 %	8,47 %	6,78 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ALTA SANABRIA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico			
Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-05

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALTA SANABRIA	33,33 %	3		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	3	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ALTA SANABRIA	100,00 %
TOTAL GAP	31,30 %

ANTONIO GUTIERREZ				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ANTONIO GUTIERREZ	72,58 %	361	19,94 %	27,48 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	17	94,12 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	186	79,57 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	22,22 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	147	64,63 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	367	72,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	1,80 %	25,90 %	31,65 %	13,67 %	5,04 %	8,63 %	2,16 %	11,15 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ARANDA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA NORTE	74,70 %	166	26,51 %	35,48 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	54,55 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	54	77,78 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	75,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	13	61,54 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	83	74,70 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	172	74,70 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA NORTE	31,65 %	37,41 %	3,60 %	7,19 %	10,79 %	0,72 %	8,63 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ARANDA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA RURAL	81,11 %	90	14,44 %	17,81 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	34	82,35 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	80,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	8	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	40	82,50 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	91	81,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA RURAL	16,25 %	32,50 %	22,50 %	7,50 %	13,75 %	7,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ARANDA SUR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA SUR	73,38 %	139	16,55 %	22,55 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	13	76,92 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	58	74,14 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	65	63,08 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	148	73,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA SUR	20,72 %	38,74 %	4,50 %	4,50 %	17,12 %	14,41 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ARCOS DE JALON				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARCOS DE JALON	77,78 %	27	11,11 %	14,29 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	90,91 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	27	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	13,64 %	22,73 %	36,36 %	4,55 %	18,18 %	4,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ARENAS DE SAN PEDRO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARENAS DE SAN PEDRO	75,51 %	98	28,57 %	37,84 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	55,56 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	53	69,81 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	80,65 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	101	75,51 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARENAS DE SAN PEDRO	35,00 %	31,25 %	1,25 %	2,50 %	10,00 %	18,75 %	1,25 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

AREVALO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AREVALO	65,28 %	144	19,44 %	29,79 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	62,30 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	68	67,65 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	145	65,28 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AREVALO	25,69 %	45,87 %	1,83 %	7,34 %	0,92 %	0,92 %	8,26 %	0,92 %	8,26 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ARMUNIA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARMUNIA	70,00 %	130	10,77 %	15,38 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	40	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	73	67,12 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	134	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARMUNIA	14,43 %	26,80 %	16,49 %	15,46 %	16,49 %	10,31 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ARTURO EYRIES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARTURO EYRIES	63,30 %	109	17,43 %	27,54 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	90,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	45	62,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	62,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	58,70 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	111	63,30 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARTURO EYRIES	26,76 %	39,44 %	7,04 %	2,82 %	15,49 %	5,63 %	2,82 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ASTORGA I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA I	68,00 %	125	12,80 %	18,82 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	87,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	49	71,43 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	25,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	28,57 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	61	65,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	129	68,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	17,78 %	34,44 %	6,67 %	2,22 %	16,67 %	22,22 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ASTORGA II				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA II	63,16 %	38		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	17	52,94 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	38	63,16 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	23,08 %	7,69 %	3,85 %	42,31 %	23,08 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

AVILA ESTACION				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA ESTACION	71,72 %	198	31,31 %	43,66 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	103	68,93 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	16	56,25 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	14	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	56	64,29 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	203	71,72 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA ESTACION	39,24 %	0,63 %	29,75 %	15,19 %	2,53 %	1,90 %	8,23 %	2,53 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,02 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

AVILA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA NORTE	72,22 %	108	25,00 %	34,62 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	42,86 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	48	89,58 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	43	60,47 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	113	72,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	31,76 %	35,29 %	17,65 %	1,18 %	5,88 %	8,24 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

AVILA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA RURAL	75,32 %	77	36,36 %	48,28 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	29	75,86 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	44	70,45 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	81	75,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA RURAL	43,75 %	20,31 %	9,38 %	1,56 %	1,56 %	7,81 %	15,63 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

AVILA SUR ESTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR ESTE	67,52 %	157	14,65 %	21,70 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	87	68,97 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	51	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	163	67,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR ESTE	20,54 %	42,86 %	14,29 %	3,57 %	10,71 %	8,04 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

AVILA SUR OESTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR OESTE	74,00 %	150	26,67 %	36,04 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	91	74,73 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	25,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	57,14 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	45	73,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	155	74,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR OESTE	32,79 %	0,82 %	24,59 %	16,39 %	9,84 %	11,48 %	4,10 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,02 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BABIA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BABIA	80,00 %	10	40,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	77,78 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	11	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BABIA	36,36 %	27,27 %	9,09 %	9,09 %	18,18 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

BALTANAS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BALTANAS	92,00 %	25	4,00 %	4,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	11	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	25	92,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BALTANAS	3,45 %	3,45 %	37,93 %	10,34 %	44,83 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BAÑEZA I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BAÑEZA I	76,92 %	104	21,15 %	27,50 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	57	84,21 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	45	64,44 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	106	76,92 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	25,58 %	18,60 %	1,16 %	16,28 %	2,33 %	16,28 %	4,65 %	15,12 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

BAÑEZA II				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BAÑEZA II	73,26 %	86	22,09 %	30,16 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	42	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	35	77,14 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	90	73,26 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	27,94 %	26,47 %	20,59 %	1,47 %	10,29 %	13,24 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BARCO DE AVILA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARCO DE AVILA	77,55 %	49	26,53 %	34,21 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	76,92 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	17	70,59 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	53	77,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	31,71 %	26,83 %	12,20 %	2,44 %	24,39 %	2,44 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BARRIO ESPAÑA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARRIO ESPAÑA	65,71 %	70	35,71 %	54,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	34	67,65 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	40,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	25	64,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	71	65,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARRIO ESPAÑA	53,19 %	12,77 %	8,51 %	4,26 %	10,64 %	10,64 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BEJAR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEJAR	68,87 %	151	25,83 %	37,50 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	16	93,75 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	63	79,37 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	40,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	40,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	66	56,06 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	155	68,87 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	33,05 %	33,05 %	12,71 %	10,17 %	11,02 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

BEORADO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEORADO	84,62 %	52	32,69 %	38,64 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	20	80,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	58,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	54	84,62 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEORADO	36,17 %	46,81 %	6,38 %	2,13 %	4,26 %	4,26 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BEMBIBRE			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEMBIBRE	70,12 %	164	21,34 %	30,43 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	78,57 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	65	58,46 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	83,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	85,71 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	76	73,68 %
TOTAL PACIENTES Sinusitis		168	70,12 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEMBIBRE	28,69 %	40,16 %	3,28 %	8,20 %	11,48 %	8,20 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BENAVENTE NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE NORTE	72,38 %	105	26,67 %	36,84 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	51	74,51 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	63,64 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	33	63,64 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	107	72,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE NORTE	34,57 %	27,16 %	1,23 %	8,64 %	1,23 %	16,05 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BENAVENTE SUR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE SUR	71,43 %	161	23,60 %	33,04 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	76	78,95 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	16	68,75 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	68	66,18 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	167	71,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BENAVENTE SUR	29,69 %	22,66 %	0,78 %	15,63 %	7,03 %	2,34 %	16,41 %	5,47 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

BERLANGA DE DUERO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BERLANGA DE DUERO	90,91 %	11	27,27 %	30,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	7	85,71 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	4	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	11	90,91 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BERLANGA DE DUERO	25,00 %	33,33 %	16,67 %	8,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

BOÑAR			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BOÑAR	65,22 %	23	21,74 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	77,78 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	24	65,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BOÑAR	29,41 %	47,06 %	5,88 %	11,76 %	5,88 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

BRIVIESCA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BRIVIESCA	64,52 %	62	14,52 %	22,50 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	31	67,74 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	10	70,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	19	57,89 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	64	64,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	20,45 %	36,36 %	2,27 %	2,27 %	15,91 %	22,73 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

BURGO DE OSMA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGO DE OSMA	68,52 %	54	16,67 %	24,32 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	58,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	29	72,41 %
TOTAL PACIENTES Sinusitis		55	68,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
BURGO DE OSMA	21,43 %	26,19 %	35,71 %	9,52 %	4,76 %	2,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %

BURGOHONDO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOHONDO	60,78 %	51	9,80 %	16,13 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	21	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	24	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	52	60,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	15,63 %	34,38 %	6,25 %	34,38 %	9,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

BURGOS RURAL NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOS RURAL NORTE	68,18 %	88	25,00 %	36,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	38	68,42 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	57,14 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	33	72,73 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	88	68,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL NORTE	33,33 %	22,73 %	4,55 %	12,12 %	15,15 %	12,12 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

BURGOS RURAL SUR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOS RURAL SUR	69,77 %	86	10,47 %	15,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	90,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	30	73,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	36	61,11 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	87	69,77 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL SUR	14,06 %	45,31 %	7,81 %	9,38 %	7,81 %	15,63 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CACABELOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CACABELOS	65,14 %	175	6,29 %	9,65 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	42,86 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	45	55,56 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	105	70,48 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	181	65,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CACABELOS	8,53 %	26,36 %	5,43 %	14,73 %	0,78 %	16,28 %	27,91 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

CALZADA DE VALDUNCIEL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CALZADA DE VALDUNCIEL	57,14 %	28		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	63,64 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	58,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	29	57,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CALZADA DE VALDUNCIEL	11,11 %	16,67 %	38,89 %	27,78 %	5,56 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CAMARZANA DE TERA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMARZANA DE TERA	58,33 %	24	8,33 %	14,29 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	10	70,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	24	58,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMARZANA DE TERA	13,33 %	26,67 %	20,00 %	26,67 %	13,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

CAMPOS LAMPREANA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMPOS LAMPREANA	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	12	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMPOS LAMPREANA	25,00 %	37,50 %	12,50 %	25,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	12,02 %

CANALEJAS-SANCTI SPIRI				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	76,92 %	78	23,08 %	30,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	33	84,85 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	40,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	35	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	82	76,92 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	27,27 %	46,97 %	3,03 %	7,58 %	10,61 %	4,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CANDELEDA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANDELEDA	74,24 %	66	40,91 %	55,10 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	13	61,54 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	44	77,27 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	69	74,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	52,94 %	9,80 %	25,49 %	1,96 %	5,88 %	3,92 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

CANTALAPIEDRA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis						
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico									
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALAPIEDRA	64,29 %	14	7,14 %	11,11 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	14	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALAPIEDRA	11,11 %	33,33 %	11,11 %	33,33 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

CANTALEJO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALEJO	78,65 %	89	39,33 %	50,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	49	85,71 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	32	65,63 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	95	78,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALEJO	45,45 %	25,97 %	1,30 %	1,30 %	18,18 %	7,79 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

CANTERAC			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTERAC	62,07 %	58	15,52 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	69,23 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	20,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	24	58,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	61	62,07 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTERAC	21,95 %	26,83 %	9,76 %	9,76 %	4,88 %	21,95 %	2,44 %	2,44 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

CAPUCHINOS			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAPUCHINOS	60,20 %	98	10,20 %	16,95 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	46	41,30 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	33,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	40	80,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	100	60,20 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAPUCHINOS	16,67 %	36,67 %	31,67 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CARBAJALES DE ALBA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBAJALES DE ALBA	28,57 %	7		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	7	28,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBAJALES DE ALBA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	31,30 %	12,02 %

CARBALLEDA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBALLEDA	69,23 %	13	23,08 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	40,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	14	69,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	12,02 %

CARBONERO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBONERO	77,24 %	145	31,03 %	40,18 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	24	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	76	68,42 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	88,89 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	15	86,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	77,42 %
TOTAL PACIENTES Sinusitis		155	77,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	0,81 %	36,29 %	37,90 %	9,68 %	7,26 %	8,06 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

CARRION DE LOS CONDES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARRION DE LOS CONDES	70,00 %	50	26,00 %	37,14 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	17	58,82 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	40,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	81,82 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	52	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARRION DE LOS CONDES	35,14 %	29,73 %	16,22 %	18,92 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

CASA DEL BARCO	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CASA DEL BARCO	61,36 %	132	28,03 %	45,68 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	15	86,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	52	67,31 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	62	48,39 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	137	61,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CASA DEL BARCO	1,11 %	41,11 %	22,22 %	3,33 %	1,11 %	14,44 %	16,67 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CEBREROS			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CEBREROS	61,67 %	60	33,33 %	54,05 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	35	65,71 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	21	42,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	61	61,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CEBREROS	51,28 %	15,38 %	2,56 %	25,64 %	5,13 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

CENTRO-GAMAZO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CENTRO-GAMAZO	66,95 %	118	16,95 %	25,32 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	58	68,97 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	47	59,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	119	66,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CENTRO-GAMAZO	23,26 %	33,72 %	8,14 %	3,49 %	17,44 %	1,16 %	12,79 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

CERVERA DE PISUERGA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CERVERA DE PISUERGA	81,58 %	38	31,58 %	38,71 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	13	76,92 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	20	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	39	81,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CERVERA DE PISUERGA	35,29 %	23,53 %	38,24 %	2,94 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

CIGALES	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIGALES	51,67 %	60	21,67 %	41,94 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	27	59,26 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	29	44,83 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	60	51,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIGALES	40,63 %	21,88 %	6,25 %	3,13 %	12,50 %	15,63 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CIRCULAR	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCULAR	53,54 %	99	9,09 %	16,98 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	42,86 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	44	70,45 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	45	37,78 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	101	53,54 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	16,36 %	27,27 %	16,36 %	3,64 %	23,64 %	1,82 %	10,91 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

CIRCUNVALACION				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCUNVALACION	54,05 %	148	25,00 %	46,25 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	74	63,51 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	36,36 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	8	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	47	36,17 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	149	54,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCUNVALACION	44,05 %	33,33 %	3,57 %	2,38 %	13,10 %	1,19 %	2,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

CISTIERNA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CISTIERNA	48,15 %	54	18,52 %	38,46 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	33,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	35	48,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	56	48,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CISTIERNA	35,71 %	35,71 %	3,57 %	7,14 %	10,71 %	7,14 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CIUDAD RODRIGO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIUDAD RODRIGO	73,10 %	145	20,69 %	28,30 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	90,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	71	64,79 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	75,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	25,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	66	74,24 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	156	73,10 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIUDAD RODRIGO	25,00 %	44,17 %	8,33 %	7,50 %	10,83 %	4,17 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CONDADO DE TREVIÑO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDADO DE TREVIÑO	83,33 %	24	8,33 %	10,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	8	62,50 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	13	92,31 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	24	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
CONDADO DE TREVIÑO	9,52 %	80,95 %	4,76 %	4,76 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

CONDESA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDESA	71,91 %	178	12,92 %	17,97 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	12	91,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	47	68,09 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	75,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	33,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	111	72,07 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	182	71,91 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDESA	16,55 %	33,09 %	12,95 %	9,35 %	1,44 %	5,04 %	0,72 %	20,86 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

CORRALES			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CORRALES	84,62 %	26	15,38 %	18,18 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	90,91 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	11	81,82 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	26	84,62 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CORRALES	16,00 %	48,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

CRISTOBAL ACOSTA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRISTOBAL ACOSTA	74,78 %	115	15,65 %	20,93 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	72,73 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	41	78,05 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	8	87,50 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	52	67,31 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	118	74,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRISTOBAL ACOSTA	18,95 %	35,79 %	11,58 %	13,68 %	8,42 %	11,58 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CRUCERO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRUCERO	74,76 %	103	24,27 %	32,47 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	54	75,93 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	42,86 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	39	76,92 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	103	74,76 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	31,25 %	30,00 %	16,25 %	2,50 %	11,25 %	8,75 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CUELLAR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUELLAR	72,59 %	135	9,63 %	13,27 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	64	70,31 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	63,64 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	44	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	136	72,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	1,96 %	12,75 %	38,24 %	28,43 %	1,96 %	8,82 %	7,84 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

CUENCA DEL BERNESGA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUENCA DEL BERNESGA	83,19 %	119	25,21 %	30,30 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	16	87,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	55	78,18 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	11	90,91 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	42	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	126	83,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUENCA DEL BERNESGA	26,55 %	21,24 %	0,88 %	5,31 %	16,81 %	29,20 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

DELICIAS I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS I	65,85 %	284	15,85 %	24,06 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	23	73,91 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	90	63,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	62,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	4	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	161	63,35 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	291	65,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS I	22,50 %	38,50 %	0,50 %	7,00 %	1,50 %	20,50 %	1,00 %	8,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

DELICIAS II			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS II	63,16 %	133	18,05 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	77,78 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	41	78,05 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	12	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	25,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	33,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	70	57,14 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	139	63,16 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	26,09 %	33,70 %	3,26 %	3,26 %	15,22 %	1,09 %	17,39 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
DESCONOCIDO	33,33 %	3	33,33 %	100,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	3	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
DESCONOCIDO	100,00 %
TOTAL GAP	27,14 %

EL EJIDO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
EL EJIDO	75,88 %	170	20,59 %	27,13 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	12	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	72	79,17 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	82	70,73 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	177	75,88 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL EJIDO	24,48 %	34,27 %	15,38 %	1,40 %	0,70 %	8,39 %	15,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

EL ESPINAR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
EL ESPINAR	64,58 %	96	22,92 %	35,48 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	33,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	60	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	61,29 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	98	64,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL ESPINAR	32,84 %	34,33 %	5,97 %	8,96 %	7,46 %	1,49 %	8,96 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ERAS DEL BOSQUE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ERAS DEL BOSQUE	76,04 %	217	12,44 %	16,36 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	25	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	89	76,40 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	77,78 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	94	73,40 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	227	76,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ERAS DEL BOSQUE	15,17 %	42,70 %	4,49 %	9,55 %	10,67 %	16,85 %	0,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %	0,02 %

ESGUEVILLAS		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico									
Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESGUEVILLAS	87,50 %	8	25,00 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	9	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
ESGUEVILLAS	25,00 %	50,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %

ESPINOSA DE LOS MONTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	53,85 %	26		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	27	53,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	64,29 %	7,14 %	21,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

FABERO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FABERO	63,75 %	80	21,25 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	32	62,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	40	57,50 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	82	63,75 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	31,48 %	29,63 %	1,85 %	16,67 %	5,56 %	9,26 %	5,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

FONTIVEROS		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FONTIVEROS	71,43 %	28	21,43 %	30,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	10	90,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	28	71,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FONTIVEROS	28,57 %	42,86 %	14,29 %	4,76 %	9,52 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

FROMISTA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FROMISTA	78,57 %	28	10,71 %	13,64 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	7	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	64,29 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	30	78,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	13,04 %	34,78 %	4,35 %	21,74 %	26,09 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

FUENTEGUINALDO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico					
Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-08

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTEGUINALDO	60,00 %	5	20,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	5	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTEGUINALDO	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	9,82 %	12,02 %

FUENTESAUCO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTESAUCO	93,75 %	32	62,50 %	66,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	95,45 %
TOTAL PACIENTES Sinusitis		35	93,75 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
FUENTESAUCO	2,94 %	58,82 %	11,76 %	5,88 %	11,76 %	8,82 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %

FUENTES DE OÑORO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTES DE OÑORO	54,55 %	11	9,09 %	16,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	12	54,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTES DE OÑORO	16,67 %	33,33 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	12,02 %

GAMONAL-ANTIGUA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GAMONAL-ANTIGUA	66,67 %	165	27,27 %	40,91 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	70,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	98	69,39 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	50	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	167	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAMONAL-ANTIGUA	38,14 %	35,59 %	0,85 %	6,78 %	10,17 %	8,47 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GARCIA LORCA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARCIA LORCA	72,84 %	81	7,41 %	10,17 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	40	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	28	67,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	82	72,84 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARCIA LORCA	9,09 %	62,12 %	1,52 %	16,67 %	10,61 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GARRIDO NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO NORTE	55,71 %	140	14,29 %	25,64 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	66	59,09 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	57,14 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	59	47,46 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	143	55,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO NORTE	23,81 %	21,43 %	16,67 %	9,52 %	20,24 %	8,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GARRIDO SUR			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO SUR	52,20 %	205	13,66 %	26,17 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	16	68,75 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	89	53,93 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	14	35,71 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	84	47,62 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	213	52,20 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO SUR	24,14 %	38,79 %	11,21 %	3,45 %	12,93 %	9,48 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-04

2025-05

2025-08

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GOMARA	100,00 %	4	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	4	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GOMARA	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

GREDOS			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GREDOS	57,14 %	14	50,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	9	44,44 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	14	57,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
GREDOS	77,78 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %

GUARDO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUARDO	60,64 %	94	9,57 %	15,79 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	41	73,17 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	71,43 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	47	46,81 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	100	60,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUARDO	13,85 %	27,69 %	6,15 %	24,62 %	27,69 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GUAREÑA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUAREÑA	70,27 %	37	21,62 %	30,77 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	21	61,90 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	39	70,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	30,77 %	19,23 %	11,54 %	15,38 %	15,38 %	7,69 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

GUIJUELO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUIJUELO	70,59 %	119	8,40 %	11,90 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	78	74,36 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	37	62,16 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	125	70,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	10,10 %	21,21 %	33,33 %	7,07 %	6,06 %	22,22 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

HERRERA DE PISUERGA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
HERRERA DE PISUERGA	60,61 %	66	21,21 %	35,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	21	71,43 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	41	56,10 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	69	60,61 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HERRERA DE PISUERGA	2,38 %	33,33 %	30,95 %	21,43 %	4,76 %	7,14 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

HUERTA DEL REY				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DEL REY	63,18 %	258	19,38 %	30,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	17	76,47 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	127	65,35 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	22	68,18 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	70,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	87	51,72 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	264	63,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DEL REY	27,01 %	1,72 %	33,33 %	11,49 %	4,02 %	6,90 %	15,52 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

HUERTA DE REY			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DE REY	78,57 %	14	28,57 %	36,36 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	8	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	80,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	14	78,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DE REY	33,33 %	16,67 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
IGNACIO LOPEZ SAIZ	75,00 %	96	11,46 %	15,28 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	46	84,78 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	37,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	25	64,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	97	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	13,75 %	25,00 %	1,25 %	46,25 %	6,25 %	7,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ISCAR		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ISCAR	69,44 %	108	22,22 %	32,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	41	63,41 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	85,71 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	51	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	109	69,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ISCAR	28,92 %	36,14 %	12,05 %	1,20 %	14,46 %	7,23 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

JARDINILLOS	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
JARDINILLOS	77,61 %	134	33,58 %	43,27 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	23	65,22 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	66	80,30 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	40,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	42	73,81 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	141	77,61 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JARDINILLOS	39,13 %	32,17 %	2,61 %	2,61 %	13,91 %	9,57 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

JOSE AGUADO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSE AGUADO	81,48 %	243	13,58 %	16,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	17	88,24 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	82	84,15 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	134	80,60 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	246	81,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSE AGUADO	15,64 %	33,65 %	13,74 %	4,74 %	14,69 %	17,54 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

JOSÉ LUIS SANTAMARIA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	73,08 %	156	21,79 %	29,82 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	70,49 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	10	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	17	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	62	64,52 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	159	73,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	27,20 %	38,40 %	8,00 %	6,40 %	12,80 %	7,20 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LA ALAMEDILLA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA ALAMEDILLA	67,07 %	164	25,00 %	37,27 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	69	71,01 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	79	62,03 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	168	67,07 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALAMEDILLA	31,78 %	34,88 %	6,20 %	3,10 %	17,83 %	6,20 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LA ALBERCA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA ALBERCA	65,22 %	23	17,39 %	26,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	17	70,59 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	23	65,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	21,05 %	36,84 %	21,05 %	5,26 %	5,26 %	10,53 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LA CABRERA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico						
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA CABRERA	66,67 %	6		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	4	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	6	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA CABRERA	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	31,30 %	13,38 %	12,02 %

LA FUENTE SAN ESTEBAN				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA FUENTE SAN ESTEBAN	77,78 %	18	16,67 %	21,43 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	25,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8	87,50 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	18	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LA FUENTE SAN ESTEBAN	21,43 %	42,86 %	28,57 %	7,14 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %

LAGUNA DE DUERO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAGUNA DE DUERO	63,08 %	260	24,23 %	38,41 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	24	87,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	95	61,05 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	13	46,15 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	12	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	127	59,84 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	272	63,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAGUNA DE DUERO	2,13 %	33,51 %	30,32 %	10,64 %	4,79 %	9,57 %	0,53 %	8,51 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

LA MAGDALENA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA MAGDALENA	89,66 %	29	34,48 %	38,46 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	85,71 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	80,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	31	89,66 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	38,46 %	42,31 %	3,85 %	3,85 %	11,54 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

LANZAHITA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LANZAHITA	66,67 %	27	11,11 %	16,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	22	68,18 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	28	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LANZAHITA	16,67 %	5,56 %	72,22 %	5,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %

LA PALOMERA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PALOMERA	68,48 %	257	19,84 %	28,98 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	26	80,77 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	107	73,83 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	15	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	103	61,17 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	261	68,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PALOMERA	26,15 %	19,49 %	13,33 %	8,72 %	13,85 %	0,51 %	17,95 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

LA PUEBLA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PUEBLA	70,48 %	210	15,24 %	21,62 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	19	63,16 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	89	75,28 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	12	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	14	92,86 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	83	63,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	219	70,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PUEBLA	19,88 %	40,37 %	9,32 %	10,56 %	4,97 %	14,91 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LAS HUELGAS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS HUEL GAS	73,96 %	96	27,08 %	36,62 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	52	78,85 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	36	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	98	73,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUEL GAS	34,67 %	37,33 %	1,33 %	9,33 %	10,67 %	6,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LA SIERRA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA SIERRA	81,25 %	32	28,13 %	34,62 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	16	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	32	81,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
LA SIERRA	32,14 %	53,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %

LAS NAVAS DEL MARQUE!				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS NAVAS DEL MARQUES	69,44 %	108	38,89 %	56,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	72,13 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	25,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	44	68,18 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	112	69,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS NAVAS DEL MARQUES	51,22 %	14,63 %	2,44 %	9,76 %	2,44 %	10,98 %	8,54 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LAS TORRES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS TORRES	78,95 %	114	39,47 %	50,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	13	84,62 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	70	85,71 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	62,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	23	60,87 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	119	78,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	45,83 %	1,04 %	29,17 %	3,13 %	4,17 %	3,13 %	13,54 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LA VICTORIA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA VICTORIA	65,19 %	135	28,89 %	44,32 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	21	76,19 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	65,57 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	55,56 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	42	52,38 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	141	65,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	40,63 %	21,88 %	5,21 %	6,25 %	8,33 %	1,04 %	16,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

LEDESMA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LEDESMA	48,15 %	27	7,41 %	15,38 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	17	41,18 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	28	48,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
LEDESMA	15,38 %	38,46 %	7,69 %	38,46 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

LERMA	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LERMA	72,73 %	55	3,64 %	5,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	10	50,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	28	78,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	57	72,73 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	4,65 %	39,53 %	6,98 %	39,53 %	9,30 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LINARES DE RIOFRIO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LINARES DE RIOFRIO	70,00 %	20	10,00 %	14,29 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	64,29 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	20	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LINARES DE RIOFRIO	14,29 %	50,00 %	7,14 %	21,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LOS COMUNEROS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS COMUNEROS	62,40 %	125	15,20 %	24,36 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	60,66 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	75,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	7	71,43 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	47	59,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	126	62,40 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS COMUNEROS	21,35 %	32,58 %	4,49 %	5,62 %	17,98 %	17,98 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

LOS CUBOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS CUBOS	74,05 %	131	26,72 %	36,08 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	12	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	49	79,59 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	14	57,14 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	13	84,62 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	67,39 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	135	74,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	31,82 %	32,73 %	2,73 %	9,09 %	8,18 %	0,91 %	14,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

LUMBRALES	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
LUMBRALES	57,89 %	19	10,53 %	18,18 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	7	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	11	45,45 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	21	57,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
LUMBRALES	14,29 %	42,86 %	21,43 %	21,43 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

MADRIGAL ALTAS TORRE!			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico							
Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MADRIGAL ALTAS TORRES	77,78 %	9	66,67 %	85,71 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	83,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	9	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
MADRIGAL ALTAS TORRES	85,71 %	14,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	9,82 %

MAGDALENA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAGDALENA	70,27 %	74	47,30 %	67,31 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	42	71,43 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	59,09 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	75	70,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAGDALENA	57,63 %	1,69 %	13,56 %	5,08 %	16,95 %	5,08 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MANSILLA DE LAS MULAS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MANSILLA DE LAS MULAS	76,27 %	59	3,39 %	4,44 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	42	76,19 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	15	80,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	60	76,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MANSILLA DE LAS MULAS	3,70 %	29,63 %	5,56 %	16,67 %	20,37 %	24,07 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MATALLANA DE TORIO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MATALLANA DE TORIO	63,64 %	22	18,18 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	9	55,56 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	24	63,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATALLANA DE TORIO	21,05 %	31,58 %	5,26 %	5,26 %	36,84 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MATILLA DE LOS CAÑOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01								
MATILLA DE LOS CAÑOS	89,66 %	29	6,90 %	7,69 %								
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %								

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	10	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	92,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	30	89,66 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	7,41 %	7,41 %	18,52 %	7,41 %	55,56 %	3,70 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MAYORGA DE CAMPOS		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico					
Año y mes núm.	2025-06	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAYORGA DE CAMPOS	77,78 %	9	11,11 %	14,29 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	9	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAYORGA DE CAMPOS	14,29 %	14,29 %	28,57 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

MEDINA DEL CAMPO RURA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DEL CAMPO RURAL	67,29 %	107	18,69 %	27,78 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	90,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	56	69,64 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	38	52,63 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	113	67,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	24,39 %	29,27 %	12,20 %	1,22 %	1,22 %	21,95 %	2,44 %	7,32 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

MEDINA DEL CAMPO URBANO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DEL CAMPO URBANO	67,11 %	301	29,57 %	44,06 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	28	82,14 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	182	70,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	12	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	14	64,29 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	77	54,55 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	313	67,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,44 %	39,38 %	26,55 %	0,44 %	6,19 %	0,44 %	16,81 %	9,73 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MEDINA DE POMAR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE POMAR	69,35 %	62	25,81 %	37,21 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	80,77 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	58,06 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	62	69,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE POMAR	2,22 %	35,56 %	22,22 %	6,67 %	2,22 %	17,78 %	13,33 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MEDINA DE RIOSECO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE RIOSECO	39,24 %	79	16,46 %	41,94 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	37	40,54 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	20,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	32	37,50 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	81	39,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE RIOSECO	36,11 %	38,89 %	5,56 %	5,56 %	8,33 %	2,78 %	2,78 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

MELGAR DE FERNAMENTA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MELGAR DE FERNAMENTAL	67,74 %	31	22,58 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	15	60,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	11	81,82 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	31	67,74 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTAL	33,33 %	23,81 %	38,10 %	4,76 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

MIGUEL ARMIJO			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIGUEL ARMIJO	68,15 %	135	23,70 %	34,78 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	40,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	71	70,42 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	59	67,80 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	144	68,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIGUEL ARMIJO	29,63 %	37,04 %	6,48 %	4,63 %	7,41 %	14,81 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

MIRANDA DEL CASTAÑAR			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR	63,64 %	11		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	20,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	11	63,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	62,50 %	12,50 %	25,00 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	13,38 %

MIRANDA ESTE	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA ESTE	67,83 %	286	31,12 %	45,88 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	15	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	144	70,83 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	15	46,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	60,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	109	66,06 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	295	67,83 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA ESTE	41,20 %	34,72 %	0,46 %	6,02 %	1,39 %	0,46 %	11,11 %	0,46 %	4,17 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

MIRANDA OESTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA OESTE	74,46 %	372	31,99 %	42,96 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	19	94,74 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	197	77,66 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	25	76,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	35	48,57 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	110	67,27 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	387	74,46 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA OESTE	38,51 %	24,92 %	9,71 %	7,12 %	0,32 %	13,59 %	5,83 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

MOMBELTRAN		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOMBELTRAN	59,09 %	22	9,09 %	15,38 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	13	53,85 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	22	59,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
MOMBELTRAN	15,38 %	53,85 %	15,38 %	15,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %

MOTA DEL MARQUES		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis							
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico									
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-11

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOTA DEL MARQUES	66,67 %	9	11,11 %	16,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	9	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	11,11 %	33,33 %	22,22 %	22,22 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

MUÑANA	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑANA	55,00 %	20	35,00 %	63,64 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	72,73 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	20	55,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑANA	53,85 %	30,77 %	15,38 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	12,02 %

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-01

2025-03

2025-06

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑICO	66,67 %	3		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	3	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MUÑICO	100,00 %
TOTAL GAP	31,30 %

NAVA DE LA ASUNCION				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
NAVA DE LA ASUNCION	73,33 %	135	25,19 %	34,34 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	55,56 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	82	75,61 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	42	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	141	73,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
NAVA DE LA ASUNCION	29,57 %	29,57 %	5,22 %	9,57 %	14,78 %	11,30 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

OLMEDO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
OLMEDO	79,55 %	44	22,73 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	84,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	75,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	46	79,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	25,00 %	35,00 %	20,00 %	2,50 %	2,50 %	15,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

OLVEGA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
OLVEGA	70,21 %	47	38,30 %	54,55 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	31	70,97 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	14	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	49	70,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	47,37 %	26,32 %	2,63 %	2,63 %	15,79 %	5,26 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

OSORNO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis						
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico								
Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
OSORNO	83,33 %	12	25,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	12	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
OSORNO	30,00 %	40,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %

PALENCIA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PALENCIA RURAL	75,00 %	52	28,85 %	38,46 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	85,71 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	20	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	55	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PALENCIA RURAL	34,88 %	11,63 %	2,33 %	6,98 %	2,33 %	11,63 %	30,23 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

PAMPLIEGA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PAMPLIEGA	62,50 %	8		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	8	62,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	20,00 %	20,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	9,82 %	13,38 %	12,02 %

PARADA DE MOLINO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARADA DE MOLINO	75,35 %	142	13,38 %	17,76 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	75	74,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	58	72,41 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	145	75,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARADA DE MOLINO	16,96 %	13,39 %	11,61 %	5,36 %	37,50 %	0,89 %	14,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PAREDES DE NAVA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PAREDES DE NAVA	81,25 %	32	62,50 %	76,92 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	88,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	33	81,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	71,43 %	3,57 %	3,57 %	21,43 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	12,02 %

PARQUESOL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARQUESOL	58,13 %	289	17,30 %	29,76 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	78,57 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	151	53,64 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	18	38,89 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	106	63,21 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	294	58,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARQUESOL	28,00 %	0,57 %	29,14 %	0,57 %	2,86 %	5,14 %	17,14 %	0,57 %	16,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PEDROSILLO EL RALO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDROSILLO EL RALO	83,78 %	37	5,41 %	6,45 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	23	95,65 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	38	83,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	5,00 %	17,50 %	37,50 %	25,00 %	15,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

PEÑAFIEL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑAFIEL	68,12 %	69	17,39 %	25,53 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	24	54,17 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	35	71,43 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	72	68,12 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑAFIEL	25,00 %	20,83 %	6,25 %	2,08 %	16,67 %	2,08 %	27,08 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PEÑARANDA DE BRACAMONTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	78,18 %	55	20,00 %	25,58 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	20	80,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	8	87,50 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	68,18 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	57	78,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	22,00 %	28,00 %	18,00 %	22,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

PERIURBANA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA NORTE	71,58 %	190	15,79 %	22,06 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	62,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	103	64,08 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	69	86,96 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	199	71,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA NORTE	19,87 %	40,40 %	18,54 %	7,28 %	1,32 %	5,96 %	6,62 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

PERIURBANA SUR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA SUR	75,18 %	141	17,73 %	23,58 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	78	75,64 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	76,09 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	144	75,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PERIURBANA SUR	21,19 %	35,59 %	13,56 %	24,58 %	4,24 %	0,85 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %	0,02 %

PIEDRAHITA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIEDRAHITA	81,25 %	32	46,88 %	57,69 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	19	84,21 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	34	81,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIEDRAHITA	51,72 %	27,59 %	10,34 %	6,90 %	3,45 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

PILARICA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PILARICA	65,75 %	146	23,29 %	35,42 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	53	64,15 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	10	30,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	77	67,53 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	149	65,75 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	32,08 %	30,19 %	16,04 %	0,94 %	10,38 %	1,89 %	8,49 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PINARES-COVALEDA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINARES-COVALEDA	83,56 %	73	39,73 %	47,54 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	29	79,31 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	85,71 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	90,32 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	78	83,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINARES-COVALEDA	39,73 %	9,59 %	16,44 %	5,48 %	24,66 %	4,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PINTOR OLIVA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINTOR OLIVA	70,75 %	212	11,32 %	16,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	20	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	75	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	13	84,62 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	101	70,30 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	218	70,75 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	14,20 %	27,81 %	2,37 %	20,71 %	8,88 %	26,04 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PISUERGA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PISUERGA	66,53 %	239	22,59 %	33,96 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	72,73 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	130	76,15 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	44,44 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	12	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	82	48,78 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	245	66,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	32,93 %	34,15 %	6,10 %	19,51 %	0,61 %	6,71 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PIZARRALES			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIZARRALES	65,65 %	131	6,87 %	10,47 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	14	64,29 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	46	65,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	87,50 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	66	63,64 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	135	65,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIZARRALES	1,10 %	9,89 %	42,86 %	10,99 %	10,99 %	7,69 %	16,48 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PLAZA DEL EJERCITO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PLAZA DEL EJERCITO	57,86 %	159	31,45 %	54,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	21	57,14 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	80	67,50 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	20,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	44,44 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	49	46,94 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	166	57,86 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PLAZA DEL EJERCITO	1,04 %	52,08 %	25,00 %	5,21 %	7,29 %	3,13 %	6,25 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PONFERRADA I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA I	70,20 %	245	8,16 %	11,63 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	18	55,56 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	79	68,35 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	14	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	80,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	128	69,53 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	251	70,20 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA I	10,75 %	36,56 %	15,59 %	8,06 %	10,22 %	18,82 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PONFERRADA II				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA II	62,09 %	277	15,16 %	24,42 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	16	68,75 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	94	67,02 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	17	35,29 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	146	60,27 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	283	62,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA II	21,24 %	0,52 %	30,05 %	1,04 %	21,24 %	2,07 %	8,81 %	15,03 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PONFERRADA III				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA III	76,33 %	207	9,66 %	12,66 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	13	61,54 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	92	85,87 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	55,56 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	92	69,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	211	76,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA III	11,70 %	36,26 %	3,51 %	15,20 %	2,34 %	18,71 %	12,28 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PONFERRADA IV				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA IV	72,73 %	143	11,89 %	16,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	65	75,38 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	68	67,65 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	148	72,73 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA IV	15,60 %	45,87 %	1,83 %	10,09 %	12,84 %	13,76 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

PORTILLO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PORTILLO	66,36 %	107	18,69 %	28,17 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	88,89 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	44	70,45 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	43	60,47 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	111	66,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PORTILLO	25,00 %	1,32 %	40,79 %	10,53 %	1,32 %	9,21 %	1,32 %	10,53 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

PUEBLA DE SANABRIA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUEBLA DE SANABRIA	75,00 %	36	11,11 %	14,81 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	13	84,62 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	20	70,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	37	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	13,79 %	34,48 %	10,34 %	3,45 %	20,69 %	17,24 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

PUENTE DOMINGO FLOREZ				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUENTE DOMINGO FLOREZ	63,16 %	38	15,79 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	21	57,14 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	15	73,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	41	63,16 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	3,70 %	22,22 %	59,26 %	14,81 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	13,38 %

PUERTA NUEVA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUERTA NUEVA	63,80 %	163	15,34 %	24,04 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	17	82,35 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	89	70,79 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	42,86 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	70,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	43	44,19 %
TOTAL PACIENTES Sinusitis		166	63,80 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUERTA NUEVA	22,32 %	33,93 %	17,86 %	1,79 %	11,61 %	12,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

QUINTANAR DE LA SIERRA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
QUINTANAR DE LA SIERRA	82,05 %	39	20,51 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	10	80,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	27	81,48 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	40	82,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	21,62 %	21,62 %	5,41 %	2,70 %	35,14 %	2,70 %	10,81 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

RIÑO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIÑO	68,42 %	19	5,26 %	7,69 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	64,29 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	21	68,42 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIÑO	7,69 %	7,69 %	30,77 %	53,85 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	12,02 %

RIAZA	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIAZA	72,22 %	54	22,22 %	30,77 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	76,92 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	24	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	56	72,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	2,44 %	29,27 %	41,46 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	17,07 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

RIBERA DEL ESLA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ESLA	58,82 %	17		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	7	57,14 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	7	57,14 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	18	58,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
RIBERA DEL ESLA	50,00 %	20,00 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %

RIBERA DEL ORBIGO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ORBIGO	76,47 %	153	30,72 %	40,17 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	60	81,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	83,33 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	80	70,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	156	76,47 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ORBIGO	35,38 %	0,77 %	28,46 %	10,77 %	0,77 %	10,00 %	0,77 %	13,08 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

ROA	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROA	50,00 %	44	13,64 %	27,27 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	22	45,45 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	18	44,44 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	45	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	26,09 %	56,52 %	8,70 %	4,35 %	4,35 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

ROBLEDA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis						
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico								
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROBLEDA	87,50 %	8		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	8	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROBLEDA	50,00 %	25,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	12,02 %

RONDILLA I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA I	52,63 %	76	21,05 %	40,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	33,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	34	61,76 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	31	51,61 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	77	52,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA I	36,36 %	25,00 %	4,55 %	6,82 %	11,36 %	2,27 %	13,64 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

RONDILLA II				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA II	62,35 %	85	22,35 %	35,85 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	62,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	36	72,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	25,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	38	55,26 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	88	62,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA II	33,33 %	33,33 %	8,77 %	1,75 %	15,79 %	7,02 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SACRAMENIA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico						
Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-08	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SACRAMENIA	75,00 %	4	25,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	4	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
SACRAMENIA	25,00 %	50,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %

SAHAGUN			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAHAGUN	87,50 %	40	25,00 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	84,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	15	86,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	43	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	23,81 %	7,14 %	7,14 %	2,38 %	38,10 %	2,38 %	19,05 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SALAS DE LOS INFANTES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALAS DE LOS INFANTES	82,93 %	41	26,83 %	32,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	15	80,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	90,91 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	41	82,93 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALAS DE LOS INFANTES	30,56 %	38,89 %	2,78 %	2,78 %	13,89 %	5,56 %	5,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SALDAÑA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALDAÑA	60,00 %	45	22,22 %	37,04 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	50,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	18	72,22 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	46	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALDAÑA	37,04 %	33,33 %	7,41 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

SAN AGUSTIN				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN AGUSTIN	76,22 %	164	17,68 %	23,20 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	79	83,54 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	77,78 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	65	63,08 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	167	76,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
SAN AGUSTIN	19,85 %	1,47 %	35,29 %	13,24 %	5,15 %	0,74 %	13,97 %	9,56 %	0,74 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %	0,02 %

SAN ANDRES DEL RABANI				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ANDRES DEL RABANEDO	73,08 %	156	19,23 %	26,32 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	60	80,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	57,14 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	60,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	75	70,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	158	73,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABANEDO	24,39 %	34,96 %	7,32 %	6,50 %	6,50 %	20,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAN ESTEBAN DE GORMA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	81,08 %	37	27,03 %	33,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	78,57 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	38	81,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	3,03 %	30,30 %	33,33 %	9,09 %	6,06 %	6,06 %	12,12 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAN ILDEFONSO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ILDEFONSO	58,33 %	48	18,75 %	32,14 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	23	47,83 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	18	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	51	58,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ILDEFONSO	31,03 %	37,93 %	10,34 %	6,90 %	6,90 %	6,90 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAN JOSE			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JOSE	69,23 %	91	7,69 %	11,11 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	87,50 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	31	61,29 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	71,74 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	93	69,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	10,29 %	19,12 %	48,53 %	2,94 %	8,82 %	10,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAN JUAN			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JUAN	54,14 %	133	11,28 %	20,83 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	33,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	79	65,82 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	32,61 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	134	54,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JUAN	20,27 %	27,03 %	12,16 %	2,70 %	17,57 %	20,27 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAN LEONARDO DE YAGU				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN LEONARDO DE YAGUE	71,79 %	39	23,08 %	32,14 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	8	50,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	24	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	40	71,79 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGUE	30,00 %	26,67 %	3,33 %	10,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

SAN PABLO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PABLO	64,81 %	108	19,44 %	30,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	12	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	66	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	57,14 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	19	47,37 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	109	64,81 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	26,25 %	31,25 %	3,75 %	18,75 %	12,50 %	1,25 %	6,25 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SAN PEDRO DEL ARROYO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO DEL ARROYO	58,33 %	12	16,67 %	28,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	7	57,14 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	13	58,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
SAN PEDRO DEL ARROYO	28,57 %	57,14 %	14,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %

SAN PEDRO MANRIQUE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO MANRIQUE	64,29 %	14		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	77,78 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	14	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
SAN PEDRO MANRIQUE	36,36 %	45,45 %	9,09 %	9,09 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %

SANTA CLARA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA CLARA	74,38 %	121	9,92 %	13,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	72,73 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	38	81,58 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	8	87,50 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	8	87,50 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	55	65,45 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	121	74,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA CLARA	12,24 %	38,78 %	6,12 %	16,33 %	7,14 %	19,39 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SANTA ELENA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA ELENA	68,52 %	108	25,93 %	37,84 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	90,91 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	61	75,41 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	29	44,83 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	110	68,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA ELENA	35,00 %	28,75 %	6,25 %	11,25 %	8,75 %	1,25 %	8,75 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SANTA MARIA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARIA	65,56 %	90	22,22 %	33,90 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	39	43,59 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	80,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	36	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	90	65,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARIA	31,25 %	12,50 %	12,50 %	17,19 %	18,75 %	7,81 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SANTA MARTA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARTA	72,78 %	158	13,29 %	18,26 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	79	70,89 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	62	75,81 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	162	72,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARTA	16,00 %	0,80 %	32,80 %	12,00 %	4,00 %	8,80 %	25,60 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SAYAGO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAYAGO	52,17 %	23		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	33,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8	62,50 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	23	52,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAYAGO	69,23 %	15,38 %	7,69 %	7,69 %
TOTAL GAP	31,30 %	9,82 %	5,20 %	12,02 %

SEDANO		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico					
Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-08	2025-11	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEDANO	80,00 %	5	20,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	5	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
SEDANO	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

SEGOVIA I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA I	72,46 %	207	34,30 %	47,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	37	89,19 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	68	72,06 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	45,45 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	15	80,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	78	69,23 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	212	72,46 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	43,03 %	24,85 %	4,85 %	1,82 %	13,33 %	0,61 %	11,52 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SEGOVIA II			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA II	76,59 %	205	28,78 %	37,58 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	26	92,31 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	70	71,43 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	14	71,43 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	93	75,27 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	209	76,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA II	32,95 %	0,57 %	40,34 %	5,68 %	1,70 %	16,48 %	2,27 %
TOTAL GAP	27,14 %	0,08 %	31,30 %	9,82 %	0,20 %	13,38 %	12,02 %

SEGOVIA III				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA III	78,69 %	122	31,15 %	39,58 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	81,82 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	53	81,13 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	48	70,83 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	126	78,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA III	34,23 %	31,53 %	1,80 %	0,90 %	22,52 %	0,90 %	8,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SEGOVIA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA RURAL	76,15 %	239	25,94 %	34,07 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	27	85,19 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	79	77,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	9	88,89 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	11	81,82 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	120	68,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	248	76,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA RURAL	33,16 %	32,09 %	2,67 %	22,99 %	0,53 %	8,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SEPULVEDA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEPULVEDA	86,67 %	30	23,33 %	26,92 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	91,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	88,89 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	75,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	35	86,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	25,00 %	39,29 %	3,57 %	3,57 %	3,57 %	17,86 %	7,14 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SERRADA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SERRADA	50,00 %	38	15,79 %	31,58 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	66,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	25,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	16	31,25 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	40	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SERRADA	27,27 %	22,73 %	13,64 %	13,64 %	4,55 %	4,55 %	13,64 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

SORIA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA NORTE	60,12 %	163	23,93 %	39,80 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	83,33 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	63	61,90 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	80,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	88	53,41 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	167	60,12 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	37,86 %	26,21 %	12,62 %	6,80 %	11,65 %	4,85 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SORIA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA RURAL	63,64 %	99	26,26 %	41,27 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	50	56,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	75,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	37	64,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	101	63,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	37,14 %	22,86 %	15,71 %	5,71 %	11,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SORIA SUR			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA SUR	66,34 %	202	18,81 %	28,36 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	81,82 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	96	60,42 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	13	84,62 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	84	64,29 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	211	66,34 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA SUR	25,00 %	28,29 %	16,45 %	7,24 %	14,47 %	8,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SORIA TARDE			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA TARDE	72,73 %	33	42,42 %	58,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	50,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	24	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	34	72,73 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA TARDE	51,85 %	22,22 %	7,41 %	3,70 %	7,41 %	7,41 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SOTILLO DE LA ADRADA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SOTILLO DE LA ADRADA	65,15 %	66	21,21 %	32,56 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	71,43 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	36	77,78 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	25	48,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	69	65,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	29,79 %	40,43 %	6,38 %	2,13 %	12,77 %	8,51 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

SUR		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
SUR	55,92 %	245	25,31 %	45,26 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	80,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	152	59,21 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	36,36 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	100,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	71	43,66 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	251	55,92 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	40,52 %	22,88 %	0,65 %	8,50 %	2,61 %	13,73 %	11,11 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	0,17 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

TABARA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TABARA	66,67 %	12	16,67 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	4	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	13	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TABARA	20,00 %	20,00 %	50,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	12,02 %

TAMAMES		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TAMAMES	62,50 %	8	12,50 %	20,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	8	62,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
TAMAMES	12,50 %	50,00 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	0,44 %

TEJARES				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TEJARES	68,13 %	91	13,19 %	19,35 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	36	72,22 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	71,43 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	47	63,83 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	93	68,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TEJARES	17,91 %	41,79 %	2,99 %	10,45 %	16,42 %	10,45 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

TORDESILLAS			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORDESILLAS	71,68 %	113	24,78 %	34,57 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	90,91 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	37	86,49 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	11	45,45 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	53	60,38 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	117	71,68 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	2,35 %	32,94 %	23,53 %	5,88 %	7,06 %	11,76 %	16,47 %
TOTAL GAP	0,15 %	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

TORENO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORENO	72,00 %	25	32,00 %	44,44 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	64,29 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	60,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	7	85,71 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	28	72,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORENO	42,11 %	42,11 %	5,26 %	10,53 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %	12,02 %

TORO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORO	61,40 %	57	12,28 %	20,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	22	81,82 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	28	53,57 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	57	61,40 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORO	18,92 %	37,84 %	21,62 %	5,41 %	10,81 %	5,41 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

TORQUEMADA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico											
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORQUEMADA	50,00 %	18	27,78 %	55,56 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	45,45 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	40,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	19	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
TORQUEMADA	55,56 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	5,20 %	13,38 %

TORTOLA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORTOLA	64,29 %	112	27,68 %	43,06 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	9	55,56 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	41	75,61 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	88,89 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	48	54,17 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	112	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	41,33 %	21,33 %	4,00 %	5,33 %	1,33 %	18,67 %	1,33 %	6,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

TROBAJO DEL CAMINO - V				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	66,05 %	162	17,28 %	26,17 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	11	81,82 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	78	70,51 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	40,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	70	62,86 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	170	66,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	22,76 %	29,27 %	10,57 %	0,81 %	10,57 %	26,02 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

TUDELA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
TUDELA	45,05 %	91	5,49 %	12,20 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	7	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	40	45,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	7	14,29 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	9	44,44 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	30	40,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	94	45,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TUDELA	10,87 %	45,65 %	13,04 %	15,22 %	15,22 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

UNIVERSIDAD CENTRO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
UNIVERSIDAD CENTRO	69,79 %	96	16,67 %	23,88 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	39	74,36 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	46	67,39 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	96	69,79 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
UNIVERSIDAD CENTRO	21,92 %	28,77 %	8,22 %	15,07 %	9,59 %	16,44 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VALDERAS		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALDERAS	75,86 %	29	24,14 %	31,82 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	4	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	11	63,64 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	29	75,86 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALDERAS	24,14 %	24,14 %	13,79 %	6,90 %	20,69 %	10,34 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VALENCIA DE DON JUAN				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALENCIA DE DON JUAN	72,00 %	100	16,00 %	22,22 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	51	70,59 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	43	72,09 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	101	72,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALENCIA DE DON JUAN	19,75 %	12,35 %	3,70 %	9,88 %	16,05 %	2,47 %	35,80 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

VALLADOLID RURAL I				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL I	73,97 %	73	32,88 %	44,44 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	25	68,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	44	72,73 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	76	73,97 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL I	42,86 %	33,93 %	3,57 %	3,57 %	10,71 %	5,36 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VALLADOLID RURAL II				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL II	66,27 %	83	19,28 %	29,09 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	60,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	23	69,57 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	80,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	48	64,58 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	83	66,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL II	25,81 %	38,71 %	8,06 %	20,97 %	6,45 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

VALLE DE LOSA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico				
Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-09	

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE LOSA	100,00 %	3		
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	3	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
VALLE DE LOSA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	31,30 %	13,38 %

VALLE DE MENA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE MENA	64,29 %	28	3,57 %	5,56 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	55,56 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	16	68,75 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	28	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE MENA	5,00 %	50,00 %	5,00 %	15,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

VALLE DE TOBALINA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico							
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE TOBALINA	87,50 %	8	37,50 %	42,86 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	83,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	8	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLE DE TOBALINA	42,86 %	42,86 %	14,29 %
TOTAL GAP	27,14 %	9,82 %	13,38 %

VALLE DE VALDEBEZANA		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico					
Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-06		

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE VALDEBEZANA	66,67 %	3	33,33 %	50,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	3	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
VALLE DE VALDEBEZANA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	9,82 %

VENTA DE BAÑOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VENTA DE BAÑOS	65,43 %	81	20,99 %	32,08 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	45	64,44 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	5	60,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	19	52,63 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	83	65,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	28,81 %	32,20 %	3,39 %	1,69 %	18,64 %	1,69 %	13,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

VIDRIALES		Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico										
Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIDRIALES	76,47 %	17	11,76 %	15,38 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	1	
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	13	92,31 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	18	76,47 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIDRIALES	14,29 %	42,86 %	14,29 %	7,14 %	21,43 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

VILLABLINO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLABLINO	60,17 %	118	22,88 %	38,03 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	6	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	64	48,44 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	4	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	33,33 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	43	72,09 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	120	60,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLABLINO	35,53 %	26,32 %	5,26 %	1,32 %	5,26 %	15,79 %	1,32 %	9,21 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	0,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

VILLACASTIN	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLACASTIN	51,61 %	31	19,35 %	37,50 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	12	75,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	31	51,61 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLACASTIN	37,50 %	43,75 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	12,02 %

VILLADA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01								
VILLADA	61,90 %	21	4,76 %	7,69 %								
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %								

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	64,29 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	22	61,90 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	5,56 %	27,78 %	11,11 %	5,56 %	27,78 %	22,22 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VILLADIEGO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLADIEGO	66,67 %	18	5,56 %	8,33 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	14	64,29 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	18	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
VILLADIEGO	8,33 %	83,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %

VILLAFRANCA	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRANCA	74,36 %	78	5,13 %	6,90 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	5	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	17	82,35 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	6	33,33 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	4	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	49	73,47 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	81	74,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRANCA	6,45 %	17,74 %	4,84 %	8,06 %	6,45 %	56,45 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VILLAFRECHOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRECHOS	84,21 %	19	42,11 %	50,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	6	83,33 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	10	70,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	20	84,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
VILLAFRECHOS	44,44 %	16,67 %	22,22 %	16,67 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

VILLALON DE CAMPOS				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLALON DE CAMPOS	41,67 %	12	8,33 %	20,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	9	44,44 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	12	41,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
VILLALON DE CAMPOS	20,00 %	20,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %

VILLALPANDO	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLALPANDO	83,33 %	24	33,33 %	40,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	15	86,67 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	6	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	24	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
VILLALPANDO	40,00 %	30,00 %	15,00 %	15,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %

VILLAMURIEL	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAMURIEL	70,00 %	80	15,00 %	21,43 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	10	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	31	64,52 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	10	90,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	29	58,62 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	82	70,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAMURIEL	20,69 %	10,34 %	3,45 %	1,72 %	17,24 %	46,55 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

VILLARCAYO				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARCAYO	75,61 %	41	26,83 %	35,48 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	17	64,71 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	50,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	50,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	21	90,48 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	44	75,61 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARCAYO	30,56 %	50,00 %	5,56 %	8,33 %	5,56 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	13,38 %	12,02 %

VILLARRAMIEL				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARRAMIEL	46,67 %	15	20,00 %	42,86 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	2	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	2	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	8	25,00 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	18	46,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
VILLARRAMIEL	30,00 %	50,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	13,38 %

VILLORIA				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLORIA	63,89 %	36	11,11 %	17,39 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	16	25,00 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	2	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	3	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	12	91,67 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	41	63,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLORIA	12,50 %	21,88 %	21,88 %	3,13 %	6,25 %	18,75 %	15,63 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

VIRGEN CONCHA			Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIRGEN CONCHA	72,46 %	207	13,53 %	18,67 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	21	85,71 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	105	77,14 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	10	50,00 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	2	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	73	67,12 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	211	72,46 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIRGEN CONCHA	16,47 %	27,06 %	7,65 %	3,53 %	15,88 %	0,59 %	28,82 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	0,44 %	12,02 %

VITIGUDINO	Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
VITIGUDINO	67,92 %	53	16,98 %	25,00 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	66,67 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	32	65,63 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	1	100,00 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	66,67 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	13	69,23 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	55	67,92 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VITIGUDINO	21,43 %	35,71 %	9,52 %	2,38 %	26,19 %	4,76 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ZAMORA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ZAMORA NORTE	75,41 %	61	16,39 %	21,74 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	3	100,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	28	78,57 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	3	66,67 %
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	6	66,67 %
J32.2	J32.2 Sinusitis etmoidal crónica	1	
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	22	77,27 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	63	75,41 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA NORTE	19,23 %	40,38 %	11,54 %	13,46 %	9,62 %	5,77 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %

ZAMORA SUR				Indicadores PRAN por proceso: Sinusitis								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	% Pac Sinusitis J01	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04	% Pac Sinusitis J01CE y J01CA04 vs J01
ZAMORA SUR	64,29 %	70	14,29 %	22,22 %
TOTAL GAP	69,05 %	21.879	20,60 %	29,83 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Sinusitis	% Pac Sinusitis J01
J01.00	J01.00 Sinusitis maxilar aguda, no especificada	8	75,00 %
J01.90	J01.90 Sinusitis aguda, no especificada	26	57,69 %
J32.0	J32.0 Sinusitis crónica maxilar	5	
J32.1	J32.1 Sinusitis frontal crónica	1	100,00 %
J32.9	J32.9 Sinusitis crónica, no especificada	32	71,88 %
	TOTAL PACIENTES Sinusitis	72	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Sinusitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA SUR	20,41 %	20,41 %	8,16 %	6,12 %	24,49 %	20,41 %
TOTAL GAP	27,14 %	31,30 %	9,82 %	5,20 %	13,38 %	12,02 %