

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PG-4.2.4 Edición: i: 28/02/2023 Fecha: f: 18/03/2026 Pág.: 1 de 18
---	---	---

PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD
--

CONTROL DE MODIFICACIONES		
EDICIÓN	FECHA	MODIFICACIONES RESPECTO A LA REVISIÓN ANTERIOR
01	28-02-2023	Elaboración del documento.
02	08-02-2024	Actualización de datos de 2023
03	18-02-2025	Actualización de datos de 2024
04	18-03-2026	Actualización de datos de 2025

ELABORADO	REVISADO Y APROBADO
Fdo.: Dra. Teresa Nebreda ¹ , Dr. Gabriel A. March ¹ Cargo: ¹ Licenciado Especialista Fecha: 04/03/2023 18/03/2026	Fdo.: Dr. José M ^a Eiros Cargo: Jefe de Servicio Fecha: 04/03/2023 18/03/2026

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 2 de 18	
---	--	---	---

ÍNDICE

A. PRESENTACIÓN.....	3
B. PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS DE ITU EN PACIENTES DE PROCEDENCIA COMUNITARIA	4
B.1 <i>Escherichia coli</i>	4
B.2 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	6
B.3 <i>Proteus mirabilis</i>	6
C. MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS AISLADOS EN PACIENTES DE PROCEDENCIA COMUNITARIA	8
C.1 <i>Enterococcus faecalis</i> (todo tipo de muestras)	8
C.2 <i>Enterococcus faecium</i> (todo tipo de muestras).....	8
C.3 <i>Streptococcus agalactiae</i> (todo tipo de muestras).....	9
C.4 <i>Streptococcus pyogenes</i> (todo tipo de muestra y en exudado faríngeo).....	9
C.5 <i>Staphylococcus aureus</i> (todo del tipo de muestras).....	10
D. OTROS MICROORGANISMOS DE INTERÉS AISLADOS EN PACIENTES DE TODO EL ÁREA ESTE:	11
D.1 <i>Salmonella enterica</i>	11
D.2 <i>Yersinia enterocolitica</i>	11
D.3 <i>Campylobacter jejuni</i> y <i>Campylobacter coli</i> en heces.....	12
D.4 <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	12
E. OTROS MICROORGANISMOS DE INTERÉS AISLADOS EN PACIENTES DE TODO EL ÁREA ESTE Y COMUNITARIOS	13
E.1 <i>Haemophilus influenzae</i> (tracto respiratorio)	13
E.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (tracto respiratorio)	14
F. ANEXOS 1. PROA COMUNITARIO DEL ÁREA ESTE DE VALLADOLID.....	15
• GRAM NEGATIVOS: ORINA.....	15
• GRAM NEGATIVOS: OTRAS MUESTRAS	16
• GRAM POSITIVOS.....	17
• INDICADORES DE MULTIRRESISTENCIA	18

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 3 de 18	
---	---	---	---

A. PRESENTACIÓN

La asistencia sanitaria en la Comunidad tiene una importancia crucial en el uso prudente de los antibióticos ya que es en este ámbito asistencial donde se realiza la mayor parte del consumo antibiótico y la mayoría de los tratamientos pautados son empíricos.

El análisis de los resultados de sensibilidad antibiótica tiene gran utilidad para el tratamiento empírico de los pacientes infectados. En este informe se presentan los datos de sensibilidad antibiótica acumulada de las bacterias aisladas en muestras clínicas de pacientes ambulatorios del Área Este de Valladolid en el año 2025. Para ello, se han seguido las recomendaciones del Comité Español del Antibiograma (COESANT) y se han tenido en cuenta las modificaciones en las definiciones de las interpretaciones de las categorías clínicas publicadas en el año 2019 por el *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* (EUCAST).

Se pretende que este informe sea homogéneo a nivel nacional, permita la comparación entre centros y así poder realizar una adecuada vigilancia de la evolución de la sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos.

- Se incluyen:
 - Únicamente resultados validados.
 - Especies bacterianas con ≥ 30 aislados.
- Se eliminan resultados duplicados, incluyendo sólo el primer aislado de una especie por paciente, independientemente del sitio anatómico de recogida o perfil de sensibilidad antibiótica, **excepto** en aislados de un paciente en los que se ha observado diferencias en la sensibilidad en dos o más grupos de antibióticos.
- Se indica el porcentaje de sensibilidad (S+I)

>85 %
 50- 85 %
 < 50 %

Los microorganismos con la sensibilidad a un antibiótico >85 % se puede utilizar ese antibiótico para su tratamiento empírico. Si la sensibilidad esta entre el 50-85% sólo utilizar según indique en el antibiograma y los de < 50% no se deben utilizar

- La procedencia de las muestras: Muestras de origen extrahospitalario, incluyendo las Consultas Externas y excluyendo Urgencias (2023 - 2025), a excepción de:
 - Microorganismos de origen comunitario como *Salmonella* sp., *Campylobacter* sp., *Yersinia* sp., *Neisseria gonorrhoeae* y *Haemophilus influenzae* se han incluido muestras de todo el Área Este tanto hospitalarias como extrahospitalarias.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 4 de 18	
---	--	--	---

B. PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS DE ITU EN PACIENTES DE PROCEDENCIA COMUNITARIA

B.1 *Escherichia coli*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	N=2146	N=1546	N=1921	N= 2164	N=2048	N=2426	N=2231
Ampicilina/Amoxicilina	41	44	49	48	49	49	49
Amoxicilina clavulánico	84	87	83	85	91	86	85
Cefuroxima	86	85	89	88	89	89	87
Ceftriaxona/Cefotaxima	90	90	92	93	92	92	90
Ertapenem	100	100	100	99	-	99,8	99,9
Gentamicina	92	92	91	92	92	93	92
Tobramicina	89	91	90	91	-	91	90
Ciprofloxacino	71	70	75	75	77	78	76
Levofloxacino	71	70	75	75	77	78	76
Cotrimoxazol	72	72	77	77	76	75	74
Fosfomicina	94	94	94	95	94	95	92
Nitrofurantoína	99	98	99	98	98	98	99
BLEE (%)	10	10	8	7	7	8	10

En los años del 2023 al 2025 se ha incluido un aislado por paciente **excepto** en aislados de un paciente en los que se ha observado diferencias en la sensibilidad en dos o más grupos de antibióticos.

En 2025 el porcentaje de *E. coli* BLEE es del 10%. La sensibilidad a fluorquinolonas y a cotrimoxazol no se ha modificado en estos años, desaconsejándose para el tratamiento empírico de infecciones por *E. coli*.

Fosfomicina y nitrofurantoína siguen presentando excelente actividad como antiséptico urinario.

Proporción de cepas de <i>E. coli</i> sensibles (S+I) en ITU por edades y sexo						
Antibiótico	0-14 años		15-65 años		≥66 años	
	Niño	Niña	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
	N=11*	N=58	N=94	N=664	N=265	N=1139
	Nº de aislados (%) de cepas S+I					
Ampicilina/Amoxicilina	82	47	42	56	37	48
Amoxicilina clavulánico	82	89	72	89	71	87
Cefuroxima oral	100	93	79	94	76	86
Ceftriaxona/Cefotaxima	100	95	86	97	80	89
Gentamicina	91	86	91	94	86,3	92
Ciprofloxacino	100	98	77	87	53	73
Nitrofurantoína	100	100	99	99	98	98
Trimetoprim/Sulfametoxazol	100	75	75	80	63	72
Fosfomicina	100	98	92	95	87	90

Fosfomicina y nitrofurantoína presentan buena actividad frente a *E. coli* en todos los grupos de edad y sexo.

*El número de niños menores de 14 años (N= 11) hace que los datos de sensibilidad antibiótica no sean representativos.

>85 %
 50- 85 %
 < 50 %

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 6 de 18	
---	--	--	---

B.2 *Klebsiella pneumoniae*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I						
	2019 N=378	2020 N=260	2021 N=322	2022 N=383	2023 N=423	2024 N=537	2025 N=502
Ampicilina	R	R	R	R	R	R	R
Amoxicilina clavulánico	86	86	81	77	89	85	80
Cefuroxima	85	85	83	83	86	85	80
Ceftriaxona/ Cefotaxima	87	89	89	87	88	88	83
Ertapenem	94	96	93	95	-	97	98
Gentamicina	92	92	93	95	95	93	90
Tobramicina	90	90	91	94	-	92	88
Ciprofloxacino	84	85	83	83	87	88	85
Cotrimoxazol	88	91	91	88	87	85	80
Fosfomicina	65	68	67	71	-	-	-
Nitrofurantoína	R	R	R	R	R	R	-
BLEE (%)	10	9	11	12	11	12	17
Carbapenemasa (%)	6	4	7	5	1	2	1

En 2025 el porcentaje de BLEE ha aumentado con respecto a los años anteriores y el de carbapenemasas permanece estable.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 7 de 18	
---	--	---	---

B.3 *Proteus mirabilis*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I			
	2022 N=155	2023 N=193	2024 N=201	2025 N=233
Ampicilina	44	53	55	52
Amoxicilina clavulánico	88	94	94	93
Cefuroxima	94	95	89	82
Ceftriaxona/Cefotaxima	97	95	92	85
Ertapenem				100
Gentamicina	65	47	72	47
Ciprofloxacino	63	65	64	62
Cotrimoxazol	59	63	55	54

P. mirabilis presenta baja sensibilidad a ampicilina, gentamicina, fluorquinolonas y cotrimoxazol. La resistencia a Cefalosporinas de 2ª y 3ªG ha aumentado con respecto a los años previos (incremento de las cepas productoras de BLEEs).

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 8 de 18	
---	--	---	---

C. MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS AISLADOS EN PACIENTES DE PROCEDENCIA COMUNITARIA

C.1 *Enterococcus faecalis* (todo tipo de muestras)

Antibiótico	Proporción de cepas S + (I)		
	2023 N=409	2024 N=387	2025 N=500
Ampicilina	99	100	100
Vancomicina	100	100	100
Ciprofloxacino	74	74*	75**
Nitrofurantoína	99	99*	99**

* 2024: 327 ITU.

**2025: 449 ITU.

C. 2 *Enterococcus faecium* (todo tipo de muestras)

Antibiótico	Proporción de cepas S + (I)		
	2023 N=45	2024 N=37	2025 N=33
Ampicilina	24	20	19
Vancomicina	-	97	97
Ciprofloxacino	24	25	27*
Levofloxacino	24	25	27*

* 2025: 22 ITU.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 9 de 18	
---	---	---	---

C.3 *Streptococcus agalactiae* (todo tipo de muestras)

Antibiótico	Proporción de cepas S + (I)		
	2023 N=162	2024 N=252	2025 N=218
Penicilina	94	97	100
Eritromicina	53	56	53
Clindamicina	63	69	62
Nitrofurantoína	-	94*	94**

*2024: 71 ITU.

**2025: 95 ITU.

C.4 *Streptococcus pyogenes* (todo tipo de muestra y en exudado faríngeo)

Antibiótico	Proporción de cepas S + I				
	2023 N=119	2024 N=86	2024 Exudado faríngeo N=53	2025 N=51	2025 Exudado faríngeo N=20*
Penicilina	100	100	100	100	100
Eritromicina	91	93	98	86	94
Clindamicina	93	94	98	88	94

*En 2025 el número de *S. pyogenes* aislados en exudado faríngeo es inferior a 30, por los datos de sensibilidad antibiótica no son significativos.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 10 de 18	
---	--	---	---

C.5 *Staphylococcus aureus* (todo del tipo de muestras)

Antibiótico	Proporción de cepas S + I					
	2023		2024		2025	
	<i>S. aureus</i>	<i>S. aureus</i> meticilin resistentes	<i>S. aureus</i>	<i>S. aureus</i> meticilin resistentes	<i>S. aureus</i>	<i>S. aureus</i> meticilin resistentes
	N= 488	N= 71	N=430	N=87	N=557	N=82
Oxacilina	85	-	80	-	85	
Gentamicina	95	86	94	85	94	85
Eritromicina	71	45	68	45	65	38
Clindamicina	75	70	96	86	71	60
Ciprofloxacino /Levofloxacino	82	18	79	21	84	50
Cotrimoxazol	98	97	97	98	99	92
Mupirocina	93	86	94	90	90	75
Ácido fusídico	94	93	94	89	95	91

En el año 2025 el porcentaje de SARM fue del 15% igual al año 2023 e inferior a 2024.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 11 de 18	
---	---	--	---

D. OTROS MICROORGANISMOS DE INTERÉS AISLADOS EN PACIENTES DE TODO EL ÁREA ESTE:

D.1 *Salmonella enterica*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I				
	2021 N= 74	2022 N=65	2023* N=64	2024* N=69	2025* N=93
Ampicilina	59	41	69	65	63
Amoxicilina clavulánico	89	84	94	88	90
Ceftriaxona/Cefotaxima	100	100	100	100	100
Cotrimoxazol	93	97	92	96	88
Ciprofloxacino	83	90	89	93	91

*En 2023,2024 y 2025 los datos se refieren al total de pacientes con *S. enterica* aisladas **en heces**.

- En 2023 se incluyen *Salmonella enterica* serov. Enteritidis (25 aislados) y *Salmonella enterica* serov Typhimurium (39 aislados).
- En 2024 *Salmonella enterica* serov. Enteritidis (17 aislados) y *Salmonella enterica* serov Typhimurium (31 aislados), 21 pacientes con *Salmonella* sp.
- En 2025 *Salmonella enterica* serov. Enteritidis (16 aislados) y *Salmonella enterica* serov Typhimurium (45 aislados), 32 pacientes con *Salmonella* sp.

D.2 *Yersinia enterocolitica*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I		
	2021+2022+ 2023 N= 21+16+10	2024 N= 13	2025 N=14
Ceftriaxona/Cefotaxima	100	100	100
Cotrimoxazol	100	100	100
Ciprofloxacino	84	100	93

El número de cepas de *Y. enterocolitica* sigue siendo inferior a 30 por lo que los datos de sensibilidad antibiótica no son significativos. No obstante ceftriaxona/cefotaxima, ciprofloxacino y cotrimoxazol presentan una excelente actividad frente a *Salmonella* sp. y *Y. enterocolitica*.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 12 de 18	
---	--	---	---

D.3 *Campylobacter jejuni* y *Campylobacter coli* en heces

Antibiótico	<i>C. jejuni</i>					<i>C. coli</i>				
	Proporción de cepas S + I					Proporción de cepas S + I				
	2021 N=264	2022 N=191	2023 N=246	2024 N=286	2025 N=237	2021 N= 38	2022 N= 49	2023 N=23	2024 N=39	2025 N=43
Eritromicina	99	100	100	99	99	92	90	100	95	94
Tetraciclina	21	31	33	33	39	03	18	14	32	15
Ciprofloxacino	11	11	10	12	19	03	22	5	13	19

El número de aislados de *C. coli* en el 2023 es inferior a 30 por lo que los datos no son representativos, no obstante la sensibilidad es similar a años previos.

Campylobacter spp. presentan elevada resistencia a ciprofloxacino y tetraciclina.

D.4 *Neisseria gonorrhoeae*

Antibiótico	Proporción de cepas S + I				
	2021 N= 47	2022 N=54	2023 N=57	2024 N=46	2025 N=58
Penicilina	88	75	88	85	83
Ceftriaxona	100	100	100	100	100
Tetraciclina	29	22	21	7	10
Azitromicina	92	91	93	100	96
Ciprofloxacino	31	25	41	24	24

Comentario: En 2025 el número de cultivos de *N. gonorrhoeae* es superior a 2004 y similar a años previos. La sensibilidad a penicilina en el 2025 es menor que en años previos. No se han detectado cepas resistentes a ceftriaxona (tratamiento de elección). La sensibilidad a Azitromicina se mantiene elevada (punto ECOFF= 1).

Entre las **infecciones extragenitales** destacan en el 2023 dos conjuntivitis por *N. gonorrhoeae* y una salpingitis. En el 2024 una artritis y un absceso. En el año 2025 no ha habido aislamientos extragenitales.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 13 de 18	
---	--	---	---

PCR positivas a *N. gonorrhoeae*:

- En el 2023, 60 pacientes
- En el 2024, 73 muestras de 60 pacientes.
- **En el 2025, 111 muestras de 99 pacientes.**

E. OTROS MICROORGANISMOS DE INTERÉS AISLADOS EN PACIENTES DE TODO EL ÁREA ESTE Y COMUNITARIOS

E.1 *Haemophilus influenzae* (tracto respiratorio)

Antibiótico	Proporción de cepas S + I						
	2021	2022	2023	2024		2025	
	Todo el Área	Todo el Área	Comunitario	Comunitario	Todo el Área	Comunitario	Todo el Área
	N= 71	N=121	N=107	N=119	N=226	N=119	N=218
Ampicilina	78	74	76	85	80	79	77
Amoxicilina clavulánico V0	92	96	92	97	94	96	95
Cefotaxima	100	100	100	99	99	100	99
Tetraciclina/ Doxiciclina	99	100	85	90	87	86	86
Levofloxacino	95	92	98	96	97	96	95
Cotrimoxazol	76	85	81	88	85	84	81

Al ser la neumonía por *H. influenzae* de origen comunitario en los años 2021-2025 se indica la sensibilidad de este microorganismo en todo el Área independientemente del origen de los pacientes

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 14 de 18	
---	--	---	---

E.2 *Streptococcus pneumoniae* (tracto respiratorio)

Antibiótico	Proporción de cepas S + I						
	2021	2022	2023	2024		2025	
	Todo el área N= 26	Todo el área N=51	Comunitario N= 55	Comunitario N=34	Todo el área N=79	Comunitario N=31	Todo el área N=78
Penicilina	82	98	98	100	96	87	89
Cefotaxima	100	100	100	100	100	100	100
Eritromicina	71	54	73	57	67	65	70
Clindamicina	84	74	91	63	77	77	85
Levofloxacino	96	89	96	93	93	94	95
Cotrimoxazol	96	93	93	100	97	93	88

Penicilina mantiene una alta actividad frente a *S. pneumoniae*. No se ha detectado ninguna cepa resistente a cefalosporinas de 3ª generación. La sensibilidad a macrólidos y lincosamidas es superior al año 2024.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 15 de 18	
---	--	---	---

F. ANEXOS 1. PROA COMUNITARIO DEL ÁREA ESTE DE VALLADOLID

• GRAM NEGATIVOS: ORINA

	Nº	Ampicilina/Amoxicilina	Amoxicilina clavulánico	Cefuroxima oral	Cefotaxima/Ceftriaxona	Gentamicina	Ciprofloxacino	Levofloxacino	Nitrofurantoína	Trimetoprim/Sulfametoxazol	Fosfomicina
<i>E. coli</i>	2231	49	85	87	90	92	76	76	99	74	92
<i>E. coli</i> R C3 ^a G/ BLEE	221	-	64	-	-	72	19	19	91	41	73
<i>K. pneumoniae</i>	502	-	80	80	83	90	85	85	-	80	-
<i>K. pneumoniae</i> R C3 ^a G/ BLEE	84	-	25			50	33	33		17	-
<i>P. mirabilis</i>	233	52	93	82	85	47	62	62	-	54	-
<i>P. aeruginosa</i>	76	-	-	-	-	-	72	72	-	-	-
<i>E. cloacae</i> complex	72	-	-	-	83	100	96	96	-	94	-
<i>K. oxytoca</i>	68	-	94	97	100	99	97	97	-	91	-
<i>M. morganii</i>	59	-	-	-	97	88	71	71	-	80	-

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 16 de 18	
---	--	---	---

• **GRAM NEGATIVOS: OTRAS MUESTRAS**

	Nº	Penicilina	Amoxicilina/Ampicilina	Amoxicilina/A. clavulánico	Ceftriaxona/ cefotaxima	Ciprofloxacino	Levofloxacino	Trimetoprim/Sulfametoxazol	Eritromicina/Azitromicina
<i>Salmonella</i> Enteritidis* (Heces)	16								
<i>Salmonella</i> Typhimurium* (Heces)	45		41	88	100	98		80	
<i>Campylobacter jejuni</i> * (Heces)	237					19			99
<i>Campylobacter coli</i> * (Heces)	43					19			94
<i>Haemophilus influenzae</i> (Tracto respiratorio)	119		79	96	100		96	84	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> * (Todas)	58	83			100	24			96**

*Incluye aislamientos hospitalarios

**ECOFF

El número de pacientes con *Salmonella enterica* serov Enteritidis fue inferior a 30 por los que estos datos no son representativos de la sensibilidad de este microorganismo.

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 17 de 18	
---	--	---	---

• **GRAM POSITIVOS**

	Nº	Penicilina	Oxacilina/Cloxacilina	Amoxicilina/Ampicilina	Ceftriaxona/ cefotaxima	Gentamicina	Eritromicina	Clindamicina	Ciprofloxacino	Levofloxacino	Trimetoprim/Sulfametoxazol	Ácido Fusídico	Nitrofurantoína*
<i>S. aureus</i>	557		85			94	65	71	84	84	99	95	
<i>S. aureus</i> (SARM)	82					85	38	60	50	50	92	91	
<i>S. pneumoniae</i>	31	87			100		65	77		94	93		
<i>S. pyogenes</i>	51	100					86	88					
<i>S. agalactiae</i>	218	100					53	62					94*
<i>E. faecalis</i>	500			100					75	75			99*
<i>E. faecium</i>	33			19					27	27			

- **S. agalactiae* 95 ITU/*451 *E. faecalis* ITU

	PNT-20 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMOS MÁS HABITUALES EN LA COMUNIDAD. ÁREA ESTE. AÑO 2025	Código: PNT 0X MIC Edición: 01 Fecha: 04/03/2022 Pág.: 18 de 18	
---	--	---	---

• INDICADORES DE MULTIRRESISTENCIA

MICROORGANISMO	Muestra	Nº de aislados 2025	Nº de aislados resistentes 2025	% de aislados resistentes 2025	% de aislados resistentes 2024	% de aislados resistentes 2023
<i>E. coli</i> resistente a amoxicilina-clavulánico	Orina	2231	335	15	14	9
<i>E. coli</i> resistente a ciprofloxacino	Orina	2231	535	24	22	23
<i>E. coli</i> BLEE	Orina	2231	221	10	8	7
<i>E. coli</i> productor de carbapenemasa	Orina	2231	1	0,04	0,04	-
<i>Klebsiella pneumoniae</i> BLEE	Orina	502	84	17	12	11
<i>Klebsiella pneumoniae</i> productor de carbapenemasa	Orina	502	7	1	2	1
<i>Proteus mirabilis</i> BLEE	Orina	233	33	14	7	
<i>P. aeruginosa</i> resistente a quinolonas	Orina	76	21	28	34	33
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (SARM)	Todas	557	82	15	20	15
<i>Streptococcus pneumoniae</i> resistente a penicilina	Tracto respiratorio	31	4	13	0	3
<i>Streptococcus pneumoniae</i> resistente a cefalosporinas de 3ªG	Tracto respiratorio	31	0	0	0	0
<i>Streptococcus pyogenes</i> resistente a eritromicina	Tracto respiratorio	17	1	6	2	4
<i>Haemophilus influenzae</i> resistente a amoxicilina-clavulánico	Tracto respiratorio	119	5	4	3	8
<i>Salmonella</i> spp. resistente a ciprofloxacino	Heces	93	8	9	7	11