


Píldora inFormativa BIFAP

Impacto de las restricciones del uso de codeína en niños

- Un estudio* colaborativo europeo muestra que en España (BIFAP), en el periodo 2010-14 la prescripción de codeína como analgésico en menores de 12 años se redujo en un 84%

- Este descenso ya se ve desde antes de la publicación de la Nota de la AEMPS** que informaba de las medidas para restringir su uso en niños



*Hedenmalm et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2019;1–11. <https://doi.org/10.1002/pds.4836>

**AEMPS. Codeína: restricciones de uso como analgésico en pediatría.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NIMUH_FV_17-2013-codeina.htm.

Todo ello gracias a que :

Los médicos de Atención Primaria codifican de manera normalizada en la HCE del paciente el dolor como episodio diagnóstico y lo asocian a las prescripciones de codeína como indicación del tratamiento

La vinculación episodio-prescripción, no pudo realizarse en las otras bases de datos europeas, solo en BIFAP

Píldora inFormativa BIFAP

Y el registro del diagnóstico asociado a la prescripción de codeína en BIFAP indica...

que de 61.302 niños con prescripción de codeína:

- 1.923 (3,1%) tenían un episodio indicativo de dolor
- 55.612 (90,7%) tenían un episodio no relacionado con el dolor, casi todas indicaciones respiratorias
- **3.767 (6,1%) no tenían asociado un episodio diagnóstico de una indicación clínica válida**



Recordad la importancia de:

Asociar la prescripción al episodio diagnóstico correspondiente

Evitar incluir en un mismo episodio varios diagnósticos

Actualizar el descriptor del episodio si cambia el diagnóstico

Añadir otros términos en el diagnóstico solo si lo clarifican

Cerrar episodios y prescripciones si ya no se usan