

ACERCA DE SU TRATAMIENTO

Le han recetado Lixiana, un medicamento anticoagulante, que hace más fluida la sangre y ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre. Es importante que tome el medicamento siguiendo exactamente las instrucciones indicadas por su médico.

- Si se olvida tomar una dosis, tómela inmediatamente y continúe al día siguiente con la toma de la forma habitual. No tome una dosis doble en el mismo día.
- No comience a tomar ningún medicamento nuevo (incluidos

los obtenidos sin receta médica) sin consultar antes a su médico.

- No deje de tomar Lixiana sin consultar a su médico, ya que puede aumentar el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre.
- Lea el prospecto que se encuentra en el interior de cada caja de Lixiana.

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

RIESGO DE SANGRADO

La toma de un medicamento anticoagulante como Lixiana puede aumentar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, es importante estar alerta a los posibles signos y síntomas del sangrado y consultar a su médico **inmediatamente** si experimenta algún episodio de los siguientes:

- Moratones o sangrado debajo de la piel
- Sangre en la orina
- Sangre en la saliva al toser
- Sangre al vomitar o sustancia con aspecto de posos de café

- Sangrados nasales o cortes que tardan mucho en dejar de sangrar
- Heces de color negruzco
- Mareos o dolor de cabeza repentino
- Cansancio sin motivo aparente
- Sangrado vaginal anormal, incluidas las menstruaciones intensas o prolongadas

Informe a su médico si experimenta algún síntoma inusual.



ES 112981

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lixiana®

comprimidos recubiertos con película
edoxabán

Lleve siempre con usted esta tarjeta.

Enséñesela al médico, farmacéutico, especialista o dentista antes de recibir cualquier tratamiento médico o intervención.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del paciente:

.....

Fecha de nacimiento:

En caso de urgencia, póngase en contacto con:

Nombre:

Número de teléfono:

.....

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO

(A cumplimentar por el médico)

Se ha prescrito Lixiana a una dosis única diaria de:

Comenzar en: mg

/ (mes/año)

Grupo sanguíneo:

Otros medicamentos/otras afecciones:

.....

.....

.....

INFORMACIÓN SOBRE EL MÉDICO PRESCRIPTOR

Para obtener más información o en caso de urgencia, póngase en contacto con:

Nombre del médico:

.....

Número de teléfono, sello del consultorio médico:

Firma del médico:

.....

INFORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS

- Lixiana es un anticoagulante oral que inhibe el factor Xa.
- Cuando se precise una intervención quirúrgica invasiva, debe suspenderse la administración de Lixiana al menos 24 horas antes de dicha intervención, y se deben adoptar las precauciones oportunas.
- Lixiana puede aumentar el riesgo de sangrado. En caso de sangrado clínicamente significativo, se debe suspender el tratamiento inmediatamente.

- Las pruebas de coagulación como el INR, el tiempo de protrombina (TP) o el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) no son una medida útil para controlar el efecto de Lixiana. Sin embargo, un análisis anti-factor Xa calibrado puede ayudar a tomar decisiones clínicas informadas.

Consulte la ficha técnica o el resumen de las características del producto (RCP) para obtener más información.