

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gerencia AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GAP ÁVILA	75,19 %	1.600	60,56 %	80,55 %
GAP BURGOS	82,20 %	3.635	70,76 %	86,08 %
GAP LEÓN	81,66 %	2.727	71,62 %	87,70 %
GAP EL BIERZO	75,66 %	1.286	45,72 %	60,43 %
GAP PALENCIA	81,20 %	2.000	70,05 %	86,27 %
GAP SALAMANCA	82,98 %	3.602	72,07 %	86,85 %
GAP SEGOVIA	84,08 %	1.696	72,94 %	86,75 %
GAP SORIA	75,95 %	819	63,98 %	84,24 %
GAP VALLADOLID OESTE	82,05 %	3.220	73,94 %	90,12 %
GAP VALLADOLID ESTE	82,99 %	2.704	72,97 %	87,92 %
GAP ZAMORA	79,43 %	1.502	67,58 %	85,08 %
TOTAL GRS	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	95	78,95 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2.504	30,91 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1.850	82,97 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	308	83,77 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15.923	82,15 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3.134	88,99 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2.780	88,20 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	768	80,99 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	25	88,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	7	85,71 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	59	50,85 %
TOTAL PACIENTES Otitis		24.765	81,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM A, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAP ÁVILA		80,38 %	0,17 %	20,37 %	0,08 %	2,41 %	1,91 %	0,08 %	4,16 %	0,08 %	0,33 %
GAP BURGOS		85,91 %	0,17 %	21,32 %	0,07 %	1,31 %	1,47 %	0,13 %	3,95 %		0,03 %
GAP LEÓN		87,70 %		16,03 %	0,09 %	1,12 %	1,12 %	0,22 %	3,77 %	0,04 %	0,09 %
GAP EL BIERZO		60,43 %		33,30 %		2,77 %	12,13 %		4,32 %		
GAP PALENCIA		86,08 %	0,18 %	18,84 %		1,17 %	2,96 %	0,12 %	6,96 %		0,06 %
GAP SALAMANCA		86,82 %	0,03 %	20,14 %	0,30 %	4,08 %	2,71 %	0,10 %	2,01 %		0,03 %
GAP SEGOVIA		86,75 %		18,51 %		1,89 %	1,61 %	0,42 %	3,86 %		
GAP SORIA		84,24 %		20,42 %		1,77 %	1,93 %	0,16 %	2,73 %		
GAP VALLADOLID OESTE	0,04 %	90,12 %		14,23 %		1,21 %	2,42 %	0,11 %	3,29 %		
GAP VALLADOLID ESTE		87,92 %		17,74 %	0,09 %	1,25 %	0,98 %	0,09 %	5,17 %		0,04 %
GAP ZAMORA		85,16 %		18,44 %		1,76 %	1,59 %	0,08 %	4,27 %		
TOTAL % Pacientes GRS	0,00 %	85,44 %	0,05 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %	0,01 %	0,05 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	62,50 %	32	43,75 %	70,00 %
AGUILAR DE CAMPOO	91,14 %	158	79,75 %	87,50 %
ALBA DE TORMES	87,67 %	146	78,77 %	89,84 %
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	50,00 %	10	30,00 %	60,00 %
ALISTE	68,42 %	19	47,37 %	69,23 %
ALMAZAN	77,55 %	49	71,43 %	92,11 %
ALTA SANABRIA	100,00 %	1		
ANTONIO GUTIERREZ	86,17 %	405	80,49 %	93,41 %
ARANDA NORTE	70,94 %	203	61,08 %	86,11 %
ARANDA RURAL	84,00 %	50	50,00 %	59,52 %
ARANDA SUR	82,18 %	303	63,37 %	77,11 %
ARCOS DE JALON	100,00 %	4	50,00 %	50,00 %
ARENAS DE SAN PEDRO	68,89 %	90	55,56 %	80,65 %
AREVALO	86,62 %	142	66,20 %	76,42 %
ARMUNIA	78,16 %	87	74,71 %	95,59 %
ARTURO EYRIES	75,48 %	155	71,61 %	94,87 %
ASTORGA I	75,90 %	83	62,65 %	82,54 %
ASTORGA II	83,08 %	65	60,00 %	72,22 %
AVILA ESTACION	77,22 %	237	73,00 %	94,54 %
AVILA NORTE	88,67 %	150	69,33 %	78,20 %
AVILA RURAL	71,70 %	53	58,49 %	81,58 %
AVILA SUR ESTE	84,21 %	247	70,85 %	84,13 %
AVILA SUR OESTE	62,10 %	124	56,45 %	90,91 %
BABIA	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %
BALTANAS	71,43 %	14	50,00 %	70,00 %
BAÑEZA I	77,78 %	117	59,83 %	76,92 %
BAÑEZA II	79,21 %	101	67,33 %	85,00 %
BARCO DE AVILA	65,52 %	29	58,62 %	89,47 %
BARRIO ESPAÑA	90,48 %	63	87,30 %	96,49 %
BEJAR	82,35 %	204	75,49 %	91,67 %
BELORADO	88,10 %	42	59,52 %	67,57 %
BEMBIBRE	75,76 %	132	63,64 %	84,00 %
BENAVENTE NORTE	81,37 %	161	72,05 %	88,55 %
BENAVENTE SUR	82,96 %	135	73,33 %	88,39 %
BERLANGA DE DUERO	71,43 %	7	57,14 %	80,00 %
BOÑAR	80,00 %	10	60,00 %	75,00 %
BRIVIESCA	75,00 %	60	65,00 %	86,67 %
BURGO DE OSMÁ	80,33 %	61	68,85 %	85,71 %
BURGOHONDO	48,15 %	27	37,04 %	76,92 %
BURGOS RURAL NORTE	84,13 %	63	76,19 %	90,57 %
BURGOS RURAL SUR	90,77 %	130	73,08 %	80,51 %
CACABELOS	82,69 %	104	36,54 %	44,19 %
CALZADA DE VALDUNCIEL	80,95 %	21	66,67 %	82,35 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	95	78,95 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2.504	30,91 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1.850	82,97 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	308	83,77 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15.923	82,15 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3.134	88,99 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2.780	88,20 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	768	80,99 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	25	88,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	7	85,71 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	59	50,85 %
TOTAL PACIENTES Otitis		24.765	81,22 %

CAMARZANA DE TERA	47,06 %	17	17,65 %	37,50 %
CAMPOS LAMPREANA	50,00 %	4	50,00 %	100,00 %
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	80,56 %	72	69,44 %	86,21 %
CANDELEDA	57,69 %	52	28,85 %	50,00 %
CANTALAPIEDRA	72,73 %	11	54,55 %	75,00 %
CANTALEJO	89,19 %	37	72,97 %	81,82 %
CANTERAC	87,95 %	83	79,52 %	90,41 %
CAPUCHINOS	90,48 %	105	83,81 %	92,63 %
CARBAJALES DE ALBA	100,00 %	2	50,00 %	50,00 %
CARBALLEDA	86,67 %	15	80,00 %	92,31 %
CARBONERO	78,48 %	79	65,82 %	83,87 %
CARRION DE LOS CONDES	88,24 %	34	82,35 %	93,33 %
CASA DEL BARCO	88,46 %	52	75,00 %	84,78 %
CEBREROS	75,40 %	126	61,11 %	81,05 %
CENTRO-GAMAZO	83,33 %	96	73,96 %	88,75 %
CERVERA DE PISUERGA	78,95 %	38	68,42 %	86,67 %
CIGALES	95,19 %	104	86,54 %	90,91 %
CIRCULAR	87,00 %	100	80,00 %	91,95 %
CIRCUNVALACION	80,34 %	234	74,36 %	92,55 %
CIUDAD RODRIGO	80,82 %	245	75,10 %	92,93 %
CONDADO DE TREVIÑO	53,33 %	15	20,00 %	37,50 %
CONDESA	76,96 %	191	67,02 %	87,07 %
CORRALES	78,57 %	14	57,14 %	72,73 %
CRISTOBAL ACOSTA	82,95 %	129	67,44 %	81,31 %
CRUCERO	88,17 %	93	78,49 %	89,02 %
CUELLAR	82,67 %	150	71,33 %	86,29 %
CUENCA DEL BERNESGA	82,35 %	51	70,59 %	85,71 %
DELICIAS I	78,45 %	297	66,33 %	84,55 %
DELICIAS II	85,63 %	334	79,04 %	92,31 %
EL EJIDO	78,28 %	198	75,76 %	96,77 %
EL ESPINAR	86,89 %	122	80,33 %	92,45 %
ERAS DEL BOSQUE	90,06 %	342	79,24 %	87,99 %
ESGUEVILLAS	100,00 %	2	100,00 %	100,00 %
ESPINOSA DE LOS MONTER	63,64 %	22	54,55 %	85,71 %
FABERO	78,13 %	32	18,75 %	24,00 %
FONTIVEROS	81,82 %	11	45,45 %	55,56 %
FROMISTA	85,00 %	20	85,00 %	100,00 %
FUENTEGUINALDO	100,00 %	5	60,00 %	60,00 %
FUENTESAUCO	100,00 %	8	100,00 %	100,00 %
FUENTES DE OÑORO	60,00 %	5	40,00 %	66,67 %
GAMONAL-ANTIGUA	82,48 %	137	74,45 %	90,27 %
GARCIA LORCA	73,83 %	107	71,96 %	97,47 %
GARRIDO NORTE	87,34 %	158	80,38 %	92,03 %
GARRIDO SUR	78,31 %	295	69,15 %	88,31 %
GOMARA		2		
GREDOS	80,00 %	5	80,00 %	100,00 %
GUARDO	80,58 %	103	59,22 %	73,49 %
GUAREÑA	83,33 %	24	70,83 %	85,00 %
GUIJUELO	82,81 %	128	69,53 %	83,96 %
HERRERA DE PISUERGA	85,00 %	60	75,00 %	88,24 %

HUERTA DEL REY	82,44 %	353	67,14 %	81,44 %
HUERTA DE REY	100,00 %	13	38,46 %	38,46 %
IGNACIO LOPEZ SAIZ	87,05 %	139	83,45 %	95,87 %
ISCAR	74,44 %	133	62,41 %	83,84 %
JARDINILLOS	84,21 %	114	74,56 %	88,54 %
JOSE AGUADO	83,06 %	183	71,58 %	86,18 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	82,21 %	399	77,19 %	93,90 %
LA ALAMEDILLA	84,13 %	271	66,05 %	78,51 %
LA ALBERCA	76,19 %	21	57,14 %	75,00 %
LA CABRERA		1		
LA FUENTE SAN ESTEBAN	88,89 %	27	66,67 %	75,00 %
LAGUNA DE DUERO	81,58 %	304	70,07 %	85,89 %
LA MAGDALENA	62,50 %	8	50,00 %	80,00 %
LANZAHITA	86,96 %	23	52,17 %	60,00 %
LA PALOMERA	82,16 %	241	73,44 %	89,39 %
LA PUEBLA	90,20 %	296	79,73 %	88,39 %
LAS HUELGAS	83,11 %	148	75,68 %	91,06 %
LA SIERRA	80,00 %	10	70,00 %	87,50 %
LAS NAVAS DEL MARQUES	65,63 %	96	62,50 %	95,24 %
LAS TORRES	80,17 %	121	71,90 %	89,69 %
LA VICTORIA	87,10 %	155	80,65 %	92,59 %
LEDESMA	85,71 %	21	66,67 %	77,78 %
LERMA	76,27 %	59	54,24 %	71,11 %
LINARES DE RIOFRIO	73,08 %	26	61,54 %	84,21 %
LOS COMUNEROS	92,86 %	112	86,61 %	93,27 %
LOS CUBOS	84,09 %	176	73,86 %	87,84 %
LUMBRALES	84,21 %	19	73,68 %	87,50 %
MADRIGAL ALTAS TORRES	20,00 %	10	20,00 %	100,00 %
MAGDALENA	92,86 %	56	78,57 %	84,62 %
MANSILLA DE LAS MULAS	62,86 %	35	51,43 %	81,82 %
MATALLANA DE TORIO	88,89 %	9	88,89 %	100,00 %
MATILLA DE LOS CAÑOS	86,36 %	22	54,55 %	63,16 %
MAYORGA DE CAMPOS	76,19 %	21	61,90 %	81,25 %
MEDINA DEL CAMPO RURAL	75,00 %	4	25,00 %	33,33 %
MEDINA DEL CAMPO URBAN	86,46 %	288	71,53 %	82,73 %
MEDINA DE POMAR	71,05 %	38	60,53 %	85,19 %
MEDINA DE RIOSECO	82,31 %	147	76,87 %	93,39 %
MELGAR DE FERNAMENTAL	80,65 %	31	70,97 %	88,00 %
MIGUEL ARMIJO	83,04 %	171	71,93 %	86,62 %
MIRANDA DEL CASTAÑAR	40,00 %	5	20,00 %	50,00 %
MIRANDA ESTE	77,65 %	264	67,80 %	87,32 %
MIRANDA OESTE	93,35 %	316	77,22 %	82,71 %
MOMBELTRAN	87,50 %	16	37,50 %	42,86 %
MOTA DEL MARQUES	100,00 %	4	75,00 %	75,00 %
MUÑANA	100,00 %	12	66,67 %	66,67 %
MUÑICO	100,00 %	2		
NAVA DE LA ASUNCION	85,71 %	119	68,07 %	79,41 %
OLVEGA	63,27 %	49	42,86 %	67,74 %
OSORNO	58,33 %	12	58,33 %	100,00 %
PALENCIA RURAL	76,47 %	17	76,47 %	100,00 %

PAMPLIEGA	50,00 %	4	25,00 %	50,00 %
PARADA DE MOLINO	87,25 %	204	68,63 %	78,65 %
PAREDES DE NAVAJA	81,58 %	38	78,95 %	96,77 %
PARQUESOL	82,30 %	322	78,57 %	95,47 %
PEDIATRIA DE AREA ESTE	72,78 %	327	60,86 %	83,61 %
PEDIATRIA DE AREA LEON	85,64 %	202	79,70 %	93,06 %
PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA	93,22 %	118	68,64 %	73,64 %
PEDIATRIA DE AREA ZAMORA	81,69 %	71	73,24 %	89,66 %
PEDROSILLO EL RALO	85,71 %	21	66,67 %	77,78 %
PEÑAFIEL	87,06 %	85	65,88 %	75,68 %
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	87,13 %	101	58,42 %	67,05 %
PERIURBANA NORTE	80,29 %	279	69,18 %	86,16 %
PERIURBANA SUR	87,02 %	131	66,41 %	76,32 %
PIEDRAHITA	87,50 %	16	62,50 %	71,43 %
PILARICA	81,88 %	160	78,13 %	95,42 %
PINARES-COVALEDA	84,85 %	33	72,73 %	85,71 %
PINTOR OLIVA	68,78 %	394	55,33 %	80,44 %
PISUERGA	86,57 %	581	79,86 %	92,25 %
PIZARRALES	78,34 %	217	73,73 %	94,12 %
PLAZA DEL EJERCITO	77,88 %	113	73,45 %	94,32 %
PONFERRADA I	76,09 %	276	34,06 %	44,76 %
PONFERRADA II	75,46 %	216	47,69 %	63,19 %
PONFERRADA III	63,13 %	179	47,49 %	75,22 %
PONFERRADA IV	76,60 %	188	47,34 %	61,81 %
PORTILLO	80,00 %	40	70,00 %	87,50 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ	85,71 %	7	57,14 %	66,67 %
PUERTA NUEVA	65,34 %	176	52,27 %	80,00 %
QUINTANAR DE LA SIERRA	75,00 %	20	55,00 %	73,33 %
RIAÑO	66,67 %	6	66,67 %	100,00 %
RIAZA	69,23 %	39	64,10 %	92,59 %
RIBERA DEL ESLA	69,23 %	13	61,54 %	88,89 %
RIBERA DEL ORBIGO	76,14 %	88	57,95 %	76,12 %
ROA	80,36 %	56	55,36 %	68,89 %
ROBLEDA	100,00 %	4	25,00 %	25,00 %
RONDILLA I	82,76 %	58	68,97 %	83,33 %
RONDILLA II	80,15 %	136	70,59 %	88,07 %
SACRAMENIA	100,00 %	3	33,33 %	33,33 %
SAHAGUN	86,21 %	29	68,97 %	80,00 %
SALAS DE LOS INFANTES	71,88 %	32	59,38 %	82,61 %
SALDAÑA	70,00 %	60	60,00 %	85,71 %
SAN AGUSTIN	85,59 %	229	78,17 %	91,33 %
SAN ANDRES DEL RABANEI	78,57 %	224	71,43 %	90,91 %
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	85,71 %	28	57,14 %	66,67 %
SAN JOSE	85,16 %	182	80,77 %	94,84 %
SAN JUAN	83,33 %	108	72,22 %	86,67 %
SAN LEONARDO DE YAGUE	78,57 %	14	57,14 %	72,73 %
SAN PABLO	88,64 %	132	81,82 %	92,31 %
SAN PEDRO DEL ARROYO	66,67 %	9	44,44 %	66,67 %
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %	5	80,00 %	80,00 %
SANTA CLARA	82,26 %	124	75,81 %	92,16 %

SANTA ELENA	81,32 %	182	70,88 %	87,16 %
SANTA MARIA	85,51 %	69	75,36 %	88,14 %
SANTA MARTA	88,24 %	187	79,68 %	90,30 %
SAYAGO	64,29 %	14	50,00 %	77,78 %
SEDANO	50,00 %	2	50,00 %	100,00 %
SEGOVIA I	84,80 %	250	74,80 %	88,21 %
SEGOVIA II	86,59 %	261	78,93 %	91,15 %
SEGOVIA III	80,83 %	193	72,02 %	89,10 %
SEGOVIA RURAL	81,23 %	261	72,03 %	88,68 %
SEPULVEDA	96,67 %	30	76,67 %	79,31 %
SORIA NORTE	83,54 %	164	70,73 %	84,67 %
SORIA RURAL	61,62 %	99	51,52 %	83,61 %
SORIA SUR	75,23 %	218	66,06 %	87,80 %
SORIA TARDE	79,31 %	58	75,86 %	95,65 %
SOTILLO DE LA ADRADA	61,90 %	126	34,92 %	56,41 %
SUR	73,85 %	218	66,51 %	90,06 %
TABARA	86,96 %	23	56,52 %	65,00 %
TAMAMES	80,00 %	10	70,00 %	87,50 %
TEJARES	85,65 %	209	78,95 %	92,18 %
TORDESILLAS	79,00 %	100	73,00 %	92,41 %
TORENO	100,00 %	20	90,00 %	90,00 %
TORO	58,18 %	110	50,00 %	85,94 %
TORQUEMADA	81,82 %	33	75,76 %	92,59 %
TORTOLA	75,19 %	133	69,17 %	92,00 %
TROBAJO DEL CAMINO - VA	88,17 %	93	83,87 %	95,12 %
TUDELA	83,78 %	185	71,35 %	85,16 %
UNIVERSIDAD CENTRO	77,27 %	66	60,61 %	78,43 %
VALDERAS	85,00 %	20	65,00 %	76,47 %
VALENCIA DE DON JUAN	86,11 %	108	51,85 %	60,22 %
VALLADOLID RURAL I	88,89 %	135	77,04 %	86,67 %
VALLADOLID RURAL II	85,48 %	186	82,26 %	96,23 %
VALLE DE LOSA	50,00 %	2	50,00 %	100,00 %
VALLE DE MENA	54,05 %	37	45,95 %	85,00 %
VALLE DE TOBALINA	60,00 %	5	60,00 %	100,00 %
VALLE DE VALDEBEZANA	75,00 %	4	50,00 %	66,67 %
VENTA DE BAÑOS	74,07 %	135	68,15 %	92,00 %
VIDRIALES	100,00 %	11	81,82 %	81,82 %
VILLABLINO	87,50 %	72	36,11 %	41,27 %
VILLACASTIN	55,56 %	18	50,00 %	90,00 %
VILLADA	50,00 %	4	50,00 %	100,00 %
VILLADIEGO	100,00 %	14	85,71 %	85,71 %
VILLAFRANCA	69,84 %	63	65,08 %	93,18 %
VILLAFRECHOS	75,00 %	20	50,00 %	66,67 %
VILLALON DE CAMPOS	78,95 %	19	68,42 %	86,67 %
VILLALPANDO	90,48 %	21	66,67 %	73,68 %
VILLAMURIEL	74,02 %	127	58,27 %	78,72 %
VILLARCAYO	80,00 %	35	60,00 %	75,00 %
VILLARRAMIEL	77,78 %	9	66,67 %	85,71 %
VILLORIA	74,55 %	55	65,45 %	87,80 %
VIRGEN CONCHA	86,58 %	231	80,95 %	93,50 %

VITIGUDINO	85,19 %	54	70,37 %	82,61 %
ZAMORA NORTE	87,10 %	31	70,97 %	81,48 %
ZAMORA SUR	87,18 %	39	74,36 %	85,29 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA		70,00 %		30,00 %					10,00 %		
AGUILAR DE CAMPOO		86,11 %	1,39 %	24,31 %		0,69 %	6,25 %		2,08 %		
ALBA DE TORMES		89,84 %		19,53 %					0,78 %		
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		60,00 %		40,00 %							
ALISTE		69,23 %		38,46 %					7,69 %		
ALMAZAN		92,11 %		7,89 %			2,63 %				
ALTA SANABRIA						100,00 %					
ANTONIO GUTIERREZ		93,41 %		12,03 %		0,29 %	0,86 %		2,87 %		0,29 %
ARANDA NORTE		85,42 %	0,69 %	9,03 %		1,39 %			8,33 %		
ARANDA RURAL		59,52 %		35,71 %		2,38 %			11,90 %		
ARANDA SUR		77,11 %		29,72 %	0,40 %				6,02 %		
ARCOS DE JALON		50,00 %		25,00 %					50,00 %		
ARENAS DE SAN PEDRO		80,65 %		16,13 %			11,29 %		6,45 %		
AREVALO		76,42 %		25,20 %		2,44 %			4,88 %		0,81 %
ARMUNIA		95,59 %		8,82 %		2,94 %			2,94 %		
ARTURO EYRIES		94,87 %		13,68 %		2,56 %			1,71 %		
ASTORGA I		82,54 %		22,22 %	1,59 %				12,70 %		
ASTORGA II		72,22 %		16,67 %		1,85 %	1,85 %	3,70 %	14,81 %		
AVILA ESTACION		94,54 %		11,48 %					1,64 %		
AVILA NORTE		77,44 %	0,75 %	26,32 %		7,52 %	3,01 %	0,75 %	3,01 %		0,75 %
AVILA RURAL		81,58 %		21,05 %		2,63 %			2,63 %		
AVILA SUR ESTE		83,65 %	0,48 %	20,67 %		0,96 %	1,92 %		0,96 %	0,48 %	
AVILA SUR OESTE		90,91 %		10,39 %		6,49 %					
BABIA		100,00 %									
BALTANAS		70,00 %		20,00 %			10,00 %		10,00 %		
BAÑEZA I		76,92 %		20,88 %		2,20 %	3,30 %		3,30 %	1,10 %	1,10 %
BAÑEZA II		85,00 %		15,00 %		2,50 %	2,50 %	1,25 %	3,75 %		
BARCO DE AVILA		89,47 %		5,26 %		5,26 %			10,53 %		
BARRIO ESPAÑA		96,49 %		10,53 %			1,75 %		1,75 %		
BEJAR		91,67 %		19,05 %		2,38 %	1,19 %				
BELORADO		67,57 %		43,24 %		5,41 %			2,70 %		
BEMBIBRE		84,00 %		17,00 %		2,00 %	1,00 %		4,00 %		
BENAVENTE NORTE		88,55 %		18,32 %		1,53 %			3,82 %		
BENAVENTE SUR		88,39 %		11,61 %		2,68 %	1,79 %		3,57 %		

BERLANGA DE DUERO		80,00 %		20,00 %							
BOÑAR		75,00 %		12,50 %			12,50 %				
BRIVIESCA		86,67 %		15,56 %			2,22 %				
BURGO DE OSMA		85,71 %		14,29 %			10,20 %				
BURGOHONDO		76,92 %		23,08 %							
BURGOS RURAL NORTE		90,57 %		20,75 %			5,66 %		5,66 %		
BURGOS RURAL SUR		80,51 %		27,12 %	0,85 %	1,69 %	3,39 %		3,39 %		
CACABELOS		44,19 %		55,81 %		8,14 %	1,16 %		8,14 %		
CALZADA DE VALDUNCIEL		82,35 %		5,88 %		5,88 %			5,88 %		
CAMARZANA DE TERA		37,50 %		50,00 %					12,50 %		
CAMPOS LAMPREANA		100,00 %									
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT		86,21 %		12,07 %		5,17 %	5,17 %		3,45 %		
CANDELEDA		50,00 %		36,67 %		3,33 %	10,00 %		16,67 %		
CANTALAPIEDRA		75,00 %		25,00 %		12,50 %					
CANTALEJO		81,82 %		27,27 %		3,03 %		3,03 %	3,03 %		
CANTERAC		90,41 %		23,29 %			1,37 %	1,37 %	2,74 %		
CAPUCHINOS		92,63 %		22,11 %		4,21 %	3,16 %		1,05 %		
CARBAJALES DE ALBA		50,00 %		50,00 %							
CARBALLEDA		92,31 %		7,69 %							
CARBONERO		83,87 %		19,35 %		3,23 %	1,61 %	3,23 %	3,23 %		
CARRION DE LOS CONDES		93,33 %		20,00 %					6,67 %		
CASA DEL BARCO		84,78 %		13,04 %			2,17 %	2,17 %	2,17 %		
CEBREROS		81,05 %		17,89 %		3,16 %			4,21 %		
CENTRO-GAMAZO		88,75 %		12,50 %		2,50 %			2,50 %		
CERVERA DE PISUERGA		86,67 %		20,00 %					3,33 %		
CIGALES		90,91 %		24,24 %		2,02 %	1,01 %		2,02 %		
CIRCULAR		91,95 %		12,64 %					9,20 %		
CIRCUNVALACION		92,55 %		14,89 %		1,06 %	1,06 %		4,26 %		
CIUDAD RODRIGO		92,42 %	0,51 %	20,71 %		1,52 %	1,01 %		2,53 %		
CONDADO DE TREVIÑO		37,50 %		62,50 %							
CONDESA		87,07 %		18,37 %		0,68 %			4,08 %		
CORRALES		72,73 %		18,18 %		9,09 %			9,09 %		
CRISTOBAL ACOSTA		80,37 %	0,93 %	23,36 %			7,48 %		1,87 %		
CRUCERO		89,02 %		12,20 %					8,54 %		
CUELLAR		86,29 %		22,58 %		1,61 %					
CUENCA DEL BERNESGA		85,71 %		4,76 %		4,76 %			7,14 %		
DELICIAS I		84,55 %		9,87 %		0,86 %	12,02 %		1,72 %		
DELICIAS II		92,31 %		11,19 %		2,45 %	2,10 %		3,50 %		
EL EJIDO		96,77 %		10,32 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %		1,29 %		
EL ESPINAR		92,45 %		16,98 %							
ERAS DEL BOSQUE		87,99 %		13,31 %		0,97 %	0,32 %		19,16 %		
ESGUEVILLAS		100,00 %		50,00 %							
ESPINOSA DE LOS MONTER		85,71 %		21,43 %							
FABERO		24,00 %		36,00 %		8,00 %	36,00 %		4,00 %		
FONTIVEROS		55,56 %		66,67 %							
FROMISTA		100,00 %		5,88 %							
FUENTEGUINALDO		60,00 %		40,00 %							

FUENTESAUCO		100,00 %		25,00 %			12,50 %				
FUENTES DE OÑORO		66,67 %		33,33 %							
GAMONAL-ANTIGUA		90,27 %		15,93 %		1,77 %			4,42 %		
GARCIA LORCA		97,47 %		12,66 %							
GARRIDO NORTE		92,03 %		15,22 %			0,72 %	0,72 %	2,17 %		
GARRIDO SUR		88,31 %		15,15 %	2,60 %	2,60 %	0,87 %	0,43 %	2,60 %		
GREDOS		100,00 %									
GUARDO		73,49 %		34,94 %		1,20 %	1,20 %		4,82 %		
GUAREÑA		85,00 %		25,00 %		5,00 %					
GUIJUELO		83,96 %		18,87 %		3,77 %	1,89 %		2,83 %		
HERRERA DE PISUERGA		88,24 %		19,61 %		1,96 %	1,96 %		5,88 %		
HUERTA DEL REY		81,44 %		23,71 %		1,03 %			2,41 %		
HUERTA DE REY		38,46 %		76,92 %							
IGNACIO LOPEZ SAIZ		95,87 %		14,05 %					0,83 %		
ISCAR		83,84 %		12,12 %		5,05 %			12,12 %		
JARDINILLOS		87,50 %	1,04 %	20,83 %							
JOSE AGUADO		86,18 %		17,76 %		1,32 %	2,63 %		1,97 %		
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		93,60 %	0,30 %	14,33 %		0,91 %	2,74 %		5,18 %		
LA ALAMEDILLA		78,51 %		29,82 %		20,61 %	10,53 %		3,95 %		
LA ALBERCA		75,00 %		31,25 %		6,25 %	12,50 %				
LA FUENTE SAN ESTEBAN		75,00 %		29,17 %		4,17 %					
LAGUNA DE DUERO		85,89 %		21,37 %		1,61 %	2,02 %	0,40 %	1,21 %		
LA MAGDALENA		80,00 %		20,00 %							
LANZAHITA		60,00 %		35,00 %			5,00 %		10,00 %		
LA PALOMERA		89,39 %		14,65 %			1,52 %		2,53 %		
LA PUEBLA		88,39 %		23,97 %		2,62 %	1,12 %	0,75 %	1,50 %		
LAS HUELGAS		91,06 %		21,14 %		2,44 %	0,81 %	1,63 %	2,44 %		
LA SIERRA		87,50 %		37,50 %		12,50 %	12,50 %				
LAS NAVAS DEL MARQUES		95,24 %		7,94 %		1,59 %					
LAS TORRES		88,66 %	1,03 %	16,49 %		1,03 %	1,03 %				
LA VICTORIA		92,59 %		17,04 %			0,74 %		2,22 %		
LEDESMA		77,78 %		5,56 %		5,56 %			22,22 %		
LERMA		71,11 %		35,56 %		2,22 %			4,44 %		
LINARES DE RIOFRIO		84,21 %		21,05 %			5,26 %				
LOS COMUNEROS		93,27 %		14,42 %			3,85 %		3,85 %		
LOS CUBOS		87,84 %		25,00 %		1,35 %			3,38 %		0,68 %
LUMBRALES		87,50 %		18,75 %							
MADRIGAL ALTAS TORRES		100,00 %									
MAGDALENA		84,62 %		19,23 %					3,85 %		
MANSILLA DE LAS MULAS		81,82 %		13,64 %					9,09 %		
MATALLANA DE TORIO		100,00 %									
MATILLA DE LOS CAÑOS		63,16 %		36,84 %		5,26 %	5,26 %				
MAYORGA DE CAMPOS		81,25 %		6,25 %					12,50 %		
MEDINA DEL CAMPO RURAL		33,33 %		66,67 %		33,33 %					
MEDINA DEL CAMPO URBAN		82,73 %		20,08 %		1,20 %	2,81 %		2,01 %		
MEDINA DE POMAR		85,19 %		18,52 %		3,70 %	7,41 %				
MEDINA DE RIOSECO		93,39 %		9,09 %		0,83 %	0,83 %		10,74 %		

MELGAR DE FERNAMENTAI	88,00 %		16,00 %							
MIGUEL ARMIJO	86,62 %		19,01 %		1,41 %	4,93 %		2,82 %		
MIRANDA DEL CASTAÑAR	50,00 %		50,00 %							
MIRANDA ESTE	86,83 %	0,49 %	17,56 %		1,95 %	2,44 %		3,90 %		
MIRANDA OESTE	82,71 %		31,19 %		2,71 %	0,34 %		3,05 %		
MOMBELTRAN	42,86 %		28,57 %			21,43 %		7,14 %		
MOTA DEL MARQUES	75,00 %		25,00 %							
MUÑANA	66,67 %		50,00 %							
MUÑICO			50,00 %		50,00 %					
NAVA DE LA ASUNCION	79,41 %		22,55 %		3,92 %	3,92 %		4,90 %		
OLVEGA	67,74 %		48,39 %		3,23 %			3,23 %		
OSORNO	100,00 %									
PALENCIA RURAL	100,00 %		7,69 %							
PAMPLIEGA	50,00 %		50,00 %							
PARADA DE MOLINO	78,65 %		24,72 %		3,37 %	5,62 %		5,62 %		
PAREDES DE NAVA	96,77 %		9,68 %							
PARQUESOL	95,47 %		7,92 %		0,38 %	0,38 %	0,38 %	1,51 %		
PEDIATRIA DE AREA ESTE	83,61 %		16,39 %		1,26 %	1,26 %	0,42 %	8,40 %		0,42 %
PEDIATRIA DE AREA LEON	93,06 %		15,03 %		0,58 %	0,58 %	1,16 %	4,05 %		
PEDIATRIA DE AREA SEGO	73,64 %		38,18 %		2,73 %	2,73 %	0,91 %	2,73 %		
PEDIATRIA DE AREA ZAMO	89,66 %		13,79 %					5,17 %		
PEDROSILLO EL RALO	77,78 %		22,22 %	5,56 %	16,67 %					
PEÑAFIEL	75,68 %		14,86 %	1,35 %		1,35 %		31,08 %		
PEÑARANDA DE BRACAMO	67,05 %		39,77 %		5,68 %	1,14 %				
PERIURBANA NORTE	86,16 %		22,32 %		3,13 %	1,79 %				
PERIURBANA SUR	76,32 %		24,56 %		5,26 %	4,39 %	0,88 %	6,14 %		
PIEDRAHITA	71,43 %		14,29 %					14,29 %		
PILARICA	95,42 %		9,16 %		0,76 %	0,76 %		3,05 %		
PINARES-COVALEDA	85,71 %		14,29 %		10,71 %			3,57 %		
PINTOR OLIVA	80,44 %		20,30 %		1,85 %	9,96 %		4,06 %		
PISUERGA	92,25 %		17,10 %		0,40 %	3,58 %		5,77 %		
PIZARRALES	94,12 %		18,24 %		2,35 %	1,76 %		0,59 %		
PLAZA DEL EJERCITO	94,32 %		6,82 %		2,27 %					
PONFERRADA I	44,76 %		52,38 %		2,86 %	12,38 %		3,33 %		
PONFERRADA II	63,19 %		31,90 %		3,07 %	12,88 %		6,13 %		
PONFERRADA III	75,22 %		23,01 %		1,77 %	7,08 %		1,77 %		
PONFERRADA IV	61,81 %		26,39 %		1,39 %	15,97 %		6,25 %		
PORTILLO	87,50 %		28,13 %			3,13 %				
PUENTE DOMINGO FLOREZ	66,67 %		50,00 %							
PUERTA NUEVA	80,00 %		21,74 %		1,74 %	1,74 %		5,22 %		
QUINTANAR DE LA SIERRA	73,33 %		6,67 %			20,00 %		6,67 %		
RIAÑO	100,00 %									
RIAZA	92,59 %		14,81 %							
RIBERA DEL ESLA	88,89 %		11,11 %							
RIBERA DEL ORBIGO	76,12 %		23,88 %		1,49 %	1,49 %		2,99 %		
ROA	68,89 %		40,00 %					6,67 %		
ROBLEDA	25,00 %		75,00 %							

RONDILLA I		83,33 %		25,00 %		2,08 %	2,08 %		2,08 %		
RONDILLA II		88,07 %		22,94 %		0,92 %					
SACRAMENIA		33,33 %		33,33 %					33,33 %		
SAHAGUN		80,00 %		20,00 %			4,00 %		8,00 %		
SALAS DE LOS INFANTES		82,61 %		13,04 %		4,35 %			8,70 %		
SALDAÑA		85,71 %		19,05 %					14,29 %		
SAN AGUSTIN		91,33 %		18,88 %		2,04 %	1,02 %	0,51 %	3,57 %		
SAN ANDRES DEL RABANE		90,91 %		14,20 %		1,70 %	1,70 %		3,41 %		
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		66,67 %		29,17 %		8,33 %			4,17 %		
SAN JOSE		94,84 %		12,90 %	0,65 %	1,94 %	1,94 %				
SAN JUAN		86,67 %		18,89 %	1,11 %	3,33 %	2,22 %				
SAN LEONARDO DE YAGUE		72,73 %		54,55 %							
SAN PABLO		92,31 %		17,95 %	0,85 %	0,85 %			6,84 %		
SAN PEDRO DEL ARROYO		66,67 %		50,00 %							
SAN PEDRO MANRIQUE		80,00 %		20,00 %							
SANTA CLARA		92,16 %		12,75 %		0,98 %			4,90 %		
SANTA ELENA		87,16 %		14,86 %		0,68 %	1,35 %		4,05 %		
SANTA MARIA		88,14 %		10,17 %		3,39 %	1,69 %		5,08 %		
SANTA MARTA		90,30 %		12,12 %		3,03 %	3,03 %		3,03 %		0,61 %
SAYAGO		77,78 %		33,33 %			11,11 %				
SEDANO		100,00 %									
SEGOVIA I		88,21 %		16,98 %		2,36 %	2,83 %		6,60 %		
SEGOVIA II		91,15 %		15,04 %		3,98 %	1,33 %	0,88 %	3,54 %		
SEGOVIA III		89,10 %		12,18 %			0,64 %		7,69 %		
SEGOVIA RURAL		88,68 %		12,26 %			0,47 %		2,83 %		
SEPULVEDA		79,31 %		20,69 %			6,90 %		10,34 %		
SORIA NORTE		84,67 %		20,44 %		0,73 %		0,73 %	2,19 %		
SORIA RURAL		83,61 %		13,11 %			3,28 %		3,28 %		
SORIA SUR		87,80 %		19,51 %		1,22 %	1,83 %		3,05 %		
SORIA TARDE		95,65 %		17,39 %		4,35 %	2,17 %				
SOTILLO DE LA ADRADA		56,41 %		29,49 %	1,28 %	1,28 %	1,28 %		17,95 %		2,56 %
SUR		90,06 %		11,18 %		3,73 %	0,62 %		1,86 %		
TABARA		65,00 %		35,00 %		10,00 %	5,00 %		15,00 %		
TAMAMES		87,50 %		25,00 %							
TEJARES		92,18 %		16,76 %		2,23 %	4,47 %		0,56 %		
TORDESILLAS		92,41 %		7,59 %		1,27 %			5,06 %		
TORENO		90,00 %		10,00 %							
TORO		85,94 %		17,19 %					1,56 %		
TORQUEMADA		92,59 %		11,11 %					3,70 %		
TORTOLA		92,00 %		11,00 %		3,00 %	1,00 %		4,00 %		
TROBAJO DEL CAMINO - VA		95,12 %		13,41 %					1,22 %		
TUDELA		85,16 %		21,29 %		1,29 %			5,81 %		
UNIVERSIDAD CENTRO		78,43 %		29,41 %		3,92 %			3,92 %		
VALDERAS		76,47 %		29,41 %		5,88 %					
VALENCIA DE DON JUAN		60,22 %		47,31 %		3,23 %			1,08 %		
VALLADOLID RURAL I		86,67 %		25,83 %		0,83 %	0,83 %		1,67 %		
VALLADOLID RURAL II	0,63 %	96,23 %		14,47 %					1,89 %		

VALLE DE LOSA		100,00 %										
VALLE DE MENA		85,00 %		20,00 %				5,00 %	5,00 %			
VALLE DE TOBALINA		100,00 %										
VALLE DE VALDEBEZANA		66,67 %		33,33 %								
VENTA DE BAÑOS		92,00 %		11,00 %					3,00 %		1,00 %	
VIDRIALES		81,82 %		27,27 %					9,09 %			
VILLABLINO		41,27 %		23,81 %		1,59 %	38,10 %		1,59 %			
VILLACASTIN		90,00 %		10,00 %								
VILLADA		100,00 %							50,00 %			
VILLADIEGO		85,71 %		21,43 %					7,14 %			
VILLAFRANCA		93,18 %		9,09 %			11,36 %		2,27 %			
VILLAFRECHOS		66,67 %		20,00 %			13,33 %		6,67 %			
VILLALON DE CAMPOS		86,67 %		13,33 %		6,67 %	6,67 %		6,67 %			
VILLALPANDO		73,68 %		21,05 %		5,26 %	5,26 %					
VILLAMURIEL		78,72 %		12,77 %		1,06 %	6,38 %		14,89 %			
VILLARCAYO		75,00 %		25,00 %		3,57 %			7,14 %			
VILLARRAMIEL		85,71 %		14,29 %								
VILLORIA		87,80 %		17,07 %					7,32 %			
VIRGEN CONCHA		93,50 %		12,50 %				0,50 %	2,50 %			
VITIGUDINO		82,61 %		15,22 %		2,17 %			4,35 %			
ZAMORA NORTE		85,19 %		18,52 %					7,41 %			
ZAMORA SUR		85,29 %		26,47 %		2,94 %			5,88 %			
TOTAL GAP	0,00 %	85,44 %	0,05 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %	0,01 %	0,05 %	

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGREDA	62,50 %	32	43,75 %	70,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	27	66,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		32	62,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS
AGREDA	70,00 %	30,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AGUILAR DE CAMPOO	91,14 %	158	79,75 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	91	91,21 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	47	93,62 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	28	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	57,14 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		158	91,14 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AGUILAR DE CAMPOO	86,11 %	1,39 %	24,31 %	0,69 %	6,25 %	2,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALBA DE TORMES	87,67 %	146	78,77 %	89,84 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ALBA DE TORMES	89,84 %	19,53 %	0,78 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	86,84 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		146	87,67 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2025-07	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALDEADAVILA DE LA RIBER	50,00 %	10	30,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		10	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ALDEADAVILA DE LA RIBER	60,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALISTE	68,42 %	19	47,37 %	69,23 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	14	57,14 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		19	68,42 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ALISTE	69,23 %	38,46 %	7,69 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALMAZAN	77,55 %	49	71,43 %	92,11 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	35	91,43 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		49	77,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION
ALMAZAN	92,11 %	7,89 %	2,63 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

2025-12

ALTA SANABRIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-03

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ALTA SANABRIA	100,00 %	1		
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		1	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
ALTA SANABRIA	100,00 %
TOTAL GAP	1,88 %

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ANTONIO GUTIERREZ	86,17 %	405	80,49 %	93,41 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	49	59,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	54	85,19 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	7	85,71 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	203	88,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	72	91,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	53	83,02 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	13	92,31 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	2	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		405	86,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	93,41 %	12,03 %	0,29 %	0,86 %	2,87 %	0,29 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA NORTE	70,94 %	203	61,08 %	86,11 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA NORTE	85,42 %	0,69 %	9,03 %	1,39 %	8,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	30,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	86,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	62,28 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	26	80,77 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	35	82,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	16	87,50 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		203	70,94 %

2025-12

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA RURAL	84,00 %	50	50,00 %	59,52 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	34	79,41 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		50	84,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA RURAL	59,52 %	35,71 %	2,38 %	11,90 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARANDA SUR	82,18 %	303	63,37 %	77,11 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA SUR	77,11 %	29,72 %	0,40 %	6,02 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	75,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	76,47 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	215	82,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	35	77,14 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	46	80,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	14	92,86 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		303	82,18 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARCOS DE JALON	100,00 %	4	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		4	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARCOS DE JALON	50,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARENAS DE SAN PEDRO	68,89 %	90	55,56 %	80,65 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	58,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	15	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	90,91 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		90	68,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARENAS DE SAN PEDRO	80,65 %	16,13 %	11,29 %	6,45 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AREVALO	86,62 %	142	66,20 %	76,42 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AREVALO	76,42 %	25,20 %	2,44 %	4,88 %	0,81 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %	0,05 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	87,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	120	84,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		142	86,62 %

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARMUNIA	78,16 %	87	74,71 %	95,59 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARMUNIA	95,59 %	8,82 %	2,94 %	2,94 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	23,08 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	47	87,23 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	72,73 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		87	78,16 %

2025-12

ARTURO EYRIES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ARTURO EYRIES	75,48 %	155	71,61 %	94,87 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARTURO EYRIES	94,87 %	13,68 %	2,56 %	1,71 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	77,78 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	123	77,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	57,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	155	75,48 %

2025-12

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA I	75,90 %	83	62,65 %	82,54 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	58	77,59 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	81,82 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		83	75,90 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ASTORGA I	82,54 %	22,22 %	1,59 %	12,70 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	3,94 %

2025-12

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ASTORGA II	83,08 %	65	60,00 %	72,22 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	78,38 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	92,86 %
TOTAL PACIENTES Otitis		65	83,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
ASTORGA II	72,22 %	16,67 %	1,85 %	1,85 %	3,70 %	14,81 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA ESTACION	77,22 %	237	73,00 %	94,54 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA ESTACION	94,54 %	11,48 %	1,64 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	74	39,19 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	38	68,42 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	79	79,75 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	27	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	32	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	12	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		237	77,22 %

2025-12

AVILA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA NORTE	88,67 %	150	69,33 %	78,20 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	128	89,84 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		150	88,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	77,44 %	0,75 %	26,32 %	7,52 %	3,01 %	0,75 %	3,01 %	0,75 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA RURAL	71,70 %	53	58,49 %	81,58 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	70,27 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		53	71,70 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA RURAL	81,58 %	21,05 %	2,63 %	2,63 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR ESTE	84,21 %	247	70,85 %	84,13 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	23	17,39 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	42	92,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	144	87,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	27	85,19 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	88,24 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		247	84,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS
AVILA SUR ESTE	83,65 %	0,48 %	20,67 %	0,96 %	1,92 %	0,96 %	0,48 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %	0,01 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
AVILA SUR OESTE	62,10 %	124	56,45 %	90,91 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
AVILA SUR OESTE	90,91 %	10,39 %	6,49 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	6,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	16	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	92	69,57 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		124	62,10 %

2025-12

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-05 2025-10

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BABIA	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		1	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BABIA	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BALTANAS	71,43 %	14	50,00 %	70,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		14	71,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
BALTANAS	70,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BAÑEZA I	77,78 %	117	59,83 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	77,78 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	78	75,64 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	89,47 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
	bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		117	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	76,92 %	20,88 %	2,20 %	3,30 %	3,30 %	1,10 %	1,10 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %	0,01 %	0,05 %

2025-12

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BAÑEZA II	79,21 %	101	67,33 %	85,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	73	79,45 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	93,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		101	79,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
BAÑEZA II	85,00 %	15,00 %	2,50 %	2,50 %	1,25 %	3,75 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARCO DE AVILA	65,52 %	29	58,62 %	89,47 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	27	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		29	65,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BARCO DE AVILA	89,47 %	5,26 %	5,26 %	10,53 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BARRIO ESPAÑA	90,48 %	63	87,30 %	96,49 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	36	86,11 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	84,62 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		63	90,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BARRIO ESPAÑA	96,49 %	10,53 %	1,75 %	1,75 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEJAR	82,35 %	204	75,49 %	91,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
BEJAR	91,67 %	19,05 %	2,38 %	1,19 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	5	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	18,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	90,91 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	143	79,02 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	28	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	31	80,65 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		204	82,35 %

2025-12

BELORADO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BELORADO	88,10 %	42	59,52 %	67,57 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BELORADO	67,57 %	43,24 %	5,41 %	2,70 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	79,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		42	88,10 %

2025-12

BEMBIBRE**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BEMBIBRE	75,76 %	132	63,64 %	84,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BEMBIBRE	84,00 %	17,00 %	2,00 %	1,00 %	4,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	18,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	94	74,47 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	81,25 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	77,78 %
TOTAL PACIENTES Otitis		132	75,76 %

2025-12

BENAVENTE NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE NORTE	81,37 %	161	72,05 %	88,55 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE NORTE	88,55 %	18,32 %	1,53 %	3,82 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	66,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	132	81,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		161	81,37 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BENAVENTE SUR	82,96 %	135	73,33 %	88,39 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	103	82,52 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	15	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	92,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		135	82,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE SUR	88,39 %	11,61 %	2,68 %	1,79 %	3,57 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BERLANGA DE DUERO	71,43 %	7	57,14 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		7	71,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
BERLANGA DE DUERO	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BOÑAR	80,00 %	10	60,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		10	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION
BOÑAR	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BRIVIESCA	75,00 %	60	65,00 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
BRIVIESCA	86,67 %	15,56 %	2,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	48	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		60	75,00 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGO DE OSMA	80,33 %	61	68,85 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
BURGO DE OSMA	85,71 %	14,29 %	10,20 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	52	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		61	80,33 %

2025-12

BURGOHONDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOHONDO	48,15 %	27	37,04 %	76,92 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	54,17 %
TOTAL PACIENTES Otitis		27	48,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
BURGOHONDO	76,92 %	23,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOS RURAL NORTE	84,13 %	63	76,19 %	90,57 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOS RURAL NORTE	90,57 %	20,75 %	5,66 %	5,66 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	7	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	78,38 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	76,92 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		63	84,13 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
BURGOS RURAL SUR	90,77 %	130	73,08 %	80,51 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	94	88,30 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	92,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		130	90,77 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOS RURAL SUR	80,51 %	27,12 %	0,85 %	1,69 %	3,39 %	3,39 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CACABELOS	82,69 %	104	36,54 %	44,19 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CACABELOS	44,19 %	55,81 %	8,14 %	1,16 %	8,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	80,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	78	82,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		104	82,69 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CALZADA DE VALDUNCIEL	80,95 %	21	66,67 %	82,35 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	11	90,91 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	80,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CALZADA DE VALDUNCIEL	82,35 %	5,88 %	5,88 %	5,88 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMARZANA DE TERA	47,06 %	17	17,65 %	37,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	53,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		17	47,06 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CAMARZANA DE TERA	37,50 %	50,00 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

CAMPOS LAMPREANA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAMPOS LAMPREANA	50,00 %	4	50,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CAMPOS LAMPREANA	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	80,56 %	72	69,44 %	86,21 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	48	75,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	20	80,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		72	80,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	86,21 %	12,07 %	5,17 %	5,17 %	3,45 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANDELEDA	57,69 %	52	28,85 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	51,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		52	57,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CANDELEDA	50,00 %	36,67 %	3,33 %	10,00 %	16,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALAPIEDRA	72,73 %	11	54,55 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	11	72,73 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		11	72,73 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
CANTALAPIEDRA	75,00 %	25,00 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTALEJO	89,19 %	37	72,97 %	81,82 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	20	85,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		37	89,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTALEJO	81,82 %	27,27 %	3,03 %	3,03 %	3,03 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	0,14 %	3,94 %

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CANTERAC	87,95 %	83	79,52 %	90,41 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	80,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	45	93,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	92,31 %
TOTAL PACIENTES Otitis		83	87,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTERAC	90,41 %	23,29 %	1,37 %	1,37 %	2,74 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CAPUCHINOS	90,48 %	105	83,81 %	92,63 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CAPUCHINOS	92,63 %	22,11 %	4,21 %	3,16 %	1,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	60	93,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	24	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	24	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		105	90,48 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-02 2025-06

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBAJALES DE ALBA	100,00 %	2	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		2	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CARBAJALES DE ALBA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

CARBALLEDA**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBALLEDA	86,67 %	15	80,00 %	92,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	14	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		15	86,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CARBALLEDA	92,31 %	7,69 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARBONERO	78,48 %	79	65,82 %	83,87 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	47	72,34 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	13	84,62 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		79	78,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
CARBONERO	83,87 %	19,35 %	3,23 %	1,61 %	3,23 %	3,23 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

CARRION DE LOS CONDES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CARRION DE LOS CONDES	88,24 %	34	82,35 %	93,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	28	85,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		34	88,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CARRION DE LOS CONDES	93,33 %	20,00 %	6,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CASA DEL BARCO	88,46 %	52	75,00 %	84,78 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
CASA DEL BARCO	84,78 %	13,04 %	2,17 %	2,17 %	2,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	30	90,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		52	88,46 %

2025-12

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CEBREROS	75,40 %	126	61,11 %	81,05 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	40,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	107	72,90 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		126	75,40 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CEBREROS	81,05 %	17,89 %	3,16 %	4,21 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

CENTRO-GAMAZO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CENTRO-GAMAZO	83,33 %	96	73,96 %	88,75 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	20	60,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	40,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	5	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	59	86,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		96	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CENTRO-GAMAZO	88,75 %	12,50 %	2,50 %	2,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CERVERA DE PISUERGA	78,95 %	38	68,42 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	36	80,56 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		38	78,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CERVERA DE PISUERGA	86,67 %	20,00 %	3,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

CIGALES**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIGALES	95,19 %	104	86,54 %	90,91 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CIGALES	90,91 %	24,24 %	2,02 %	1,01 %	2,02 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	13	84,62 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	35	85,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	36	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	38	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		104	95,19 %

2025-12

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCULAR	87,00 %	100	80,00 %	91,95 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CIRCULAR	91,95 %	12,64 %	9,20 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	62,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	74	93,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		100	87,00 %

2025-12

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIRCUNVALACION	80,34 %	234	74,36 %	92,55 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CIRCUNVALACION	92,55 %	14,89 %	1,06 %	1,06 %	4,26 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	39	5,13 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	159	86,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	82,61 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		234	80,34 %

2025-12

CIUDAD RODRIGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CIUDAD RODRIGO	80,82 %	245	75,10 %	92,93 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	15,79 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	172	86,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	38	71,05 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	27	74,07 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		245	80,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CIUDAD RODRIGO	92,42 %	0,51 %	20,71 %	1,52 %	1,01 %	2,53 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDADO DE TREVIÑO	53,33 %	15	20,00 %	37,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		15	53,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CONDADO DE TREVIÑO	37,50 %	62,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

CONDESA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CONDESA	76,96 %	191	67,02 %	87,07 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CONDESA	87,07 %	18,37 %	0,68 %	4,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	28	21,43 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	88,24 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	109	77,06 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	93,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	25	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		191	76,96 %

2025-12

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CORRALES	78,57 %	14	57,14 %	72,73 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		14	78,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CORRALES	72,73 %	18,18 %	9,09 %	9,09 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRISTOBAL ACOSTA	82,95 %	129	67,44 %	81,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CRISTOBAL ACOSTA	80,37 %	0,93 %	23,36 %	7,48 %	1,87 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	63,64 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	80	85,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	15	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	88,24 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		129	82,95 %

2025-12

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CRUCERO	88,17 %	93	78,49 %	89,02 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CRUCERO	89,02 %	12,20 %	8,54 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	30,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	90,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	62	95,16 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		93	88,17 %

2025-12

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUELLAR	82,67 %	150	71,33 %	86,29 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
CUELLAR	86,29 %	22,58 %	1,61 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	15,79 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	76	78,95 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	33	96,97 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	29	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	71,43 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	150	82,67 %

2025-12

CUENCA DEL BERNESGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
CUENCA DEL BERNESGA	82,35 %	51	70,59 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	39	82,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		51	82,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CUENCA DEL BERNESGA	85,71 %	4,76 %	4,76 %	7,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

DELICIAS I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS I	78,45 %	297	66,33 %	84,55 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
DELICIAS I	84,55 %	9,87 %	0,86 %	12,02 %	1,72 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	25	8,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	24	70,83 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	250	82,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		297	78,45 %

2025-12

DELICIAS II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
DELICIAS II	85,63 %	334	79,04 %	92,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
DELICIAS II	92,31 %	11,19 %	2,45 %	2,10 %	3,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	15,79 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	20	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	295	87,80 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		334	85,63 %

2025-12

EL EJIDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
EL EJIDO	78,28 %	198	75,76 %	96,77 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	42,86 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	16	93,75 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	145	77,93 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	18	72,22 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	14	92,86 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		198	78,28 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
EL EJIDO	96,77 %	10,32 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %	1,29 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

EL ESPINAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
EL ESPINAR	86,89 %	122	80,33 %	92,45 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
EL ESPINAR	92,45 %	16,98 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	77	81,82 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	93,75 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		122	86,89 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ERAS DEL BOSQUE	90,06 %	342	79,24 %	87,99 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ERAS DEL BOSQUE	87,99 %	13,31 %	0,97 %	0,32 %	19,16 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	66,67 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	46	67,39 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	90,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	195	88,21 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	82	96,34 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	48	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		342	90,06 %

2025-12

ESGUEVILLAS**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-06	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESGUEVILLAS	100,00 %	2	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		2	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ESGUEVILLAS	100,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ESPINOSA DE LOS MONTER	63,64 %	22	54,55 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	20	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		22	63,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ESPINOSA DE LOS MONTER	85,71 %	21,43 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FABERO	78,13 %	32	18,75 %	24,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	27	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		32	78,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
FABERO	24,00 %	36,00 %	8,00 %	36,00 %	4,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FONTIVEROS	81,82 %	11	45,45 %	55,56 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	8	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		11	81,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
FONTIVEROS	55,56 %	66,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FROMISTA	85,00 %	20	85,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		20	85,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
FROMISTA	100,00 %	5,88 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTEGUINALDO	100,00 %	5	60,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		5	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
FUENTEGUINALDO	60,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTESAUCO	100,00 %	8	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		8	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
FUENTESAUCO	100,00 %	25,00 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

FUENTES DE OÑORO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-07	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
FUENTES DE OÑORO	60,00 %	5	40,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		5	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
FUENTES DE OÑORO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GAMONAL-ANTIGUA	82,48 %	137	74,45 %	90,27 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	16	93,75 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	88	84,09 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		137	82,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
GAMONAL-ANTIGUA	90,27 %	15,93 %	1,77 %	4,42 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARCIA LORCA	73,83 %	107	71,96 %	97,47 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
GARCIA LORCA	97,47 %	12,66 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	37	72,97 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	26	80,77 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	91,30 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	81,82 %
TOTAL PACIENTES Otitis		107	73,83 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO NORTE	87,34 %	158	80,38 %	92,03 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
GARRIDO NORTE	92,03 %	15,22 %	0,72 %	0,72 %	2,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	90,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	60	81,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	37	94,59 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	54	96,30 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	13	84,62 %
TOTAL PACIENTES Otitis		158	87,34 %

2025-12

GARRIDO SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GARRIDO SUR	78,31 %	295	69,15 %	88,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	33,33 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	40	17,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	5	80,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	149	79,87 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	39	94,87 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	59	89,83 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	15	93,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		295	78,31 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
GARRIDO SUR	88,31 %	15,15 %	2,60 %	2,60 %	0,87 %	0,43 %	2,60 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-11

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GOMARA		2		
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

GEDOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-07	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GEDOS	80,00 %	5	80,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		5	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GEDOS	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUARDO	80,58 %	103	59,22 %	73,49 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
GUARDO	73,49 %	34,94 %	1,20 %	1,20 %	4,82 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	4	75,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	80,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	79	81,01 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		103	80,58 %

2025-12

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUAREÑA	83,33 %	24	70,83 %	85,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	76,47 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		24	83,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
GUAREÑA	85,00 %	25,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

2025-12

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
GUIJUELO	82,81 %	128	69,53 %	83,96 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
GUIJUELO	83,96 %	18,87 %	3,77 %	1,89 %	2,83 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	44,44 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	100	83,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	16	81,25 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		128	82,81 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HERRERA DE PISUERGA	85,00 %	60	75,00 %	88,24 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	43	79,07 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	86,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		60	85,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
HERRERA DE PISUERGA	88,24 %	19,61 %	1,96 %	1,96 %	5,88 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DEL REY	82,44 %	353	67,14 %	81,44 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
HUERTA DEL REY	81,44 %	23,71 %	1,03 %	2,41 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	51,72 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	31	80,65 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	8	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	256	82,81 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	21	85,71 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	12	91,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		353	82,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
HUERTA DE REY	100,00 %	13	38,46 %	38,46 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
HUERTA DE REY	38,46 %	76,92 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	80,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		13	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
IGNACIO LOPEZ SAIZ	87,05 %	139	83,45 %	95,87 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	95,87 %	14,05 %	0,83 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	25	68,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	102	88,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	71,43 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		139	87,05 %

2025-12

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ISCAR	74,44 %	133	62,41 %	83,84 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ISCAR	83,84 %	12,12 %	5,05 %	12,12 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	17	76,47 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	16	43,75 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	9	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	50	70,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	91,30 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	88,89 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		133	74,44 %

2025-12

JARDINILLOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JARDINILLOS	84,21 %	114	74,56 %	88,54 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
JARDINILLOS	87,50 %	1,04 %	20,83 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	97	81,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		114	84,21 %

2025-12

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSE AGUADO	83,06 %	183	71,58 %	86,18 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
JOSE AGUADO	86,18 %	17,76 %	1,32 %	2,63 %	1,97 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	23	95,65 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	115	81,74 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	81,82 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	18	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	72,73 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		183	83,06 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	82,21 %	399	77,19 %	93,90 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	7,41 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	46	69,57 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	17	94,12 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	238	82,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	54	92,59 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	49	93,88 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	15	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		399	82,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLIDOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	93,60 %	0,30 %	14,33 %	0,91 %	2,74 %	5,18 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA ALAMEDILLA	84,13 %	271	66,05 %	78,51 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LA ALAMEDILLA	78,51 %	29,82 %	20,61 %	10,53 %	3,95 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	86	58,14 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	137	82,48 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	70	82,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	67	76,12 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		271	84,13 %

2025-12

LA ALBERCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA ALBERCA	76,19 %	21	57,14 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	16	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	76,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LA ALBERCA	75,00 %	31,25 %	6,25 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

LA CABRERA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-09

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA CABRERA		1		
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
	TOTAL PACIENTES Otitis	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA FUENTE SAN ESTEBAN	88,89 %	27	66,67 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	88,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		27	88,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
LA FUENTE SAN ESTEBAN	75,00 %	29,17 %	4,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

LAGUNA DE DUERO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAGUNA DE DUERO	81,58 %	304	70,07 %	85,89 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	39	10,26 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	30	73,33 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	199	90,45 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	46	89,13 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	19	78,95 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		304	81,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
LAGUNA DE DUERO	85,89 %	21,37 %	1,61 %	2,02 %	0,40 %	1,21 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

LA MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-05	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA MAGDALENA	62,50 %	8	50,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	8	62,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LA MAGDALENA	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

LANZAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LANZAHITA	86,96 %	23	52,17 %	60,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	82,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		23	86,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LANZAHITA	60,00 %	35,00 %	5,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PALOMERA	82,16 %	241	73,44 %	89,39 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	54	62,96 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	88,24 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	107	79,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	47	95,74 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	33	87,88 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		241	82,16 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
LA PALOMERA	89,39 %	14,65 %	1,52 %	2,53 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA PUEBLA	90,20 %	296	79,73 %	88,39 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	34	91,18 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	7	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	168	86,31 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	67	89,55 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	58	87,93 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	77,78 %
TOTAL PACIENTES Otitis		296	90,20 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
LA PUEBLA	88,39 %	23,97 %	2,62 %	1,12 %	0,75 %	1,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

LAS HUELGAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS HUELGAS	83,11 %	148	75,68 %	91,06 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	22	90,91 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	8	25,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	61	85,25 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	31	83,87 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	35	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		148	83,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
LAS HUELGAS	91,06 %	21,14 %	2,44 %	0,81 %	1,63 %	2,44 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

LA SIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-06	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA SIERRA	80,00 %	10	70,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	80,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		10	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LA SIERRA	87,50 %	37,50 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS NAVAS DEL MARQUES	65,63 %	96	62,50 %	95,24 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	16,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	66	63,64 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	57,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	11	90,91 %
TOTAL PACIENTES Otitis		96	65,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
LAS NAVAS DEL MARQUES	95,24 %	7,94 %	1,59 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

2025-12

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LAS TORRES	80,17 %	121	71,90 %	89,69 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LAS TORRES	88,66 %	1,03 %	16,49 %	1,03 %	1,03 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	98	81,63 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	60,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		121	80,17 %

2025-12

LA VICTORIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LA VICTORIA	87,10 %	155	80,65 %	92,59 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LA VICTORIA	92,59 %	17,04 %	0,74 %	2,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	26	84,62 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	83,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	89	85,39 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	84,21 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	24	95,83 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		155	87,10 %

2025-12

LEDESMA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LEDESMA	85,71 %	21	66,67 %	77,78 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	13	84,62 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	85,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LEDESMA	77,78 %	5,56 %	5,56 %	22,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LERMA	76,27 %	59	54,24 %	71,11 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	40	72,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		59	76,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LERMA	71,11 %	35,56 %	2,22 %	4,44 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LINARES DE RIOFRIO	73,08 %	26	61,54 %	84,21 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	22	68,18 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		26	73,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LINARES DE RIOFRIO	84,21 %	21,05 %	5,26 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

2025-12

LOS COMUNEROS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS COMUNEROS	92,86 %	112	86,61 %	93,27 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LOS COMUNEROS	93,27 %	14,42 %	3,85 %	3,85 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	81	95,06 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	80,95 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		112	92,86 %

2025-12

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LOS CUBOS	84,09 %	176	73,86 %	87,84 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	87,84 %	25,00 %	1,35 %	3,38 %	0,68 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %	0,05 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	33	78,79 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	88,24 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	52	86,54 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	44	72,73 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	70,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		176	84,09 %

2025-12

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
LUMBRALES	84,21 %	19	73,68 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	16	87,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		19	84,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LUMBRALES	87,50 %	18,75 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MADRIGAL ALTAS TORRES	20,00 %	10	20,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		10	20,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MADRIGAL ALTAS TORRES	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAGDALENA	92,86 %	56	78,57 %	84,62 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MAGDALENA	84,62 %	19,23 %	3,85 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	28	92,86 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	11	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	56	92,86 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MANSILLA DE LAS MULAS	62,86 %	35	51,43 %	81,82 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MANSILLA DE LAS MULAS	81,82 %	13,64 %	9,09 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	22	54,55 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		35	62,86 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MATALLANA DE TORIO	88,89 %	9	88,89 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	6	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		9	88,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MATALLANA DE TORIO	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

MATILLA DE LOS CAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MATILLA DE LOS CAÑOS	86,36 %	22	54,55 %	63,16 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	18	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		22	86,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
MATILLA DE LOS CAÑOS	63,16 %	36,84 %	5,26 %	5,26 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MAYORGA DE CAMPOS	76,19 %	21	61,90 %	81,25 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	11	72,73 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	76,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MAYORGA DE CAMPOS	81,25 %	6,25 %	12,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DEL CAMPO RURAL	75,00 %	4	25,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
MEDINA DEL CAMPO RURAL	33,33 %	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DEL CAMPO URBANA	86,46 %	288	71,53 %	82,73 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DEL CAMPO URBANA	82,73 %	20,08 %	1,20 %	2,81 %	2,01 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	26	15,38 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	198	88,89 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	31	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	26	96,15 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	80,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		288	86,46 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE POMAR	71,05 %	38	60,53 %	85,19 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	27	66,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		38	71,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
MEDINA DE POMAR	85,19 %	18,52 %	3,70 %	7,41 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MEDINA DE RIOSECO	82,31 %	147	76,87 %	93,39 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DE RIOSECO	93,39 %	9,09 %	0,83 %	0,83 %	10,74 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	31,58 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	81	86,42 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	29	89,66 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	27	85,19 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		147	82,31 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MELGAR DE FERNAMENTAL	80,65 %	31	70,97 %	88,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	79,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		31	80,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MELGAR DE FERNAMENTAL	88,00 %	16,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

2025-12

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIGUEL ARMIJO	83,04 %	171	71,93 %	86,62 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MIGUEL ARMIJO	86,62 %	19,01 %	1,41 %	4,93 %	2,82 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	9,52 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	117	88,03 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	88,24 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	94,12 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		171	83,04 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR	40,00 %	5	20,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		5	40,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MIRANDA DEL CASTAÑAR	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA ESTE	77,65 %	264	67,80 %	87,32 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	16	18,75 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	64,29 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	195	76,92 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	30	76,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	34	79,41 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	57,14 %
TOTAL PACIENTES Otitis		264	77,65 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA ESTE	86,83 %	0,49 %	17,56 %	1,95 %	2,44 %	3,90 %
TOTAL GAP	85,44 %	0,05 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MIRANDA OESTE	93,35 %	316	77,22 %	82,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA OESTE	82,71 %	31,19 %	2,71 %	0,34 %	3,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	26	92,31 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	257	91,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	28	92,86 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	24	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		316	93,35 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOMBELTRAN	87,50 %	16	37,50 %	42,86 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	7	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		16	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MOMBELTRAN	42,86 %	28,57 %	21,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

MOTA DEL MARQUES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05	2025-08
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MOTA DEL MARQUES	100,00 %	4	75,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MOTA DEL MARQUES	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑANA	100,00 %	12	66,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	9	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		12	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MUÑANA	66,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-04 2025-05

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
MUÑICO	100,00 %	2		
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		2	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
MUÑICO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	19,15 %	1,88 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
NAVA DE LA ASUNCION	85,71 %	119	68,07 %	79,41 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
NAVA DE LA ASUNCION	79,41 %	22,55 %	3,92 %	3,92 %	4,90 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	79	83,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	82,35 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	94,12 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		119	85,71 %

2025-12

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
OLVEGA	63,27 %	49	42,86 %	67,74 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	38	71,05 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	33,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		49	63,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
OLVEGA	67,74 %	48,39 %	3,23 %	3,23 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
OSORNO	58,33 %	12	58,33 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	8	62,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	12	58,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
OSORNO	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PALENCIA RURAL	76,47 %	17	76,47 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		17	76,47 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PALENCIA RURAL	100,00 %	7,69 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

PAMPLIEGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-05 2025-06 2025-07 2025-12

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PAMPLIEGA	50,00 %	4	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PAMPLIEGA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARADA DE MOLINO	87,25 %	204	68,63 %	78,65 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PARADA DE MOLINO	78,65 %	24,72 %	3,37 %	5,62 %	5,62 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	79,31 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	137	85,40 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	22	90,91 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	19	89,47 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	14	85,71 %
TOTAL PACIENTES Otitis		204	87,25 %

2025-12

PAREDES DE NAVA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PAREDES DE NAVA	81,58 %	38	78,95 %	96,77 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	34	79,41 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		38	81,58 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PAREDES DE NAVA	96,77 %	9,68 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

2025-12

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PARQUESOL	82,30 %	322	78,57 %	95,47 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	26	30,77 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	44	56,82 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	223	86,55 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	25	76,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	30	86,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		322	82,30 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
PARQUESOL	95,47 %	7,92 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	1,51 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

PEDIATRIA DE AREA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA ESTE	72,78 %	327	60,86 %	83,61 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	32	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	23	78,26 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	220	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	43	81,40 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	26	84,62 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	7	85,71 %
TOTAL PACIENTES Otitis		327	72,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDIATRIA DE AREA ESTE	83,61 %	16,39 %	1,26 %	1,26 %	0,42 %	8,40 %	0,42 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA LEON	85,64 %	202	79,70 %	93,06 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	16	62,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	82,35 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	129	85,27 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	27	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	25	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		202	85,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA LEON	93,06 %	15,03 %	0,58 %	0,58 %	1,16 %	4,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

PEDIATRIA DE AREA SEGC

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA SEGO\	93,22 %	118	68,64 %	73,64 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	79	92,41 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	90,48 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	94,12 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		118	93,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA SEGO\	73,64 %	38,18 %	2,73 %	2,73 %	0,91 %	2,73 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	81,69 %	71	73,24 %	89,66 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	53	77,36 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		71	81,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA ZAMO	89,66 %	13,79 %	5,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEDROSILLO EL RALO	85,71 %	21	66,67 %	77,78 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	42,86 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	70,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	85,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
PEDROSILLO EL RALO	77,78 %	22,22 %	5,56 %	16,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %

2025-12

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑAFIEL	87,06 %	85	65,88 %	75,68 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	67	85,07 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		85	87,06 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PEÑAFIEL	75,68 %	14,86 %	1,35 %	1,35 %	31,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PEÑARANDA DE BRACAMO	87,13 %	101	58,42 %	67,05 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	46	82,61 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	32	93,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	26	92,31 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		101	87,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
PEÑARANDA DE BRACAMO	67,05 %	39,77 %	5,68 %	1,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA NORTE	80,29 %	279	69,18 %	86,16 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
PERIURBANA NORTE	86,16 %	22,32 %	3,13 %	1,79 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	12,50 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	25	84,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	12	91,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	125	78,40 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	64	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	57	89,47 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	14	92,86 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		279	80,29 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PERIURBANA SUR	87,02 %	131	66,41 %	76,32 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	53,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	13	92,31 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	58	89,66 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	80,95 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	21	80,95 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	16	87,50 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		131	87,02 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
PERIURBANA SUR	76,32 %	24,56 %	5,26 %	4,39 %	0,88 %	6,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

PIEDRAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIEDRAHITA	87,50 %	16	62,50 %	71,43 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	13	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		16	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PIEDRAHITA	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PILARICA	81,88 %	160	78,13 %	95,42 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PILARICA	95,42 %	9,16 %	0,76 %	0,76 %	3,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	31	29,03 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	20	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	94	91,49 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	90,48 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	13	76,92 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		160	81,88 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINARES-COVALEDA	84,85 %	33	72,73 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	79,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		33	84,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PINARES-COVALEDA	85,71 %	14,29 %	10,71 %	3,57 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

PINTOR OLIVA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PINTOR OLIVA	68,78 %	394	55,33 %	80,44 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PINTOR OLIVA	80,44 %	20,30 %	1,85 %	9,96 %	4,06 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	127	18,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	88,24 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	11	72,73 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	257	83,27 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	89,47 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	90,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		394	68,78 %

2025-12

PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PISUERGA	86,57 %	581	79,86 %	92,25 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PISUERGA	92,25 %	17,10 %	0,40 %	3,58 %	5,77 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	55	16,36 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	57	80,70 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	9	88,89 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	453	90,51 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	29	93,10 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	25	88,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	40,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	2	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		581	86,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PIZARRALES	78,34 %	217	73,73 %	94,12 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PIZARRALES	94,12 %	18,24 %	2,35 %	1,76 %	0,59 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	41	19,51 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	86,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	79	69,62 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	64	85,94 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	56	89,29 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		217	78,34 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PLAZA DEL EJERCITO	77,88 %	113	73,45 %	94,32 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
PLAZA DEL EJERCITO	94,32 %	6,82 %	2,27 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	20	5,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	86,67 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	62	80,65 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	81,25 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		113	77,88 %

2025-12

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA I	76,09 %	276	34,06 %	44,76 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA I	44,76 %	52,38 %	2,86 %	12,38 %	3,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	94	30,85 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	72,73 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	83	77,11 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	78	93,59 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	82	90,24 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		276	76,09 %

2025-12

PONFERRADA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA II	75,46 %	216	47,69 %	63,19 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA II	63,19 %	31,90 %	3,07 %	12,88 %	6,13 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	24	41,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	42,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	115	73,91 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	43	90,70 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	44	90,91 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		216	75,46 %

2025-12

PONFERRADA III

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA III	63,13 %	179	47,49 %	75,22 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA III	75,22 %	23,01 %	1,77 %	7,08 %	1,77 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	61	21,31 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	8	87,50 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	98	76,53 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	90,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		179	63,13 %

2025-12

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PONFERRADA IV	76,60 %	188	47,34 %	61,81 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	36	41,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	93	70,97 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	47	95,74 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	24	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	83,33 %
TOTAL PACIENTES Otitis		188	76,60 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA IV	61,81 %	26,39 %	1,39 %	15,97 %	6,25 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PORTILLO	80,00 %	40	70,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	16,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	25	84,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		40	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
PORTILLO	87,50 %	28,13 %	3,13 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUENTE DOMINGO FLOREZ	85,71 %	7	57,14 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		7	85,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PUENTE DOMINGO FLOREZ	66,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
PUERTA NUEVA	65,34 %	176	52,27 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	45	26,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	18	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	70	68,57 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	35	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	30	93,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		176	65,34 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PUERTA NUEVA	80,00 %	21,74 %	1,74 %	1,74 %	5,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
QUINTANAR DE LA SIERRA	75,00 %	20	55,00 %	73,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	76,47 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		20	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
QUINTANAR DE LA SIERRA	73,33 %	6,67 %	20,00 %	6,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

RIÑO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIÑO	66,67 %	6	66,67 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	80,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		6	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
RIÑO	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIAZA	69,23 %	39	64,10 %	92,59 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
RIAZA	92,59 %	14,81 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	26	61,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	39	69,23 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ESLA	69,23 %	13	61,54 %	88,89 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	70,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		13	69,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
RIBERA DEL ESLA	88,89 %	11,11 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RIBERA DEL ORBIGO	76,14 %	88	57,95 %	76,12 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
RIBERA DEL ORBIGO	76,12 %	23,88 %	1,49 %	1,49 %	2,99 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	66	71,21 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	85,71 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		88	76,14 %

2025-12

ROA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROA	80,36 %	56	55,36 %	68,89 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	42	78,57 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		56	80,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ROA	68,89 %	40,00 %	6,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

ROBLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-02 2025-05 2025-08 2025-09

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ROBLEDA	100,00 %	4	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ROBLEDA	25,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA I	82,76 %	58	68,97 %	83,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
RONDILLA I	83,33 %	25,00 %	2,08 %	2,08 %	2,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	5	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	47	82,98 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		58	82,76 %

2025-12

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
RONDILLA II	80,15 %	136	70,59 %	88,07 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
RONDILLA II	88,07 %	22,94 %	0,92 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	18	11,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	18	94,44 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	106	85,85 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	5	60,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		136	80,15 %

2025-12

SACRAMENIA**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-09	2025-12
-----------------------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SACRAMENIA	100,00 %	3	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		3	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SACRAMENIA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAHAGUN	86,21 %	29	68,97 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	22	86,36 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		29	86,21 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
SAHAGUN	80,00 %	20,00 %	4,00 %	8,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

SALAS DE LOS INFANTES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALAS DE LOS INFANTES	71,88 %	32	59,38 %	82,61 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	70,83 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	8	62,50 %
TOTAL PACIENTES Otitis		32	71,88 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SALAS DE LOS INFANTES	82,61 %	13,04 %	4,35 %	8,70 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SALDAÑA	70,00 %	60	60,00 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SALDAÑA	85,71 %	19,05 %	14,29 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	52	71,15 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	33,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		60	70,00 %

2025-12

SAN AGUSTIN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN AGUSTIN	85,59 %	229	78,17 %	91,33 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	30,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	10	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	114	85,96 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	63	92,06 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	47	80,85 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	10	60,00 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		229	85,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN AGUSTIN	91,33 %	18,88 %	2,04 %	1,02 %	0,51 %	3,57 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ANDRES DEL RABANEI	78,57 %	224	71,43 %	90,91 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN ANDRES DEL RABANEI	90,91 %	14,20 %	1,70 %	1,70 %	3,41 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	50	30,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	22	81,82 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	111	83,78 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	43	90,70 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	29	96,55 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	4	
TOTAL PACIENTES Otitis		224	78,57 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	85,71 %	28	57,14 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	18	83,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		28	85,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	66,67 %	29,17 %	8,33 %	4,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JOSE	85,16 %	182	80,77 %	94,84 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	10,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	23	73,91 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	133	87,22 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	18	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	93,75 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	85,71 %
TOTAL PACIENTES Otitis		182	85,16 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
SAN JOSE	94,84 %	12,90 %	0,65 %	1,94 %	1,94 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %

2025-12

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN JUAN	83,33 %	108	72,22 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
SAN JUAN	86,67 %	18,89 %	1,11 %	3,33 %	2,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	18,18 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	22	90,91 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	10	80,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	66	84,85 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	6	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		108	83,33 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN LEONARDO DE YAGUE	78,57 %	14	57,14 %	72,73 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	90,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		14	78,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SAN LEONARDO DE YAGUE	72,73 %	54,55 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PABLO	88,64 %	132	81,82 %	92,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN PABLO	92,31 %	17,95 %	0,85 %	0,85 %	6,84 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	23,53 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	12	83,33 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	89	92,13 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	17	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		132	88,64 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO DEL ARROYO	66,67 %	9	44,44 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	5	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		9	66,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SAN PEDRO DEL ARROYO	66,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

SAN PEDRO MANRIQUE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %	5	80,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		5	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SAN PEDRO MANRIQUE	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA CLARA	82,26 %	124	75,81 %	92,16 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA CLARA	92,16 %	12,75 %	0,98 %	4,90 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	16,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	26	88,46 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	82	85,37 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	124	82,26 %

2025-12

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA ELENA	81,32 %	182	70,88 %	87,16 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA ELENA	87,16 %	14,86 %	0,68 %	1,35 %	4,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	23	60,87 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	20	95,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	108	81,48 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	23	91,30 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	81,25 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	33,33 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		182	81,32 %

2025-12

SANTA MARIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARIA	85,51 %	69	75,36 %	88,14 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA MARIA	88,14 %	10,17 %	3,39 %	1,69 %	5,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	50,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	57	85,96 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		69	85,51 %

2025-12

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SANTA MARTA	88,24 %	187	79,68 %	90,30 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	42,11 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	16	93,75 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	93	88,17 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	27	96,30 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	38	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	16	93,75 %
	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		187	88,24 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARTA	90,30 %	12,12 %	3,03 %	3,03 %	3,03 %	0,61 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SAYAGO	64,29 %	14	50,00 %	77,78 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	60,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		14	64,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
SAYAGO	77,78 %	33,33 %	11,11 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %

SEDANO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-03 2025-11

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEDANO	50,00 %	2	50,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	1	
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		2	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SEDANO	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA I	84,80 %	250	74,80 %	88,21 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA I	88,21 %	16,98 %	2,36 %	2,83 %	6,60 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	209	87,08 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	11	90,91 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		250	84,80 %

2025-12

SEGOVIA II

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA II	86,59 %	261	78,93 %	91,15 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	15	20,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	19	84,21 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	99	79,80 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	80	93,75 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	71	97,18 %
	Otitis media, no especificada, bilateral	17	88,24 %
TOTAL PACIENTES Otitis		261	86,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA II	91,15 %	15,04 %	3,98 %	1,33 %	0,88 %	3,54 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA III	80,83 %	193	72,02 %	89,10 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA III	89,10 %	12,18 %	0,64 %	7,69 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	9	88,89 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	129	80,62 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	24	87,50 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	18	94,44 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	9	77,78 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		193	80,83 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEGOVIA RURAL	81,23 %	261	72,03 %	88,68 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA RURAL	88,68 %	12,26 %	0,47 %	2,83 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	4,76 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	178	78,65 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	30	93,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	35	97,14 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	60,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		261	81,23 %

2025-12

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SEPULVEDA	96,67 %	30	76,67 %	79,31 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	25	96,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		30	96,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS
SEPULVEDA	79,31 %	20,69 %	6,90 %	10,34 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

SORIA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA NORTE	83,54 %	164	70,73 %	84,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA NORTE	84,67 %	20,44 %	0,73 %	0,73 %	2,19 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	0,14 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	10	30,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	28	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	98	80,61 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	18	94,44 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	91,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		164	83,54 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA RURAL	61,62 %	99	51,52 %	83,61 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA RURAL	83,61 %	13,11 %	3,28 %	3,28 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	44	27,27 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	54	79,63 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		99	61,62 %

2025-12

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA SUR	75,23 %	218	66,06 %	87,80 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA SUR	87,80 %	19,51 %	1,22 %	1,83 %	3,05 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	29	24,14 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	17	88,24 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	117	71,79 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	36	88,89 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	38	89,47 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	7	42,86 %
TOTAL PACIENTES Otitis		218	75,23 %

2025-12

SORIA TARDE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SORIA TARDE	79,31 %	58	75,86 %	95,65 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	8	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	45	91,11 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		58	79,31 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
SORIA TARDE	95,65 %	17,39 %	4,35 %	2,17 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SOTILLO DE LA ADRADA	61,90 %	126	34,92 %	56,41 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	2	50,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	33,33 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	94	57,45 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	14	64,29 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	88,89 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
	Otitis media aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		126	61,90 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	56,41 %	29,49 %	1,28 %	1,28 %	1,28 %	17,95 %	2,56 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,08 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
SUR	73,85 %	218	66,51 %	90,06 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	30	13,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	33	72,73 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	134	81,34 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	17	94,12 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	6	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		218	73,85 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SUR	90,06 %	11,18 %	3,73 %	0,62 %	1,86 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

TABARA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TABARA	86,96 %	23	56,52 %	65,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	17	82,35 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		23	86,96 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TABARA	65,00 %	35,00 %	10,00 %	5,00 %	15,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-05	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TAMAMES	80,00 %	10	70,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	8	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		10	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
TAMAMES	87,50 %	25,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TEJARES	85,65 %	209	78,95 %	92,18 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TEJARES	92,18 %	16,76 %	2,23 %	4,47 %	0,56 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	21	23,81 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	13	84,62 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	162	87,04 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	83,33 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	12	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	4	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		209	85,65 %

2025-12

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORDESILLAS	79,00 %	100	73,00 %	92,41 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TORDESILLAS	92,41 %	7,59 %	1,27 %	5,06 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	87	79,31 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	5	80,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	
TOTAL PACIENTES Otitis		100	79,00 %

2025-12

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORENO	100,00 %	20	90,00 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	7	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		20	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
TORENO	90,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORO	58,18 %	110	50,00 %	85,94 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	13	23,08 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	91	60,44 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		110	58,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TORO	85,94 %	17,19 %	1,56 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORQUEMADA	81,82 %	33	75,76 %	92,59 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TORQUEMADA	92,59 %	11,11 %	3,70 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	24	87,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	66,67 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		33	81,82 %

2025-12

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TORTOLA	75,19 %	133	69,17 %	92,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TORTOLA	92,00 %	11,00 %	3,00 %	1,00 %	4,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	17	23,53 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	18	77,78 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	4	75,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	65	80,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	19	89,47 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	15	73,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	90,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		133	75,19 %

2025-12

TROBAJO DEL CAMINO - V

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TROBAJO DEL CAMINO - VA	88,17 %	93	83,87 %	95,12 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	15	80,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	68	89,71 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		93	88,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TROBAJO DEL CAMINO - VA	95,12 %	13,41 %	1,22 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

2025-12

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
TUDELA	83,78 %	185	71,35 %	85,16 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TUDELA	85,16 %	21,29 %	1,29 %	5,81 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	23	52,17 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	92,86 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	8	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	151	84,11 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	5	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		185	83,78 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
UNIVERSIDAD CENTRO	77,27 %	66	60,61 %	78,43 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
UNIVERSIDAD CENTRO	78,43 %	29,41 %	3,92 %	3,92 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	19	31,58 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	3	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	39	89,74 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		66	77,27 %

2025-12

VALDERAS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALDERAS	85,00 %	20	65,00 %	76,47 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	86,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		20	85,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
VALDERAS	76,47 %	29,41 %	5,88 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %

VALENCIA DE DON JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALENCIA DE DON JUAN	86,11 %	108	51,85 %	60,22 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VALENCIA DE DON JUAN	60,22 %	47,31 %	3,23 %	1,08 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	9	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	13	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	51	84,31 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	27	81,48 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	16	87,50 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		108	86,11 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL I	88,89 %	135	77,04 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLADOLID RURAL I	86,67 %	25,83 %	0,83 %	0,83 %	1,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	18	94,44 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	66,67 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	78	91,03 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	21	90,48 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	21	90,48 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		135	88,89 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLADOLID RURAL II	85,48 %	186	82,26 %	96,23 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLADOLID RURAL II	0,63 %	96,23 %	14,47 %	1,89 %
TOTAL GAP	0,00 %	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	27	7,41 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	14	92,86 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	152	95,39 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		186	85,48 %

2025-12

VALLE DE LOSA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-09 2025-11

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE LOSA	50,00 %	2	50,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		2	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALLE DE LOSA	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE MENA	54,05 %	37	45,95 %	85,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	31	51,61 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		37	54,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLE DE MENA	85,00 %	20,00 %	5,00 %	5,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,14 %	3,94 %

2025-12

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-04 2025-05 2025-09

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE TOBALINA	60,00 %	5	60,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		5	60,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALLE DE TOBALINA	100,00 %
TOTAL GAP	85,44 %

VALLE DE VALDEBEZANA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VALLE DE VALDEBEZANA	75,00 %	4	50,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		4	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VALLE DE VALDEBEZANA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

VENTA DE BAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VENTA DE BAÑOS	74,07 %	135	68,15 %	92,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	11	27,27 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	6	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	6	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	104	75,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	9	77,78 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	7	85,71 %
TOTAL PACIENTES Otitis		135	74,07 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	92,00 %	11,00 %	3,00 %	1,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %	0,05 %

2025-12

VIDRIALES**Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIDRIALES	100,00 %	11	81,82 %	81,82 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		11	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VIDRIALES	81,82 %	27,27 %	9,09 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLABLINO	87,50 %	72	36,11 %	41,27 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	5	60,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	65	89,23 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		72	87,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLABLINO	41,27 %	23,81 %	1,59 %	38,10 %	1,59 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

VILLACASTIN

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLACASTIN	55,56 %	18	50,00 %	90,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	14	50,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES Otitis	18	55,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VILLACASTIN	90,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLADA	50,00 %	4	50,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	25,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		4	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLADA	100,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	85,44 %	3,94 %

VILLADIEGO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLADIEGO	100,00 %	14	85,71 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	10	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		14	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLADIEGO	85,71 %	21,43 %	7,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

VILLAFRANCA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRANCA	69,84 %	63	65,08 %	93,18 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAFRANCA	93,18 %	9,09 %	11,36 %	2,27 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	60	68,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	2	50,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
H73.019	Miringitis bullosa, oído no especificado	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		63	69,84 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAFRECHOS	75,00 %	20	50,00 %	66,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	73,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		20	75,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAFRECHOS	66,67 %	20,00 %	13,33 %	6,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	2,38 %	3,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLALON DE CAMPOS	78,95 %	19	68,42 %	86,67 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	12	83,33 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	1	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	6	83,33 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		19	78,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLALON DE CAMPOS	86,67 %	13,33 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

2025-12

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLALPANDO	90,48 %	21	66,67 %	73,68 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	16	87,50 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		21	90,48 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
VILLALPANDO	73,68 %	21,05 %	5,26 %	5,26 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %

VILLAMURIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLAMURIEL	74,02 %	127	58,27 %	78,72 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAMURIEL	78,72 %	12,77 %	1,06 %	6,38 %	14,89 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	2,38 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	33,33 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	97	76,29 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	8	75,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	12	50,00 %
H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado	1	100,00 %
H70.90	Mastoiditis no especificada, oído no especificado	1	
TOTAL PACIENTES Otitis		127	74,02 %

2025-12

VILLARCAYO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARCAYO	80,00 %	35	60,00 %	75,00 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	27	81,48 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	3	66,67 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		35	80,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLARCAYO	75,00 %	25,00 %	3,57 %	7,14 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

2025-12

VILLARRAMIEL

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2025-06	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLARRAMIEL	77,78 %	9	66,67 %	85,71 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	1	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	2	50,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	4	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	2	
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		9	77,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VILLARRAMIEL	85,71 %	14,29 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VILLORIA	74,55 %	55	65,45 %	87,80 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLORIA	87,80 %	17,07 %	7,32 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.199	Otros tipos de otitis media no supurativa aguda, oído no especificado	3	100,00 %
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	7	14,29 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	31	67,74 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	8	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		55	74,55 %

2025-12

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VIRGEN CONCHA	86,58 %	231	80,95 %	93,50 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
VIRGEN CONCHA	93,50 %	12,50 %	0,50 %	2,50 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	0,14 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	22	27,27 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	11	81,82 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	3	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	148	90,54 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	32	96,88 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	23	78,26 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	10	80,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		231	86,58 %

2025-12

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
VITIGUDINO	85,19 %	54	70,37 %	82,61 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VITIGUDINO	82,61 %	15,22 %	2,17 %	4,35 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	14	28,57 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	4	75,00 %
H66.40	Otitis media supurativa, no especificada, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	19	89,47 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	12	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES Otitis		54	85,19 %

2025-12

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ZAMORA NORTE	87,10 %	31	70,97 %	81,48 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	3	66,67 %
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	1	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	15	86,67 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	7	100,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	9	77,78 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	3	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		31	87,10 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ZAMORA NORTE	85,19 %	18,52 %	7,41 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	3,94 %

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Otitis Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	% Pac Otitis J01	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01CE y J01CA04	% Pac Otitis J01CE y J01CA04 vs J01
ZAMORA SUR	87,18 %	39	74,36 %	85,29 %
TOTAL GAP	81,22 %	24.765	69,44 %	85,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Otitis	% Pac Otitis J01
H65.90	Otitis media no supurativa no especificada, oído no especificado	1	
H66.009	Otitis media supurativa aguda sin rotura espontánea de tímpano, oído no especificado	2	100,00 %
H66.90	Otitis media, no especificada, oído no especificado	21	80,95 %
H66.91	Otitis media, no especificada, oído derecho	10	90,00 %
H66.92	Otitis media, no especificada, oído izquierdo	10	100,00 %
H66.93	Otitis media, no especificada, bilateral	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES Otitis		39	87,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Otitis tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ZAMORA SUR	85,29 %	26,47 %	2,94 %	5,88 %
TOTAL GAP	85,44 %	19,15 %	1,88 %	3,94 %

