

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

Gerencia AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GAP ÁVILA	9.606	88,90 %	10.806
GAP BURGOS	18.850	87,08 %	21.646
GAP LEÓN	19.688	90,56 %	21.740
GAP EL BIERZO	8.735	90,49 %	9.653
GAP PALENCIA	8.357	84,83 %	9.852
GAP SALAMANCA	21.486	89,86 %	23.911
GAP SEGOVIA	7.597	86,73 %	8.759
GAP SORIA	5.675	88,07 %	6.444
GAP VALLADOLID OESTE	12.953	87,01 %	14.886
GAP VALLADOLID ESTE	15.431	88,97 %	17.345
GAP ZAMORA	9.630	87,80 %	10.968
TOTAL GRS	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	109,00	14 a 59	60 a 69	=+70
GAP ÁVILA		92,55 %	86,08 %	86,02 %
GAP BURGOS		91,76 %	81,08 %	84,15 %
GAP LEÓN	100,00 %	95,17 %	87,69 %	86,81 %
GAP EL BIERZO		94,48 %	85,76 %	88,05 %
GAP PALENCIA		91,55 %	78,54 %	81,07 %
GAP SALAMANCA	100,00 %	93,47 %	85,50 %	87,85 %
GAP SEGOVIA		91,46 %	80,72 %	83,73 %
GAP SORIA		92,61 %	81,99 %	85,93 %
GAP VALLADOLID OESTE		91,80 %	80,86 %	82,87 %
GAP VALLADOLID ESTE		93,13 %	84,18 %	86,15 %
GAP ZAMORA		92,77 %	82,89 %	85,15 %
TOTAL GRS	100,00 %	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	823	80,92 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	19	42,11 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	266	77,44 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	160	18,13 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	108	25,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	46	34,78 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	241	20,75 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	16	68,75 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	94	13,83 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	97	14,43 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	295	4,41 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4.523	96,31 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	106	25,47 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	160	76,25 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6.606	95,08 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	32	28,13 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	127	4,72 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	388	24,48 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	18	27,78 %
N36.2	Carúncula uretral	66	9,09 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	47	29,79 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	125.866	97,90 %
	TOTAL PACIENTES ITU	136.111	96,99 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA	0,05 %	4,15 %			9,80 %	0,10 %	31,12 %	9,70 %	13,23 %	0,41 %	0,10 %	0,31 %	40,25 %	4,20 %	28,79 %
GAP BURGOS	0,44 %	1,13 %	0,05 %		6,31 %	0,08 %	43,95 %	13,49 %	7,16 %	0,46 %	0,13 %	0,18 %	33,32 %	3,71 %	32,42 %
GAP LEÓN	0,28 %	1,63 %	0,30 %	0,03 %	5,61 %	0,19 %	42,11 %	12,13 %	9,37 %	0,58 %	0,22 %	0,36 %	35,42 %	5,72 %	31,67 %
GAP EL BIERZO	0,24 %	1,35 %	0,12 %	0,18 %	10,35 %	0,24 %	43,86 %	6,17 %	14,40 %	0,24 %	0,18 %		35,63 %	2,94 %	22,87 %
GAP PALENCIA	0,43 %	4,27 %	0,05 %		6,44 %	0,16 %	36,72 %	11,36 %	11,52 %	0,16 %	0,11 %	0,11 %	32,56 %	3,52 %	30,67 %
GAP SALAMANCA	0,20 %	5,07 %	0,02 %	0,04 %	5,79 %	0,11 %	38,91 %	18,75 %	12,52 %	0,72 %		0,83 %	32,92 %	2,91 %	26,73 %
GAP SEGOVIA	0,26 %	3,90 %	0,06 %		12,66 %	0,26 %	46,62 %	7,99 %	10,32 %	0,52 %	0,06 %	0,19 %	30,45 %	2,73 %	24,03 %
GAP SORIA	0,73 %	4,87 %	0,08 %		7,64 %	0,65 %	37,77 %	11,21 %	10,89 %	0,57 %	0,16 %	2,76 %	36,31 %	4,39 %	34,20 %
GAP VALLADOLID OESTE	0,35 %	2,46 %	0,04 %		3,93 %		41,18 %	10,29 %	12,06 %	0,69 %	0,13 %	0,39 %	33,15 %	2,38 %	29,65 %
GAP VALLADOLID ESTE	0,40 %	3,13 %	0,03 %	0,03 %	7,22 %	0,10 %	27,66 %	21,34 %	12,98 %	0,50 %	0,13 %	0,13 %	41,48 %	1,66 %	25,33 %
GAP ZAMORA	0,28 %	3,63 %			7,46 %	0,19 %	33,55 %	20,34 %	13,64 %	0,42 %		0,47 %	32,70 %	1,98 %	28,22 %
TOTAL GRS	0,32 %	3,11 %	0,08 %	0,03 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EA / TRIMETOPRIMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA	0,03 %	3,18 %	0,10 %		5,16 %	0,17 %	22,71 %	3,99 %		5,74 %	0,35 %	0,10 %	0,01 %	15,90 %	5,83 %	71,59 %
GAP BURGOS	0,03 %	1,07 %	0,02 %	0,01 %	2,20 %	0,05 %	31,78 %	4,67 %	0,01 %	3,27 %	0,16 %	0,01 %	0,05 %	10,76 %	5,23 %	74,19 %
GAP LEÓN	0,07 %	1,48 %	0,23 %	0,02 %	2,43 %	0,08 %	34,93 %	4,13 %	0,01 %	4,61 %	0,24 %	0,26 %	0,05 %	13,98 %	6,75 %	69,77 %
GAP EL BIERZO		1,56 %	0,07 %		5,15 %	0,24 %	43,05 %	1,71 %		6,45 %	0,13 %	0,03 %	0,01 %	16,66 %	5,12 %	59,84 %
GAP PALENCIA	0,06 %	2,95 %			3,12 %	0,17 %	27,04 %	2,50 %		6,64 %	0,20 %	0,06 %	0,06 %	13,41 %	5,79 %	71,76 %
GAP SALAMANCA	0,04 %	4,20 %	0,01 %	0,06 %	3,06 %	0,22 %	34,80 %	5,26 %	0,01 %	8,02 %	0,22 %	0,01 %	0,14 %	9,69 %	7,91 %	67,65 %
GAP SEGOVIA	0,02 %	2,77 %		0,02 %	6,87 %	0,41 %	31,09 %	2,34 %		6,42 %	0,15 %	0,05 %	0,02 %	9,66 %	5,48 %	71,54 %
GAP SORIA	0,05 %	3,69 %	0,02 %	0,05 %	4,03 %	0,29 %	31,66 %	2,95 %		5,09 %	0,11 %		0,99 %	15,14 %	5,67 %	71,58 %
GAP VALLADOLID OESTE	0,06 %	1,71 %	0,01 %	0,01 %	1,41 %	0,13 %	26,67 %	1,87 %		7,34 %	0,16 %	0,05 %	0,19 %	7,32 %	6,44 %	77,63 %
GAP VALLADOLID ESTE	0,02 %	1,50 %	0,03 %	0,02 %	3,39 %	0,09 %	19,23 %	7,82 %		5,28 %	0,17 %	0,03 %	0,05 %	14,61 %	4,98 %	76,33 %
GAP ZAMORA	0,03 %	2,64 %			3,20 %	0,19 %	27,51 %	8,15 %		7,42 %	0,21 %	0,01 %	0,24 %	9,45 %	4,70 %	72,43 %
TOTAL GRS	0,04 %	2,32 %	0,06 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	0,00 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
AGREDA	274	89,84 %	305
AGUILAR DE CAMPOO	499	84,86 %	588
ALAEJOS	198	89,59 %	221
ALBA DE TORMES	991	89,44 %	1.108
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	315	94,03 %	335
ALISTE	320	89,14 %	359
ALMAZAN	387	86,77 %	446
ALTA SANABRIA	36	85,71 %	42
ANTONIO GUTIERREZ	2.105	90,89 %	2.316
ARANDA NORTE	1.042	87,86 %	1.186
ARANDA RURAL	560	89,60 %	625
ARANDA SUR	976	87,07 %	1.121
ARCOS DE JALON	233	89,96 %	259
ARENAS DE SAN PEDRO	712	92,59 %	769
AREVALO	1.029	89,79 %	1.146
ARMUNIA	841	90,04 %	934
ARTURO EYRIES	952	85,53 %	1.113
ASTORGA I	918	89,56 %	1.025
ASTORGA II	298	87,65 %	340
AVILA ESTACION	902	89,93 %	1.003
AVILA NORTE	570	85,33 %	668
AVILA RURAL	577	89,18 %	647
AVILA SUR ESTE	838	86,93 %	964

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	823	80,92 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	19	42,11 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	266	77,44 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	160	18,13 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	108	25,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	46	34,78 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	241	20,75 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	16	68,75 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	94	13,83 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	97	14,43 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	295	4,41 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4.523	96,31 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	106	25,47 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	160	76,25 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6.606	95,08 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	32	28,13 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	127	4,72 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	388	24,48 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	18	27,78 %
N36.2	Carúncula uretral	66	9,09 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	47	29,79 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	125.866	97,90 %
TOTAL PACIENTES ITU		136.111	96,99 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

BALTANAS		205	89,52 %		229											
BAÑEZA I	Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BAÑEZA II																
BARCO DE AVILA																
BARRIO DE SAN JUAN																
BEJAR																
BEORADO																
BEMBIBRE																
BENAVENTE NORTE																
AGREDA		4,84 %			6,45 %		48,39 %	1,61 %	9,68 %	1,61 %		6,45 %	38,71 %	3,23 %	32,26 %	
AGUILAR DE CAMPOO	0,91 %	1,82 %			11,82 %		41,82 %	3,64 %	9,09 %				37,27 %	5,45 %	27,27 %	
ALAEJOS					21,28 %		42,55 %	19,15 %	19,15 %				42,55 %		21,28 %	
ALBA DE TORMES	0,47 %	3,76 %			5,16 %		42,25 %	23,94 %	11,27 %	1,41 %		1,41 %	35,68 %	2,35 %	30,05 %	
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	1,20 %	7,23 %			26,51 %		28,92 %	7,23 %	8,43 %	1,20 %			48,19 %	2,41 %	26,51 %	
ALISTE		4,40 %			9,89 %		27,47 %	10,99 %	14,29 %	1,10 %			31,87 %	5,49 %	40,66 %	
ALMAZAN		4,17 %			9,38 %		33,33 %	6,25 %	8,33 %			4,17 %	30,21 %	7,29 %	41,67 %	
ALTA SANABRIA					9,09 %			9,09 %	9,09 %	9,09 %			54,55 %		45,45 %	
ANTONIO GUTIERREZ	0,30 %	2,44 %	0,30 %		6,71 %	0,61 %	47,56 %	15,24 %	7,93 %	0,91 %		0,30 %	25,91 %	3,96 %	26,22 %	
ARANDA NORTE		0,93 %			4,19 %	0,47 %	45,12 %	16,28 %	11,63 %	0,47 %			29,30 %	1,40 %	29,77 %	
ARANDA RURAL		3,60 %			5,04 %	0,72 %	39,57 %	10,79 %	10,07 %		1,44 %		36,69 %	0,72 %	35,97 %	

CANTALAPIEDRA	Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS	
CANTALEJO																	
CANTERAC																	
CAPISQUE																	
CARBAJAL DE ALBA																	
CARBALLEDA																	
CARBONERO																	
CARRION DE LOS CONDES																	
ARANDA SUR	0,51 %	1,02 %			6,60 %	0,51 %	38,07 %	14,21 %	9,14 %	0,51 %		0,51 %	36,04 %	3,05 %	41,12 %		
ARCOS DE JALON		5,88 %			11,76 %		39,22 %	9,80 %	7,84 %	1,96 %		3,92 %	31,37 %	3,92 %	43,14 %		
ARENAS DE SAN PEDRO		3,97 %			8,73 %		32,54 %	6,35 %	8,73 %		0,79 %	0,79 %	37,30 %	4,76 %	47,62 %		
AREVALO		4,17 %			17,59 %		46,30 %	7,87 %	8,33 %	0,93 %	0,46 %	0,46 %	40,28 %	5,09 %	23,61 %		
ARMUNIA		3,39 %			5,08 %	0,56 %	33,33 %	5,08 %	8,47 %	1,13 %		1,13 %	37,85 %	5,65 %	38,42 %		
ARTURO EYRIES			0,58 %		3,49 %		41,86 %	18,02 %	11,05 %	1,16 %			30,23 %	2,91 %	22,67 %		
ASTORGA I	1,18 %	2,35 %			3,53 %	1,76 %	46,47 %	4,12 %	8,82 %			0,59 %	44,71 %	2,94 %	27,65 %		
ASTORGA II					6,15 %	1,54 %	32,31 %	3,08 %	9,23 %				50,77 %	1,54 %	36,92 %		
AVILA ESTACION		1,37 %			10,96 %		39,73 %	10,96 %	16,44 %				39,73 %	7,53 %	23,97 %		
AVILA NORTE		4,04 %			5,05 %		32,32 %	14,14 %	20,20 %			2,02 %	43,43 %	3,03 %	13,13 %		
AVILA RURAL		4,96 %			9,93 %		21,99 %	6,38 %	12,77 %	1,42 %			43,97 %	2,84 %	34,04 %		
AVILA SUR ESTE		4,48 %			11,19 %		37,31 %	15,67 %	13,43 %	0,75 %			34,33 %	2,99 %	16,42 %		
AVILA SUR OESTE		3,33 %			6,67 %		38,33 %	12,50 %	19,17 %			1,67 %	37,50 %	2,50 %	16,67 %		
BABIA							27,27 %	27,27 %	9,09 %				36,36 %		27,27 %		
BALTANAS		2,00 %	2,00 %		4,00 %		52,00 %		24,00 %				24,00 %		30,00 %		
BAÑEZA I		0,57 %	0,57 %		7,39 %		35,80 %	12,50 %	5,11 %		0,57 %		36,36 %	6,25 %	36,93 %		
BAÑEZA II		0,59 %	0,59 %		7,10 %		34,91 %	7,10 %	9,47 %				44,38 %	6,51 %	28,99 %		
BARCO DE AVILA		11,29 %			8,06 %		25,81 %	6,45 %	11,29 %				40,32 %	4,84 %	29,03 %		
BARRIO ESPAÑA		1,89 %			13,21 %		30,19 %	32,08 %	5,66 %				52,83 %		7,55 %		
BEJAR		7,57 %			3,95 %		36,84 %	26,97 %	10,20 %	0,66 %		0,66 %	30,26 %	2,63 %	28,29 %		
BEORADO					16,90 %		59,15 %	5,63 %	7,04 %				18,31 %	4,23 %	36,62 %		
BEMBIBRE	0,46 %	0,46 %		0,46 %	5,56 %		45,37 %	12,50 %	23,15 %				37,96 %	3,70 %	12,50 %		
BENAVENTE NORTE		4,90 %			7,69 %		29,37 %	28,67 %	16,08 %				30,07 %	2,80 %	25,87 %		
BENAVENTE SUR		2,65 %			5,29 %		26,98 %	21,69 %	12,17 %			0,53 %	36,51 %	2,12 %	30,69 %		
BERLANGA DE DUERO					4,17 %		45,83 %		16,67 %			12,50 %	20,83 %	4,17 %	50,00 %		
BOÑAR					8,77 %		19,30 %	28,07 %	7,02 %				28,07 %	5,26 %	64,91 %		
BRIVIESCA	1,74 %				6,09 %		50,43 %	9,57 %	4,35 %			0,87 %	27,83 %	1,74 %	31,30 %		
BURGO DE OSMÁ	0,88 %	2,65 %			9,73 %		35,40 %	12,39 %	23,01 %	0,88 %	0,88 %	7,96 %	44,25 %	7,08 %	27,43 %		
BURGOHONDO		4,00 %			5,33 %	1,33 %	32,00 %	2,67 %	10,67 %				42,67 %	4,00 %	36,00 %		
BURGOS RURAL NORTE	1,05 %	3,16 %			4,21 %		44,21 %	22,11 %	3,16 %				31,58 %	1,05 %	35,79 %		
BURGOS RURAL SUR		1,25 %			3,13 %		43,13 %	13,75 %	9,38 %	0,63 %			22,50 %	5,63 %	40,00 %		
CACABELOS		0,99 %			9,85 %		48,28 %	1,97 %	11,33 %	0,49 %			34,98 %	1,97 %	28,57 %		
CALZADA DE VALDUNCIEL					10,81 %		29,73 %	10,81 %	24,32 %				16,22 %	2,70 %	37,84 %		
CAMARZANA DE TERA		8,00 %			2,67 %		29,33 %	29,33 %	12,00 %			1,33 %	22,67 %		50,67 %		
CAMPOS LAMPREANA		11,11 %			7,41 %		40,74 %	37,04 %	9,26 %				11,11 %	5,56 %	18,52 %		
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS		7,14 %			7,14 %		25,71 %	20,00 %	12,86 %			1,43 %	37,14 %		15,71 %		
CANDELEDA		4,08 %			11,22 %		11,22 %	4,08 %	5,10 %	1,02 %			55,10 %	7,14 %	34,69 %		
CANTALAPIEDRA		6,90 %			6,90 %		27,59 %	13,79 %	13,79 %				60,34 %	6,90 %	15,52 %		
CANTALEJO		2,41 %			18,07 %		46,99 %	10,84 %	9,64 %				30,12 %	6,02 %	31,33 %		

LA ALAMEDILLA	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
LA ALBERCA															
LA CABRERA															
LA FERIA SAN JUAN															
LAGUNA DE OBRAJO															
LA MAGDALENA															
LANZAHITA															
LA PALOMERA															
CANTERAC	1,71 %	4,27 %	0,85 %		5,13 %		23,08 %	26,50 %	14,53 %				35,90 %		26,50 %
CAPUCHINOS		5,74 %			5,74 %		33,61 %	13,93 %	7,38 %			0,82 %	28,69 %	0,82 %	43,44 %
CARBAJALES DE ALBA					4,55 %		18,18 %	4,55 %	31,82 %				63,64 %		13,64 %
CARBALLEDA	1,59 %	4,76 %			4,76 %		47,62 %	3,17 %	25,40 %				28,57 %	6,35 %	42,86 %
CARBONERO		3,47 %			21,53 %		47,22 %	6,94 %	4,86 %			0,69 %	29,17 %	2,78 %	31,25 %
CARRION DE LOS CONDES		4,11 %					28,77 %	26,03 %	12,33 %				26,03 %	8,22 %	42,47 %
CASA DEL BARCO	1,05 %	1,05 %			4,21 %		36,84 %	10,53 %	8,42 %	1,05 %		1,05 %	33,68 %	3,16 %	31,58 %
CEBREROS		1,59 %			6,35 %		30,16 %	8,73 %	10,32 %				39,68 %	1,59 %	42,86 %
CENTRO-GAMAZO	0,74 %	2,96 %			6,67 %		22,22 %	16,30 %	10,37 %	1,48 %			45,93 %	0,74 %	17,04 %
CERVERA DE PISUERGA	1,75 %	3,51 %			8,77 %		43,86 %	10,53 %					29,82 %	3,51 %	38,60 %
CIGALES	1,10 %	3,30 %			7,69 %		29,67 %	29,67 %	13,19 %	1,10 %	2,20 %		37,36 %		18,68 %
CIRCULAR	0,69 %	4,14 %			7,59 %		31,03 %	20,69 %	11,03 %	0,69 %			48,28 %	0,69 %	17,24 %
CIRCUNVALACION	0,68 %	4,76 %			10,20 %		19,05 %	27,21 %	9,52 %	2,04 %			35,37 %	2,72 %	23,81 %
CISTIerna	1,04 %	3,13 %	1,04 %		10,42 %		43,75 %	6,25 %	10,42 %	1,04 %			25,00 %	9,38 %	47,92 %
CIUDAD RODRIGO		4,26 %			6,81 %		48,51 %	19,15 %	10,21 %	1,70 %		0,85 %	30,64 %	2,13 %	17,02 %
CONDADO DE TREVIÑO		4,17 %			25,00 %		20,83 %	12,50 %					41,67 %	4,17 %	16,67 %
CONDESA	0,60 %	1,20 %	0,60 %		4,82 %		43,98 %	12,65 %	10,84 %			0,60 %	39,16 %	8,43 %	31,93 %
CORRALES		8,93 %			12,50 %		30,36 %	12,50 %	12,50 %				41,07 %	1,79 %	35,71 %
CRISTOBAL ACOSTA	0,76 %				7,58 %		53,03 %	14,39 %	8,33 %				29,55 %	5,30 %	34,09 %
CRUCERO		1,96 %			9,80 %		44,12 %	8,82 %	3,92 %	0,98 %			15,69 %	4,90 %	41,18 %
CUELLAR		4,58 %	0,65 %		16,34 %		47,71 %	5,23 %	11,76 %	1,96 %			30,72 %	3,27 %	23,53 %
CUENCA DEL BERNESGA		1,60 %			8,80 %		35,20 %	8,00 %	14,40 %	0,80 %	0,80 %		38,40 %	5,60 %	32,00 %
DELICIAS I		2,87 %			1,23 %		36,89 %	8,20 %	7,38 %	0,41 %		0,41 %	34,02 %	2,46 %	34,02 %
DELICIAS II	0,63 %	3,14 %			3,14 %		50,31 %	8,18 %	7,55 %			0,63 %	31,45 %	1,89 %	37,11 %
EL EJIDO		1,09 %	0,55 %		3,83 %		32,79 %	14,75 %	11,48 %	0,55 %			32,24 %	7,65 %	30,60 %
EL ESPINAR		3,37 %			6,74 %		37,08 %	10,11 %	6,74 %				32,58 %	5,62 %	28,09 %
ERAS DEL BOSQUE		6,35 %			5,29 %		35,45 %	5,82 %	12,17 %				36,51 %	3,17 %	29,63 %
ESGUEVILLAS		6,90 %			20,69 %		20,69 %	55,17 %	17,24 %				24,14 %		3,45 %
ESPINOSA DE LOS MONTEROS		3,13 %			12,50 %		29,69 %	26,56 %	1,56 %				45,31 %		35,94 %
FABERO					27,52 %	0,92 %	32,11 %	12,84 %	11,01 %				26,61 %	2,75 %	30,28 %
FONTIVEROS		3,39 %			8,47 %		47,46 %	5,08 %	10,17 %				13,56 %	1,69 %	37,29 %
FROMISTA		3,77 %			11,32 %		45,28 %	9,43 %	9,43 %				24,53 %	1,89 %	41,51 %
FUENTEGUINALDO					20,00 %	5,71 %	37,14 %	5,71 %	5,71 %				25,71 %	11,43 %	48,57 %
FUENTESAUCO		4,35 %				4,35 %	52,17 %	13,04 %	4,35 %				26,09 %		30,43 %
FUENTES DE OÑORO		2,04 %			4,08 %		48,98 %	6,12 %	6,12 %				30,61 %	6,12 %	20,41 %
GAMONAL-ANTIGUA	0,59 %	0,59 %			7,10 %		39,05 %	19,53 %	5,33 %	0,59 %			34,91 %	3,55 %	23,67 %
GARCIA LORCA		1,18 %			0,59 %		57,65 %	6,47 %	5,88 %				38,24 %	5,88 %	22,94 %
GARRIDO NORTE	0,40 %	4,80 %			6,40 %		40,00 %	17,60 %	16,40 %	0,40 %		1,60 %	28,00 %	0,80 %	30,40 %
GARRIDO SUR		6,49 %			4,76 %		43,29 %	13,42 %	16,88 %	0,87 %			31,60 %	3,46 %	29,87 %

	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ON	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ON	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ON	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS		
PILARICA																	
PINARES-COVALEDA																	
PINTOR OLIVA																	
PIZARRAL - Hombres																	
PIZARRAL - Mujeres																	
PLAZA DEL EJERCITO																	
PONFERRADA I																	
PONFERRADA II																	
GOMARA		13,64 %			13,64 %		40,91 %	4,55 %	9,09 %				36,36 %		40,91 %		
GREDO		13,51 %			10,81 %		16,22 %	2,70 %	27,03 %				29,73 %	5,41 %	51,35 %		
GUARDO		0,95 %			5,71 %	1,90 %	34,29 %	4,76 %	18,10 %			0,95 %	30,48 %	4,76 %	30,48 %		
GUAREÑA					4,62 %		38,46 %	23,08 %	6,15 %				41,54 %		23,08 %		
GUIJUELO	0,76 %	3,03 %		0,76 %	6,82 %		44,70 %	25,00 %	18,94 %				37,88 %	0,76 %	13,64 %		
HERRERA DE PISUERGA							27,69 %	12,31 %	12,31 %				44,62 %	6,15 %	29,23 %		
HUERTA DEL REY		3,09 %			4,12 %		44,85 %	11,34 %	12,89 %	1,03 %	0,52 %		27,32 %	4,12 %	26,29 %		
HUERTA DE REY					10,71 %		50,00 %	17,86 %	7,14 %				28,57 %		32,14 %		
IGNACIO LOPEZ SAIZ		1,43 %			5,71 %		52,86 %	9,29 %	3,57 %	1,43 %			25,00 %	3,57 %	32,14 %		
ISCAR		1,19 %			8,33 %		25,60 %	21,43 %	12,50 %		0,60 %		48,81 %	5,36 %	29,76 %		
JARDINILLOS		2,38 %			10,12 %		36,90 %	14,88 %	10,12 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	27,38 %	0,60 %	26,79 %		
JOSE AGUADO	0,69 %	1,04 %			3,82 %		47,92 %	8,68 %	10,42 %	0,69 %	0,35 %	1,04 %	36,46 %	6,25 %	26,39 %		
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	1,61 %	1,08 %			9,14 %		40,32 %	13,44 %	4,30 %	0,54 %			32,80 %	3,76 %	27,42 %		
LA ALAMEDILLA		8,72 %			4,10 %		36,92 %	24,62 %	12,82 %				31,79 %	2,56 %	18,46 %		
LA ALBERCA		8,11 %			8,11 %		32,43 %	32,43 %	24,32 %	8,11 %		8,11 %	21,62 %	2,70 %	21,62 %		
LA CABRERA								11,11 %					66,67 %		33,33 %		
LA FUENTE SAN ESTEBAN		7,46 %			7,46 %		35,82 %	5,97 %	5,97 %				44,78 %	4,48 %	29,85 %		
LAGUNA DE DUERO		2,00 %			6,00 %		44,00 %	12,80 %	12,00 %	0,80 %		0,40 %	32,00 %	1,20 %	26,00 %		
LA MAGDALENA			2,86 %		8,57 %		45,71 %	11,43 %	11,43 %				31,43 %	8,57 %	25,71 %		
LANZHITA	2,38 %	2,38 %			2,38 %	2,38 %	28,57 %	9,52 %	4,76 %				23,81 %	7,14 %	38,10 %		
LA PALOMERA		0,88 %	0,44 %	0,44 %	7,08 %		36,28 %	12,39 %	7,96 %	0,88 %	0,44 %		38,05 %	5,75 %	28,76 %		
LA PUEBLA	0,53 %	3,19 %			4,26 %		35,11 %	14,36 %	9,04 %	1,06 %	0,53 %		33,51 %	4,79 %	35,64 %		
LAS HUEL GAS					4,00 %		58,67 %	5,33 %	10,67 %	1,33 %			28,00 %	4,00 %	21,33 %		
LA SIERRA		5,26 %			10,53 %		26,32 %		5,26 %				47,37 %		47,37 %		
LAS NAVAS DEL MARQUES		4,94 %			9,88 %		32,10 %	6,17 %	17,28 %				44,44 %	4,94 %	16,05 %		
LAS TORRES		2,13 %			10,64 %		34,75 %	19,15 %	7,09 %	1,42 %			31,91 %	3,55 %	27,66 %		
LA VICTORIA	0,68 %	0,68 %		0,68 %	6,12 %	2,04 %	25,17 %	15,65 %	12,24 %				36,05 %		29,25 %		
LEDESMA		2,50 %			2,50 %		23,75 %	17,50 %	15,00 %			1,25 %	55,00 %	3,75 %	32,50 %		
LERMA	1,14 %				7,95 %		45,45 %	15,91 %	6,82 %			1,14 %	30,68 %		31,82 %		
LINARES DE RIOFRIO		4,17 %			2,08 %		41,67 %	31,25 %	8,33 %				25,00 %	2,08 %	12,50 %		
LOS COMUNEROS	0,56 %	2,26 %	0,56 %		10,17 %		46,89 %	16,38 %	6,21 %		0,56 %		29,94 %	6,21 %	26,55 %		
LOS CUBOS		1,52 %			3,03 %		42,42 %	14,39 %	9,09 %	0,76 %	0,76 %		42,42 %	6,82 %	18,18 %		
LUMBRALES		3,03 %			6,06 %		29,29 %	32,32 %	8,08 %	2,02 %			35,35 %		16,16 %		
MADRIGAL ALTAS TORRES		2,33 %			6,98 %		41,86 %	16,28 %	11,63 %				37,21 %	2,33 %	23,26 %		
MAGDALENA		2,88 %			4,81 %		25,00 %	30,77 %	12,50 %	0,96 %		0,96 %	47,12 %		10,58 %		
MANSILLA DE LAS MULAS					1,45 %		60,87 %	14,49 %	10,14 %				30,43 %	8,70 %	34,78 %		
MATALLANA DE TORIO		6,25 %			25,00 %		31,25 %	18,75 %	6,25 %				43,75 %		6,25 %		
MATILLA DE LOS CAÑOS		7,14 %			3,57 %		21,43 %	25,00 %	10,71 %				42,86 %		28,57 %		
MAYORGA DE CAMPOS	1,75 %	1,75 %			5,26 %		28,07 %	5,26 %	10,53 %				40,35 %		36,84 %		
SUR	1.074		89,13 %		1.205												

TABARA	Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
TAMAMES																
TEJARES																
TORRECIÓ																
TORRENO																
TORO																
TORQUEMADA																
TORTOLA																
MEDINA DEL CAMPO RURAL		1,85 %			4,94 %			30,86 %	11,73 %	12,35 %	1,23 %			33,95 %	2,47 %	37,65 %
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,68 %	0,68 %			6,48 %			30,03 %	20,82 %	17,75 %		0,34 %		44,37 %	2,39 %	26,28 %
MEDINA DE POMAR	1,01 %	3,03 %			5,05 %			40,40 %	29,29 %	14,14 %	1,01 %			30,30 %		23,23 %
MEDINA DE RIOSECO					5,21 %			47,92 %	7,29 %	11,46 %				29,17 %	2,08 %	36,46 %
MELGAR DE FERNAMENTAL					4,23 %			35,21 %	9,86 %	4,23 %				35,21 %	1,41 %	39,44 %
MIGUEL ARMIJO	0,63 %	2,52 %			5,66 %			31,45 %	32,08 %	14,47 %	1,26 %			22,64 %	3,77 %	21,38 %
MIRANDA DEL CASTAÑAR					4,55 %			50,00 %	13,64 %		4,55 %			36,36 %	4,55 %	22,73 %
MIRANDA ESTE		1,99 %			3,48 %			31,84 %	15,42 %	8,46 %				46,27 %	6,97 %	34,83 %
MIRANDA OESTE		0,88 %	0,44 %		6,64 %			37,61 %	14,16 %	4,87 %	0,88 %	0,44 %	0,44 %	34,96 %	3,98 %	42,04 %
MOMBELTRAN		2,44 %			9,76 %			17,07 %	24,39 %	14,63 %	2,44 %			39,02 %	7,32 %	31,71 %
MOTA DEL MARQUES		3,70 %			3,70 %			33,33 %	3,70 %	7,41 %				51,85 %		25,93 %
MUÑANA		2,56 %			15,38 %			28,21 %	10,26 %	12,82 %				35,90 %		35,90 %
MUÑICO								10,53 %	10,53 %	15,79 %				68,42 %	5,26 %	26,32 %
NAVA DE LA ASUNCION	0,65 %	3,25 %			14,94 %			50,65 %	9,74 %	12,34 %				22,73 %	1,30 %	38,31 %
OLMEDO		5,17 %			10,34 %			31,03 %	20,69 %	8,62 %				32,76 %	1,72 %	25,86 %
OLVEGA		5,26 %			3,51 %	7,02 %		29,82 %	12,28 %	1,75 %				42,11 %	3,51 %	26,32 %
OSORNO		13,79 %			6,90 %			51,72 %	3,45 %	3,45 %				34,48 %		10,34 %
PALENCIA RURAL	1,10 %	8,79 %			8,79 %			35,16 %	10,99 %	16,48 %				48,35 %	2,20 %	20,88 %
PAMPLIEGA								40,00 %		25,00 %				35,00 %	20,00 %	55,00 %
PARADA DE MOLINO		2,36 %			3,94 %			39,37 %	31,50 %	14,17 %				26,77 %		14,17 %
PAREDES DE NAVA	1,96 %	3,92 %			3,92 %	1,96 %		35,29 %	11,76 %	7,84 %				43,14 %		29,41 %
PARQUESOL	0,49 %	1,47 %			2,45 %			38,24 %	8,82 %	9,80 %	0,49 %	0,98 %		45,59 %	2,45 %	20,10 %
PEDROSILLO EL RALO		2,53 %			7,59 %			22,78 %	10,13 %	12,66 %			3,80 %	30,38 %	7,59 %	40,51 %
PEÑAFIEL		3,72 %			9,04 %			29,26 %	15,43 %	3,72 %	0,53 %			49,47 %	2,66 %	26,60 %
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	0,45 %	4,09 %			5,00 %			36,82 %	9,09 %	12,73 %	0,45 %		1,36 %	44,09 %	7,73 %	30,00 %
PERIURBANA NORTE		3,82 %			5,56 %	0,35 %		49,31 %	8,68 %	14,24 %	0,69 %		0,69 %	25,35 %	3,13 %	29,51 %
PERIURBANA SUR	0,52 %	7,25 %			6,22 %	0,52 %		41,97 %	14,51 %	11,40 %			1,55 %	26,94 %	4,15 %	32,12 %
PIEDRAHITA		1,67 %			6,67 %			25,00 %	10,00 %	15,00 %				36,67 %	5,00 %	35,00 %
PILARICA	0,71 %	2,84 %			5,67 %			24,11 %	25,53 %	22,70 %				41,84 %	2,13 %	10,64 %
PINARES-COVALEDA	3,57 %	5,36 %	1,79 %		10,71 %			62,50 %	5,36 %	12,50 %				26,79 %	3,57 %	16,07 %
PINTOR OLIVA		4,63 %			6,02 %			41,20 %	8,80 %	9,72 %				33,33 %	2,78 %	22,69 %
PISUERGA	0,60 %	2,38 %			6,55 %			38,69 %	8,33 %	10,71 %	1,19 %			26,79 %	1,79 %	34,52 %
PIZARRALES	0,68 %	6,80 %	0,68 %		4,08 %			35,37 %	17,01 %	21,77 %	1,36 %		0,68 %	23,13 %	1,36 %	20,41 %
PLAZA DEL EJERCITO		3,14 %			3,14 %			42,14 %	8,81 %	17,61 %	0,63 %			35,22 %	1,26 %	16,35 %
PONFERRADA I	0,37 %	1,12 %	0,37 %	0,37 %	13,11 %			43,07 %	1,50 %	13,86 %	0,37 %			37,45 %	3,00 %	22,47 %
PONFERRADA II	0,37 %	1,12 %			7,12 %			39,70 %	7,87 %	14,61 %	0,37 %			33,33 %	3,37 %	26,97 %
PONFERRADA III		2,11 %			7,89 %	0,53 %		45,79 %	3,68 %	10,00 %		0,53 %		40,53 %	4,21 %	31,58 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
PONFERRADA IV	0,68 %	4,05 %		0,68 %	10,81 %	0,68 %	49,32 %	2,70 %	12,84 %	0,68 %	1,35 %		32,43 %	2,70 %	25,00 %
PORTILLO		4,55 %			2,60 %		36,36 %	18,83 %	14,29 %			0,65 %	31,17 %	1,30 %	28,57 %
PUEBLA DE SANABRIA		4,55 %			9,09 %	4,55 %	28,79 %	15,15 %	1,52 %				22,73 %	4,55 %	48,48 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ					27,03 %		35,14 %	2,70 %	10,81 %				32,43 %	5,41 %	13,51 %
PUERTA NUEVA	0,61 %	3,64 %			7,27 %		35,76 %	22,42 %	20,00 %			0,61 %	32,73 %	0,61 %	23,64 %
QUINTANAR DE LA SIERRA					8,33 %		43,06 %	4,17 %	6,94 %			2,78 %	19,44 %	6,94 %	54,17 %
RIAÑO		3,70 %			7,41 %		29,63 %	11,11 %		3,70 %			44,44 %	7,41 %	48,15 %
RIAZA					16,07 %		46,43 %	16,07 %	5,36 %				33,93 %		12,50 %
RIBERA DEL ESLA					5,41 %		37,84 %	8,11 %	5,41 %				35,14 %	2,70 %	48,65 %
RIBERA DEL ORBIGO		0,51 %	0,51 %		5,08 %		53,30 %	9,14 %	10,15 %				27,92 %	4,57 %	39,59 %
ROA	3,49 %				5,81 %		67,44 %	12,79 %	11,63 %	1,16 %			26,74 %	3,49 %	34,88 %
ROBLEDA		2,22 %			13,33 %		15,56 %	13,33 %					46,67 %	2,22 %	40,00 %
RONDILLA I		5,81 %			2,33 %		22,09 %	20,93 %	13,95 %				52,33 %	1,16 %	19,77 %
RONDILLA II		1,86 %			3,73 %		25,47 %	19,25 %	13,04 %			0,62 %	38,51 %		32,30 %
SACRAMENIA							63,64 %			9,09 %			36,36 %		
SAHAGUN		1,94 %	0,97 %		4,85 %		43,69 %	25,24 %	19,42 %				39,81 %	7,77 %	38,83 %
SALAS DE LOS INFANTES					12,50 %		57,81 %	4,69 %	3,13 %				28,13 %	3,13 %	32,81 %
SALDAÑA		10,47 %			5,81 %		44,19 %	5,81 %	8,14 %				27,91 %		31,40 %
SAN AGUSTIN	0,99 %	0,49 %			6,40 %		55,17 %	4,93 %	6,90 %				28,57 %	3,45 %	27,59 %
SAN ANDRES DEL RABANEDO	0,90 %	2,26 %			2,26 %		41,63 %	22,62 %	5,43 %	1,81 %	0,45 %	0,45 %	29,86 %	4,07 %	22,62 %
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	2,82 %	8,45 %			7,04 %	2,82 %	40,85 %	21,13 %	4,23 %				28,17 %	5,63 %	32,39 %
SAN ILDEFONSO		4,62 %			12,31 %		41,54 %	7,69 %	13,85 %	1,54 %		1,54 %	23,08 %	3,08 %	21,54 %
SAN JOSE		3,70 %			6,17 %		37,65 %	20,37 %	15,43 %	1,23 %		0,62 %	33,33 %	2,47 %	20,99 %
SAN JUAN	0,62 %	8,02 %		0,62 %	6,17 %		29,63 %	17,28 %	13,58 %				30,86 %	1,85 %	31,48 %
SAN LEONARDO DE YAGUE	1,52 %	1,52 %			7,58 %		40,91 %	4,55 %	7,58 %		1,52 %		62,12 %	3,03 %	33,33 %
SAN PABLO		8,65 %			7,69 %		25,96 %	13,46 %	18,27 %	1,92 %			50,00 %	2,88 %	30,77 %
SAN PEDRO DEL ARROYO		8,11 %			10,81 %		16,22 %	10,81 %	21,62 %				48,65 %		21,62 %
SAN PEDRO MANRIQUE		5,00 %			15,00 %		35,00 %		15,00 %			5,00 %	40,00 %	15,00 %	40,00 %
SANTA CLARA					3,68 %		50,00 %	6,62 %	7,35 %	2,21 %			36,03 %	2,94 %	29,41 %
SANTA ELENA		1,92 %			6,73 %		27,88 %	28,85 %	12,50 %				35,58 %	0,96 %	19,23 %
SANTA MARIA		2,80 %	0,70 %		3,50 %		43,36 %	6,29 %	11,89 %	1,40 %	0,70 %	2,10 %	48,25 %	8,39 %	30,77 %
SANTA MARTA		3,26 %			2,79 %	0,47 %	42,79 %	23,26 %	9,77 %	0,47 %			37,67 %	3,72 %	35,81 %
SAYAGO		1,05 %			17,89 %	1,05 %	40,00 %	10,53 %	6,32 %			1,05 %	44,21 %	2,11 %	17,89 %
SEDANO					20,00 %		60,00 %						20,00 %		40,00 %
SEGOVIA I	0,66 %	0,66 %			8,55 %	0,66 %	48,68 %	7,24 %	15,13 %	1,32 %		0,66 %	30,92 %	2,63 %	15,79 %
SEGOVIA II		6,54 %			9,15 %	0,65 %	45,10 %	7,84 %	13,07 %				31,37 %	2,61 %	17,65 %
SEGOVIA III	0,75 %	5,22 %			6,72 %	0,75 %	47,01 %	8,96 %	12,69 %				33,58 %	2,24 %	16,42 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
SEGOVIA RURAL	0,41 %	4,98 %			10,37 %		48,55 %	7,47 %	7,88 %	0,41 %	0,41 %		34,02 %	2,49 %	18,26 %
SEPULVEDA		5,13 %			28,21 %		35,90 %	5,13 %	12,82 %				25,64 %	5,13 %	53,85 %
SERRADA	1,19 %				5,95 %		28,57 %	20,24 %	4,76 %				47,62 %	1,19 %	44,05 %
SORIA NORTE		4,47 %			6,50 %	0,81 %	33,74 %	14,63 %	10,57 %	0,81 %		2,85 %	34,96 %	3,66 %	32,52 %
SORIA RURAL	1,71 %	7,69 %			7,69 %		35,04 %	18,80 %	14,53 %	0,85 %		1,71 %	36,75 %	4,27 %	31,62 %
SORIA SUR	0,45 %	4,50 %			5,41 %		35,14 %	11,26 %	9,46 %	0,45 %		0,90 %	33,78 %	3,15 %	39,64 %
SORIA TARDE					11,76 %		41,18 %	5,88 %	5,88 %				29,41 %		29,41 %
SOTILLO DE LA ADRADA		6,06 %			11,36 %		17,42 %	15,15 %	16,67 %	0,76 %			47,73 %	4,55 %	24,24 %
SUR	1,10 %	4,97 %			6,08 %		47,51 %	12,71 %	18,23 %	1,10 %		1,66 %	28,73 %	2,21 %	24,31 %
TABARA	1,52 %	1,52 %			7,58 %		30,30 %	13,64 %	12,12 %				45,45 %	1,52 %	27,27 %
TAMAMES					2,44 %		46,34 %	4,88 %	2,44 %				41,46 %		43,90 %
TEJARES		6,31 %			0,90 %		45,95 %	25,23 %	10,81 %	0,90 %		2,70 %	28,83 %	3,60 %	17,12 %
TORDESILLAS	0,64 %	2,56 %			2,56 %		35,90 %	6,41 %	15,38 %	0,64 %		0,64 %	34,62 %	1,28 %	41,67 %
TORENO		1,92 %			11,54 %		55,77 %	13,46 %	11,54 %				23,08 %		7,69 %
TORO	0,71 %	2,84 %			5,67 %		21,28 %	13,48 %	16,31 %				51,06 %	1,42 %	29,08 %
TORQUEMADA		8,57 %					25,71 %	25,71 %	5,71 %				17,14 %	5,71 %	57,14 %
TORTOLA	0,72 %	4,32 %			7,19 %		30,94 %	30,22 %	13,67 %	0,72 %			30,94 %	2,16 %	21,58 %
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	0,49 %	0,49 %			4,37 %		46,12 %	17,96 %	6,80 %		0,49 %		39,32 %	3,40 %	17,96 %
TUDELA		3,18 %			10,83 %		24,20 %	19,11 %	14,65 %			0,64 %	38,85 %	3,18 %	29,30 %
UNIVERSIDAD CENTRO		4,63 %			7,41 %		48,15 %	18,52 %	8,33 %			2,78 %	26,85 %	1,85 %	14,81 %
VALDERAS		1,43 %			8,57 %		48,57 %	17,14 %	20,00 %			1,43 %	20,00 %	2,86 %	31,43 %
VALENCIA DE DON JUAN		4,43 %			4,43 %		46,84 %	10,13 %	10,76 %	0,63 %	0,63 %		41,14 %	8,86 %	32,28 %
VALLADOLID RURAL I		5,83 %			7,77 %		35,92 %	19,42 %	12,62 %	0,97 %			39,81 %		34,95 %
VALLADOLID RURAL II		2,90 %			2,90 %		26,09 %	26,09 %	11,59 %				39,13 %	8,70 %	24,64 %
VALLE DE LOSA													40,00 %		80,00 %
VALLE DE MENA					5,88 %		3,92 %	33,33 %					64,71 %		31,37 %
VALLE DE TOBALINA		7,69 %					15,38 %	15,38 %	7,69 %				15,38 %	15,38 %	46,15 %
VALLE DE VALDEBEZANA					9,52 %		42,86 %	9,52 %	9,52 %			4,76 %	80,95 %	9,52 %	9,52 %
VENTA DE BAÑOS	0,62 %	2,47 %			9,88 %		33,95 %	18,52 %	18,52 %				29,01 %	6,79 %	29,01 %
VIDRIALES		6,00 %			10,00 %		34,00 %	10,00 %	12,00 %				12,00 %		48,00 %
VILLABLINO		1,89 %	0,94 %		6,60 %	0,94 %	36,79 %	10,38 %	16,98 %				39,62 %	1,89 %	16,04 %
VILLACASTIN		3,13 %			12,50 %		50,00 %		9,38 %				21,88 %		15,63 %
VILLADA		7,89 %			2,63 %		31,58 %	7,89 %	5,26 %				23,68 %	2,63 %	52,63 %
VILLADIEGO					4,55 %		40,91 %	6,82 %					11,36 %		61,36 %
VILLAFRANCA		0,92 %			6,42 %		50,46 %	4,59 %	16,51 %				41,28 %	1,83 %	14,68 %
VILLAFRECHOS		4,00 %					48,00 %	4,00 %	4,00 %				32,00 %	4,00 %	48,00 %
VILLALON DE CAMPOS		4,69 %			4,69 %		43,75 %	1,56 %	25,00 %	1,56 %		1,56 %	26,56 %	3,13 %	53,13 %
VILLALPANDO		1,61 %			4,84 %		45,16 %	12,90 %	6,45 %				35,48 %		25,81 %
VILLAMURIEL	2,00 %	2,00 %			2,00 %		32,00 %	6,00 %	10,00 %				40,00 %		26,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
VILLARCAYO					3,80 %		29,11 %	12,66 %	7,59 %				49,37 %	2,53 %	35,44 %
VILLARRAMIEL	2,27 %	4,55 %			9,09 %		13,64 %	31,82 %	13,64 %				15,91 %	6,82 %	36,36 %
VILLORIA		5,81 %			2,33 %		43,02 %	41,86 %	8,14 %	1,16 %			19,77 %	1,16 %	31,40 %
VIRGEN CONCHA	0,54 %	2,16 %			3,78 %		38,38 %	25,41 %	12,43 %	1,08 %			29,73 %		20,54 %
VITIGUDINO		5,26 %			3,16 %		41,05 %	6,32 %	13,68 %	1,05 %		1,05 %	52,63 %	2,11 %	18,95 %
ZAMORA NORTE		5,07 %			7,97 %		45,65 %	18,12 %	14,49 %	2,90 %			23,19 %	5,07 %	22,46 %
ZAMORA SUR	0,61 %	3,66 %			12,80 %		32,32 %	18,90 %	16,46 %	0,61 %		3,66 %	26,22 %	2,44 %	35,37 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	0,03 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
AGREDA		4,25 %			6,60 %	0,94 %	33,96 %	3,30 %		1,89 %	1,42 %		5,19 %	17,45 %	2,83 %	72,64 %
AGUILAR DE CAMPOO		1,54 %			2,31 %		41,90 %	1,29 %		3,60 %				17,99 %	2,83 %	59,64 %
ALAEJOS		0,66 %		0,66 %	2,65 %		34,44 %	10,60 %		5,30 %				14,57 %	1,32 %	68,87 %
ALBA DE TORMES		3,21 %			2,06 %		34,06 %	7,07 %		8,10 %	0,39 %		0,26 %	7,33 %	5,40 %	73,65 %
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	0,43 %	5,17 %			19,83 %		34,91 %	6,90 %		4,74 %	0,43 %		0,86 %	16,81 %	2,59 %	54,31 %
ALISTE		3,49 %			3,06 %		31,00 %	5,24 %		11,35 %				10,04 %	16,59 %	69,00 %
ALMAZAN		4,47 %			4,81 %		28,52 %	2,41 %		6,19 %			1,03 %	11,00 %	5,15 %	71,13 %
ALTA SANABRIA					4,00 %			4,00 %						36,00 %		68,00 %
ANTONIO GUTIERREZ	0,06 %	0,90 %	0,17 %		2,19 %	0,06 %	37,82 %	4,61 %	0,06 %	4,05 %	0,11 %	0,28 %		9,06 %	5,23 %	70,40 %
ARANDA NORTE		1,57 %			0,85 %	0,24 %	32,65 %	3,63 %	0,12 %	5,32 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	10,52 %	6,65 %	71,34 %
ARANDA RURAL	0,24 %	1,66 %			2,14 %		31,59 %	4,99 %		7,60 %	0,48 %			13,06 %	4,75 %	69,83 %
ARANDA SUR		2,95 %			1,93 %		27,21 %	3,85 %		4,11 %	0,13 %			12,07 %	4,75 %	76,77 %
ARCOS DE JALON		2,20 %			4,40 %		30,22 %	12,64 %		2,75 %			2,20 %	16,48 %	4,40 %	68,13 %
ARENAS DE SAN PEDRO		1,71 %			7,34 %		25,09 %	4,10 %		5,63 %	0,34 %			19,97 %	3,24 %	73,38 %
AREVALO		4,67 %	0,25 %		6,40 %	0,12 %	25,46 %	2,09 %		3,08 %	0,86 %	0,12 %		19,31 %	6,40 %	70,48 %
ARMUNIA		1,66 %	0,15 %		3,92 %		21,54 %	6,63 %		3,16 %	0,45 %	0,15 %		14,16 %	7,98 %	76,05 %
ARTURO EYRIES		1,92 %			0,64 %	0,26 %	28,08 %	1,92 %		7,69 %	0,13 %			5,77 %	5,38 %	79,62 %
ASTORGA I		2,27 %	0,40 %		2,54 %	0,53 %	39,97 %	1,07 %		4,55 %	0,67 %	0,40 %		29,28 %	5,21 %	58,82 %
ASTORGA II	0,86 %	3,00 %	0,43 %		3,43 %		33,48 %	1,29 %		3,86 %	1,29 %	0,43 %		24,03 %	4,29 %	63,95 %
AVILA ESTACION		3,17 %			3,57 %	0,13 %	24,74 %	3,31 %		4,23 %	0,53 %	0,13 %		11,38 %	6,35 %	76,32 %
AVILA NORTE		3,40 %			5,10 %		25,05 %	3,82 %		7,43 %	0,21 %			11,25 %	5,10 %	69,64 %
AVILA RURAL		5,50 %			5,05 %		16,51 %	0,92 %		8,03 %	0,69 %	0,46 %		16,28 %	4,59 %	78,21 %
AVILA SUR ESTE		2,27 %			5,68 %		26,70 %	4,26 %		5,26 %				13,07 %	4,55 %	71,02 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
AVILA SUR OESTE		2,96 %	0,35 %		4,53 %		26,83 %	2,44 %		5,23 %				11,85 %	7,67 %	68,47 %
BABIA							26,19 %	2,38 %						11,90 %	7,14 %	85,71 %
BALTANAS		4,52 %			1,94 %		39,35 %	3,87 %		18,06 %				21,94 %	2,58 %	67,74 %
BAÑEZA I	0,13 %	1,06 %			3,70 %		32,23 %	1,32 %		3,57 %	0,26 %	0,13 %		19,95 %	12,81 %	66,97 %
BAÑEZA II		0,92 %	0,37 %		2,03 %		35,79 %	3,32 %		4,98 %		0,55 %		18,27 %	7,20 %	69,93 %
BARCO DE AVILA		8,30 %	0,44 %		5,68 %	0,44 %	25,33 %	2,62 %		4,37 %				17,03 %	7,86 %	68,56 %
BARRIO ESPAÑA		0,34 %			1,37 %		24,66 %	11,30 %		3,42 %		0,34 %		15,75 %	3,08 %	72,95 %
BEJAR		3,62 %	0,10 %		2,31 %		35,28 %	9,55 %		7,04 %	0,40 %	0,10 %		13,97 %	6,63 %	63,22 %
BEORADO					1,79 %		38,39 %	4,91 %		8,93 %				5,80 %	1,79 %	79,02 %
BEMBIBRE		0,68 %	0,11 %		4,41 %		52,77 %	3,73 %		9,27 %	0,23 %			12,32 %	4,29 %	56,16 %
BENAVENTE NORTE		1,69 %			2,88 %	0,34 %	22,84 %	11,51 %		9,14 %		0,17 %		11,00 %	5,25 %	73,27 %
BENAVENTE SUR		1,88 %			2,95 %	0,54 %	29,62 %	9,25 %		6,30 %	0,27 %			11,13 %	5,90 %	66,89 %
BERLANGA DE DUERO		4,00 %			2,67 %		18,67 %	1,33 %		6,67 %				20,00 %	1,33 %	77,33 %
BOÑAR		0,95 %	0,47 %		1,90 %		18,01 %	12,32 %		3,79 %	0,47 %	0,95 %		9,48 %	5,69 %	80,09 %
BRIVIESCA		1,01 %			0,75 %	0,25 %	38,19 %	2,26 %		5,03 %	0,25 %		0,25 %	18,09 %	4,77 %	66,83 %
BURGO DE OSMÁ	0,31 %	1,86 %			4,64 %	0,31 %	27,24 %	3,41 %		8,36 %			1,55 %	16,72 %	8,67 %	68,42 %
BURGOHONDO		0,38 %	0,38 %		3,03 %	0,76 %	24,62 %	2,65 %		8,33 %	1,14 %			21,97 %	3,03 %	69,32 %
BURGOS RURAL NORTE		1,04 %			2,08 %		24,22 %	6,23 %		2,42 %				6,57 %	3,81 %	82,01 %
BURGOS RURAL SUR		0,74 %			2,21 %	0,18 %	34,07 %	4,97 %		3,68 %			0,18 %	8,66 %	6,81 %	70,53 %
CACABELOS		0,79 %			5,82 %	0,13 %	42,59 %	1,06 %		3,70 %				22,62 %	2,91 %	58,47 %
CALZADA DE VALDUNCIEL		6,35 %			2,38 %		34,13 %	4,76 %		9,52 %				7,94 %	4,76 %	68,25 %
CAMARZANA DE TERA		4,30 %			2,15 %	0,54 %	27,42 %	16,67 %		7,53 %				13,44 %	2,15 %	72,58 %
CAMPOS LAMPREANA		6,61 %			9,92 %		19,83 %	11,57 %		5,79 %				3,31 %	4,13 %	73,55 %
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS		2,72 %			1,90 %	0,27 %	30,43 %	2,45 %		12,77 %				9,24 %	8,15 %	72,01 %
CANDELEDA		2,23 %			1,91 %		16,56 %	3,82 %		4,14 %				21,02 %	13,69 %	76,43 %
CANTALAPIEDRA		4,40 %			6,29 %		37,11 %	14,47 %		15,09 %	0,63 %		0,63 %	22,01 %	13,84 %	52,83 %
CANTALEJO		3,46 %			11,01 %	1,57 %	33,02 %	2,83 %		7,55 %	0,31 %			12,89 %	11,64 %	64,47 %
CANTERAC		1,26 %			3,15 %	0,21 %	17,44 %	9,03 %		5,46 %				13,87 %	3,36 %	77,73 %
CAPUCHINOS	0,18 %	7,44 %			2,90 %	0,18 %	28,49 %	6,53 %		5,63 %				6,53 %	8,35 %	73,87 %
CARBAJALES DE ALBA					12,12 %		24,24 %	6,06 %		12,12 %				12,12 %	9,09 %	63,64 %
CARBALLEDA		6,59 %			3,30 %	1,65 %	35,71 %	10,44 %		14,29 %			1,10 %	7,14 %	11,54 %	69,78 %
CARBONERO		1,69 %			12,66 %	0,21 %	25,32 %	1,48 %		5,70 %				13,50 %	4,64 %	74,05 %
CARRION DE LOS CONDES		1,43 %			2,86 %		21,90 %	1,90 %		7,14 %				6,67 %	4,76 %	86,19 %
CASA DEL BARCO		0,70 %			1,40 %		22,86 %	1,92 %		9,60 %				8,20 %	7,33 %	79,23 %
CEBREROS		1,79 %			4,03 %		17,45 %	3,58 %		2,91 %	0,45 %			11,63 %	4,25 %	75,39 %
CENTRO-GAMAZO		1,78 %			3,02 %	0,18 %	21,71 %	8,72 %		4,45 %				16,73 %	3,38 %	69,93 %
CERVERA DE PISUERGA	0,57 %	2,27 %			5,68 %		31,82 %	0,57 %		5,11 %	0,57 %			7,39 %	12,50 %	69,89 %
CIGALES		1,94 %			3,06 %		15,56 %	5,56 %		5,00 %				9,17 %	5,28 %	82,50 %
CIRCULAR		0,50 %			2,15 %		23,10 %	4,29 %		3,14 %	0,17 %			14,03 %	3,47 %	76,73 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
CIRCUNVALACION		2,12 %			3,10 %	0,16 %	16,99 %	10,62 %		4,25 %				9,15 %	2,45 %	80,88 %
CISTIERNA		2,69 %	0,49 %		7,33 %	0,49 %	31,05 %	5,87 %		5,62 %			0,24 %	14,67 %	6,85 %	72,13 %
CIUDAD RODRIGO		3,79 %			3,57 %	0,33 %	43,26 %	4,79 %		5,91 %			0,11 %	6,91 %	11,93 %	60,31 %
CONDADO DE TREVIÑO					8,74 %		14,56 %	22,33 %		4,85 %				13,59 %	5,83 %	73,79 %
CONDESA		1,19 %	0,32 %	0,11 %	3,13 %	0,11 %	37,37 %	3,13 %		4,00 %		0,22 %		9,94 %	3,67 %	68,36 %
CORRALES		5,10 %			6,37 %		21,66 %	7,64 %		3,82 %	0,64 %			7,01 %	1,91 %	73,89 %
CRISTOBAL ACOSTA		0,32 %	0,16 %		1,44 %		33,23 %	3,67 %		3,99 %	0,16 %			6,39 %	5,91 %	74,76 %
CRUCERO		1,15 %		0,19 %	1,15 %	0,19 %	30,38 %	1,73 %		4,04 %	0,19 %			8,85 %	7,50 %	71,73 %
CUELLAR	0,17 %	2,55 %			10,03 %	1,36 %	29,59 %	0,85 %		6,46 %				12,59 %	3,74 %	71,43 %
CUENCA DEL BERNESGA		1,09 %			2,40 %		34,20 %	5,88 %		8,06 %	0,22 %		0,22 %	12,42 %	3,70 %	71,46 %
DELICIAS I		2,25 %			1,12 %	0,26 %	31,61 %	1,55 %		7,17 %	0,26 %	0,09 %	0,09 %	8,38 %	3,71 %	75,39 %
DELICIAS II		2,15 %			1,14 %	0,38 %	28,57 %	1,77 %		4,80 %	0,13 %	0,25 %		6,70 %	7,59 %	76,74 %
DESCONOCIDO							100,00 %									
EL EJIDO		1,18 %	0,29 %		2,26 %	0,10 %	35,17 %	2,55 %		4,72 %	0,20 %	0,39 %	0,10 %	10,41 %	8,15 %	70,14 %
EL ESPINAR		0,86 %			1,71 %		23,71 %	4,00 %		5,43 %			0,29 %	6,00 %	10,29 %	78,00 %
ERAS DEL BOSQUE		2,05 %			3,42 %		22,74 %	2,33 %		9,04 %	0,27 %		0,14 %	16,44 %	3,84 %	70,00 %
ESGUEVILLAS		3,64 %					16,36 %	12,73 %		5,45 %				12,73 %	9,09 %	76,36 %
ESPINOSA DE LOS MONTEROS		1,23 %			4,94 %		32,72 %	9,88 %		1,23 %				27,78 %	1,23 %	64,81 %
FABERO		3,41 %			10,24 %	1,71 %	29,51 %	1,71 %		4,39 %	0,49 %		0,24 %	13,17 %	4,88 %	72,20 %
FONTIVEROS		2,56 %			7,69 %		39,74 %	6,41 %		2,56 %			0,64 %	12,82 %	3,85 %	59,62 %
FROMISTA	0,65 %	4,55 %			5,84 %		21,43 %	1,95 %		3,25 %	0,65 %			19,48 %	5,84 %	76,62 %
FUENTEGUINALDO		1,45 %			7,97 %	12,32 %	31,88 %	1,45 %		5,80 %				16,67 %	13,04 %	74,64 %
FUENTESAUCO		7,69 %			3,85 %	1,92 %	17,31 %	3,85 %		1,92 %				11,54 %	21,15 %	71,15 %
FUENTES DE OÑORO	0,92 %	2,75 %			1,83 %		36,70 %	0,92 %		6,42 %	0,92 %		0,92 %	11,01 %	20,18 %	65,14 %
GAMONAL-ANTIGUA		0,67 %			1,51 %		32,50 %	5,03 %		1,84 %		0,17 %		8,04 %	5,36 %	73,70 %
GARCIA LORCA	0,16 %	0,33 %			1,63 %		36,93 %	1,63 %		2,12 %				12,75 %	5,07 %	69,44 %
GARRIDO NORTE		3,91 %			2,11 %		30,66 %	3,38 %		10,47 %			0,11 %	8,56 %	6,24 %	73,15 %
GARRIDO SUR		4,17 %		0,27 %	2,31 %	0,09 %	36,91 %	2,57 %		9,14 %	0,09 %			6,21 %	7,54 %	68,86 %
GOMARA		3,92 %			3,92 %		23,53 %			3,92 %			1,96 %	5,88 %	1,96 %	82,35 %
GREDOS		3,81 %			2,86 %		19,05 %	0,95 %		11,43 %				5,71 %	9,52 %	80,00 %
GUARDO		2,64 %			1,92 %	0,96 %	28,06 %	0,72 %		6,47 %	0,24 %		0,48 %	11,51 %	7,67 %	72,42 %
GUAREÑA		1,30 %			3,46 %		21,65 %	8,66 %		6,93 %				12,99 %	2,16 %	77,49 %
GUIJUELO		3,16 %			3,32 %	0,17 %	46,35 %	8,80 %		10,63 %				11,30 %	4,82 %	58,80 %
HERRERA DE PISUERGA		6,02 %			0,93 %	0,46 %	13,43 %	2,31 %		2,78 %	0,93 %	0,46 %		18,52 %	11,11 %	74,07 %
HUERTA DEL REY		0,88 %			1,97 %		26,62 %	1,20 %		6,13 %	0,11 %		0,22 %	6,02 %	6,79 %	80,28 %
HUERTA DE REY				1,18 %	4,71 %	1,18 %	37,65 %	1,18 %		1,18 %				14,12 %	1,18 %	64,71 %
IGNACIO LOPEZ SAIZ		0,56 %			2,82 %		33,71 %	3,20 %		3,39 %				6,03 %	4,90 %	71,75 %
ISCAR		1,55 %			2,79 %		17,96 %	6,97 %		6,04 %	0,31 %	0,31 %		13,16 %	11,92 %	77,86 %
JARDINILLOS		2,23 %			2,92 %	0,17 %	24,40 %	2,92 %		8,42 %	0,34 %	0,17 %		9,79 %	4,64 %	71,99 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
JOSE AGUADO	0,15 %	1,53 %	0,08 %		1,76 %		34,56 %	3,83 %		5,21 %	0,38 %		0,15 %	17,39 %	8,05 %	66,44 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	0,10 %	0,73 %	0,10 %		2,31 %		32,49 %	2,83 %		1,89 %				8,91 %	6,92 %	74,95 %
LA ALAMEDILLA		4,53 %		0,36 %	1,67 %	0,24 %	30,91 %	2,98 %		6,68 %	0,12 %	0,12 %	0,24 %	5,61 %	8,59 %	74,46 %
LA ALBERCA		2,17 %			7,25 %		44,20 %	5,07 %		13,77 %	2,90 %		1,45 %	7,25 %	9,42 %	65,22 %
LA CABRERA		9,68 %			6,45 %		19,35 %	3,23 %						29,03 %	3,23 %	61,29 %
LA FUENTE SAN ESTEBAN		10,41 %			5,43 %		45,70 %	5,43 %		11,31 %				14,48 %	6,33 %	57,47 %
LAGUNA DE DUERO	0,16 %	1,78 %			1,70 %	0,08 %	28,68 %	1,53 %		7,27 %	0,40 %		0,16 %	9,29 %	4,93 %	77,54 %
LA MAGDALENA		5,59 %	2,10 %		1,40 %		19,58 %	1,40 %		2,80 %				27,27 %	7,69 %	60,84 %
LANZAHITA		1,24 %			8,70 %	1,86 %	21,12 %	10,56 %		12,42 %		0,62 %		27,95 %	13,04 %	42,24 %
LA PALOMERA	0,16 %	2,47 %	0,49 %		1,64 %	0,08 %	36,43 %	4,36 %		5,02 %	0,16 %	0,33 %	0,08 %	12,01 %	5,02 %	72,29 %
LA PUEBLA	0,13 %	2,98 %			3,24 %	0,13 %	23,74 %	2,08 %		4,93 %	0,13 %	0,13 %		11,15 %	5,06 %	74,32 %
LAS HUELGAS		0,25 %			1,24 %		40,10 %	4,70 %		2,72 %				5,69 %	2,48 %	67,08 %
LA SIERRA		12,33 %			10,96 %		15,07 %	2,74 %		4,11 %				12,33 %	2,74 %	69,86 %
LAS NAVAS DEL MARQUES		2,59 %	0,57 %		5,75 %		18,97 %	15,52 %		7,18 %				14,94 %	4,31 %	70,69 %
LAS TORRES		0,48 %			2,10 %		29,89 %	2,58 %		3,55 %	0,16 %			8,08 %	5,65 %	76,90 %
LA VICTORIA	0,17 %	0,84 %			2,36 %	0,34 %	16,39 %	5,57 %		3,04 %	0,17 %			11,99 %	3,38 %	79,73 %
LEDESMA		2,82 %			1,13 %	0,56 %	27,68 %	10,17 %		9,60 %				20,34 %	11,86 %	72,88 %
LERMA		0,74 %			0,37 %		40,81 %	6,25 %		1,84 %	0,37 %		0,37 %	12,87 %	2,21 %	74,26 %
LINARES DE RIOFRIO		1,37 %			4,11 %	2,05 %	32,88 %	8,22 %		7,53 %				6,16 %	8,22 %	70,55 %
LOS COMUNEROS		2,36 %			2,68 %		30,08 %	9,76 %		2,83 %	0,31 %		0,16 %	8,35 %	5,98 %	73,54 %
LOS CUBOS		1,27 %			1,27 %		26,68 %	6,35 %		2,72 %	0,36 %			10,16 %	4,54 %	77,31 %
LUMBRALES	0,46 %	5,48 %			3,20 %		36,07 %	15,53 %		9,13 %	2,74 %		0,46 %	17,35 %	4,57 %	45,21 %
MADRIGAL ALTAS TORRES		0,75 %			6,72 %		17,16 %	4,48 %		2,99 %				17,91 %	1,49 %	79,85 %
MAGDALENA		1,30 %			5,00 %		18,04 %	13,70 %		6,52 %				10,00 %	3,26 %	74,57 %
MANSILLA DE LAS MULAS		0,66 %			1,66 %		50,66 %	4,64 %		6,29 %	0,33 %			8,94 %	4,97 %	61,59 %
MATALLANA DE TORIO		2,41 %			4,82 %		44,58 %	4,82 %		1,20 %				13,25 %	7,23 %	61,45 %
MATILLA DE LOS CAÑOS		8,57 %			6,67 %		24,76 %	4,76 %		5,71 %				19,05 %	11,43 %	60,95 %
MAYORGA DE CAMPOS		1,32 %			1,99 %		26,49 %	1,32 %		6,62 %				17,22 %	1,99 %	68,87 %
MEDINA DEL CAMPO RURAL		0,63 %			5,26 %		16,21 %	5,05 %		1,89 %	0,21 %			13,26 %	4,42 %	82,53 %
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,08 %	2,04 %	0,16 %		3,10 %	0,08 %	16,48 %	9,87 %		7,59 %	0,08 %			16,72 %	8,16 %	76,35 %
MEDINA DE POMAR		3,12 %			1,70 %		32,29 %	8,50 %		4,82 %				11,33 %	1,13 %	70,82 %
MEDINA DE RIOSECO		0,90 %			1,20 %		35,63 %	2,10 %		7,49 %				4,49 %	9,88 %	76,05 %
MELGAR DE FERNAMENTAL		0,67 %			2,01 %		33,56 %	3,36 %		2,68 %				14,77 %	1,34 %	79,87 %
MIGUEL ARMIJO		3,38 %			1,82 %	0,13 %	24,32 %	5,98 %		7,67 %	0,13 %		0,13 %	4,29 %	11,18 %	72,04 %
MIRANDA DEL CASTAÑAR		5,80 %			11,59 %		37,68 %	1,45 %		5,80 %				18,84 %	10,14 %	71,01 %
MIRANDA ESTE		0,88 %			2,63 %		22,81 %	4,06 %		2,85 %				11,95 %	8,00 %	82,68 %
MIRANDA OESTE	0,21 %	0,73 %			2,72 %		23,35 %	2,83 %		1,78 %	0,21 %		0,10 %	8,80 %	5,24 %	81,15 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
MOMBELTRAN		2,92 %			7,30 %		21,17 %	11,68 %		6,57 %				19,71 %	8,03 %	66,42 %
MOTA DEL MARQUES		9,52 %			12,70 %		19,05 %	1,59 %		11,11 %				11,11 %	3,17 %	65,08 %
MUÑANA		1,01 %			8,08 %		18,18 %	1,01 %		4,04 %				10,10 %		87,88 %
MUÑICO					9,30 %		16,28 %	2,33 %		9,30 %	2,33 %			39,53 %		65,12 %
NAVA DE LA ASUNCION		3,76 %			10,15 %		33,46 %	3,57 %		6,95 %	0,56 %	0,38 %		10,71 %	3,20 %	75,75 %
OLMEDO		0,39 %			5,81 %		17,83 %	5,43 %		1,55 %				10,08 %	3,10 %	76,36 %
OLVEGA		7,14 %		0,42 %	2,94 %	2,52 %	29,41 %	2,10 %		3,36 %				19,33 %	10,08 %	58,82 %
OSORNO					1,77 %	0,88 %	44,25 %	1,77 %		3,54 %				8,85 %	2,65 %	66,37 %
PALENCIA RURAL		3,50 %			2,23 %		34,08 %	4,14 %		4,14 %				14,01 %	7,64 %	62,42 %
PAMPLIEGA					1,30 %		33,77 %	1,30 %		9,09 %				18,18 %	9,09 %	77,92 %
PARADA DE MOLINO		2,24 %			0,96 %	0,16 %	30,93 %	7,21 %		6,41 %	0,16 %			6,41 %	1,28 %	73,56 %
PAREDES DE NAVA		2,61 %			4,58 %		41,18 %	3,27 %		5,88 %				17,65 %	5,23 %	70,59 %
PARQUESOL	0,11 %	0,77 %		0,11 %	0,99 %	0,11 %	22,64 %	1,87 %		5,27 %	0,33 %	0,11 %		7,03 %	6,92 %	78,35 %
PEDIATRIA DE AREA ZAMORA																100,00 %
PEDROSILLO EL RALO		4,32 %			6,49 %		23,78 %	8,11 %		15,68 %	0,54 %		1,08 %	12,97 %	11,89 %	71,35 %
PEÑAFIEL		1,39 %			4,16 %		19,24 %	9,53 %		2,43 %			0,17 %	29,12 %	3,29 %	69,32 %
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		6,10 %			1,79 %	0,15 %	39,88 %	2,38 %		6,85 %	0,15 %			18,15 %	11,31 %	67,11 %
PERIURBANA NORTE		2,78 %		0,08 %	2,52 %	0,08 %	36,42 %	4,79 %		9,25 %	0,08 %		0,08 %	8,83 %	6,48 %	65,10 %
PERIURBANA SUR		5,45 %		0,14 %	4,22 %		34,60 %	3,95 %		4,09 %			0,14 %	8,17 %	4,77 %	73,16 %
PIEDRAHITA		4,17 %			1,85 %		24,07 %	2,78 %		1,85 %		0,93 %		17,59 %	1,39 %	75,93 %
PILARICA		1,69 %			3,38 %	0,15 %	21,85 %	6,00 %		8,62 %		0,15 %		11,38 %	4,62 %	73,23 %
PINARES-COVALEDA		4,31 %			1,91 %	0,48 %	45,93 %	3,83 %		8,61 %			0,96 %	8,13 %	10,53 %	58,85 %
PINTOR OLIVA		2,27 %			2,39 %	0,12 %	26,40 %	3,11 %		4,90 %	0,24 %			15,41 %	6,33 %	71,33 %
PISUERGA		1,31 %			1,92 %	0,10 %	18,50 %	2,43 %		5,46 %				4,45 %	4,85 %	85,74 %
PIZARRALES	0,30 %	3,02 %		0,15 %	4,23 %		31,72 %	3,17 %		6,19 %	1,36 %			7,40 %	6,65 %	68,13 %
PLAZA DEL EJERCITO		1,26 %			0,63 %	0,13 %	26,29 %	1,13 %		9,94 %	0,13 %			6,16 %	6,29 %	77,36 %
PONFERRADA I		1,44 %			5,95 %	0,27 %	41,98 %	0,72 %		4,41 %	0,09 %			18,02 %	5,14 %	59,46 %
PONFERRADA II		1,15 %	0,26 %		3,17 %	0,09 %	40,35 %	2,73 %		4,85 %				17,80 %	6,08 %	59,82 %
PONFERRADA III		1,36 %			2,60 %	0,23 %	41,69 %	0,68 %		5,08 %	0,11 %	0,11 %		16,05 %	4,41 %	66,44 %
PONFERRADA IV		1,81 %			5,58 %	0,15 %	42,99 %	1,66 %		9,35 %	0,15 %			15,08 %	5,73 %	55,35 %
PORTILLO		0,98 %	0,14 %		3,49 %		20,50 %	7,11 %		6,00 %			0,70 %	9,90 %	4,88 %	78,80 %
PUEBLA DE SANABRIA		3,70 %			2,88 %	0,41 %	14,40 %	6,58 %		3,29 %				9,05 %	12,35 %	81,48 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ		0,64 %			6,41 %	0,64 %	35,90 %	3,85 %		3,21 %				8,97 %	6,41 %	69,23 %
PUERTA NUEVA		2,20 %			2,64 %		29,77 %	5,13 %		5,87 %	0,15 %		0,15 %	5,13 %	2,49 %	76,25 %
QUINTANAR DE LA SIERRA		1,14 %			6,25 %		27,84 %	1,70 %		3,41 %				13,64 %	6,25 %	79,55 %
RIAÑO		2,94 %			2,94 %		27,94 %			8,82 %			1,47 %	22,06 %	2,94 %	79,41 %
RIAZA		0,63 %			10,69 %		27,67 %	6,92 %		3,77 %				15,09 %	4,40 %	68,55 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
RIBERA DEL ESLA		1,69 %	0,85 %		1,69 %		30,51 %	6,78 %		5,08 %				22,03 %	0,85 %	65,25 %
RIBERA DEL ORBIGO		1,38 %			2,14 %	0,13 %	30,40 %	4,90 %		4,40 %	0,25 %	0,50 %		12,81 %	8,79 %	73,62 %
ROA		1,87 %			1,87 %		35,96 %	2,62 %		4,49 %	0,75 %			10,49 %	5,24 %	76,40 %
ROBEDA		1,63 %			8,94 %		22,76 %	5,69 %		4,88 %	0,81 %			28,46 %	5,69 %	57,72 %
RONDILLA I		1,71 %			3,42 %	0,19 %	16,35 %	11,79 %		5,51 %	0,95 %			18,82 %	6,46 %	72,62 %
RONDILLA II		1,24 %			3,30 %	0,27 %	18,68 %	6,87 %		5,63 %	0,27 %			12,36 %	3,43 %	78,71 %
SACRAMENIA					12,12 %		12,12 %	3,03 %		9,09 %				9,09 %	6,06 %	87,88 %
SAHAGUN		1,61 %		0,32 %	3,54 %		35,05 %	6,11 %		13,83 %		0,64 %		17,36 %	10,29 %	71,38 %
SALAS DE LOS INFANTES		1,42 %			2,36 %	0,47 %	41,04 %	1,89 %		1,89 %	0,47 %			8,02 %	6,60 %	72,17 %
SALDAÑA		7,55 %			7,91 %	0,36 %	22,66 %	2,16 %		3,60 %				13,67 %	3,60 %	75,90 %
SAN AGUSTIN		0,72 %	0,12 %		1,69 %		40,41 %	1,81 %		2,90 %	0,36 %			11,34 %	8,08 %	70,69 %
SAN ANDRES DEL RABANEDO	0,18 %	1,02 %	0,28 %		1,76 %		37,34 %	7,02 %		2,68 %	0,09 %	0,28 %		12,57 %	6,84 %	68,30 %
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	0,46 %	2,76 %			4,15 %	0,92 %	33,64 %	2,30 %		3,23 %			0,46 %	12,90 %	6,91 %	71,89 %
SAN ILDEFONSO		2,20 %			4,40 %		39,93 %	4,40 %		7,69 %				5,13 %	5,86 %	68,86 %
SAN JOSE		6,24 %			1,04 %		35,70 %	3,99 %	0,17 %	8,67 %			0,17 %	8,49 %	6,76 %	68,11 %
SAN JUAN		6,17 %	0,15 %	0,15 %	2,16 %	0,31 %	35,65 %	4,94 %		12,04 %				7,41 %	4,94 %	64,51 %
SAN LEONARDO DE YAGUE		3,96 %	0,50 %		5,45 %		50,00 %	1,98 %		1,49 %			1,49 %	22,77 %	8,42 %	74,75 %
SAN PABLO		2,20 %		0,20 %	3,79 %		27,74 %	6,99 %		5,99 %	0,40 %			16,77 %	6,99 %	69,46 %
SAN PEDRO DEL ARROYO		3,81 %			5,71 %		19,05 %	1,90 %		7,62 %				20,00 %	4,76 %	70,48 %
SAN PEDRO MANRIQUE		3,23 %			6,45 %		30,65 %	1,61 %		8,06 %				8,06 %	4,84 %	70,97 %
SANTA CLARA		0,75 %			1,49 %		39,70 %	2,09 %		1,94 %			0,15 %	11,49 %	3,43 %	68,81 %
SANTA ELENA		4,72 %			1,64 %		29,36 %	5,54 %		5,75 %	0,21 %			4,72 %	4,52 %	74,95 %
SANTA MARIA	0,19 %	1,75 %	0,19 %		2,14 %		32,10 %	2,33 %		5,84 %	0,78 %		0,19 %	11,87 %	7,00 %	76,26 %
SANTA MARTA		3,37 %			2,85 %	0,11 %	31,51 %	4,74 %		6,95 %			0,11 %	10,12 %	6,01 %	71,34 %
SAYAGO		1,22 %			5,31 %		33,88 %	6,53 %		9,39 %				13,47 %	6,12 %	66,94 %
SEDANO							39,13 %	30,43 %		4,35 %				8,70 %	8,70 %	60,87 %
SEGOVIA I		3,27 %			3,98 %	0,71 %	29,02 %	1,56 %		7,54 %	0,14 %			8,96 %	4,27 %	72,69 %
SEGOVIA II		2,94 %			5,31 %	0,28 %	38,18 %	1,54 %		7,13 %	0,14 %			9,79 %	5,31 %	65,87 %
SEGOVIA III		2,87 %			2,87 %	0,36 %	27,65 %	2,69 %		4,49 %	0,18 %			5,03 %	4,67 %	76,30 %
SEGOVIA RURAL		1,95 %		0,10 %	4,62 %	0,10 %	35,59 %	2,05 %		6,26 %	0,21 %	0,10 %		8,72 %	5,33 %	67,49 %
SEPULVEDA		3,03 %			15,91 %		23,48 %	1,52 %		11,36 %				14,39 %	6,82 %	77,27 %
SERRADA		1,52 %	0,38 %		4,56 %		20,15 %	4,18 %		8,75 %				9,13 %	3,04 %	79,47 %
SORIA NORTE		3,62 %		0,10 %	3,42 %		31,16 %	1,55 %		5,28 %	0,21 %		0,52 %	14,29 %	4,87 %	69,88 %
SORIA RURAL		3,36 %			4,25 %		32,66 %	4,47 %		6,94 %			1,12 %	19,69 %	4,25 %	73,15 %
SORIA SUR		3,68 %			4,27 %	0,12 %	28,94 %	2,49 %		4,86 %			0,47 %	14,47 %	3,68 %	76,87 %
SORIA TARDE		2,67 %			1,33 %		24,67 %	2,00 %		2,00 %				8,00 %	10,00 %	81,33 %
SOTILLO DE LA ADRADA	0,34 %	4,36 %			4,70 %	0,84 %	14,93 %	3,19 %		10,40 %	0,67 %	0,17 %		17,11 %	8,05 %	67,28 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINA S SENSIBLES A LA BETALACT AMASA	J01CF / PENICILINA S RESISTENT ES A LA BETALACT AMASA	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EA / TRIMETOPR IMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01GB / OTROS AMINOGLU CÓSIDOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
SUR	0,34 %	2,80 %			1,34 %	0,11 %	24,64 %	2,91 %		8,40 %		0,11 %	0,90 %	5,71 %	12,32 %	74,24 %
TABARA		5,33 %			4,00 %		38,00 %	16,67 %		6,67 %	2,67 %		0,67 %	14,67 %	3,33 %	54,67 %
TAMAMES		5,08 %			0,85 %	0,85 %	26,27 %	3,39 %		2,54 %				21,19 %	12,71 %	71,19 %
TEJARES		2,36 %		0,20 %	3,54 %	0,20 %	31,24 %	6,88 %		6,29 %			0,39 %	12,57 %	7,66 %	69,55 %
TORDESILLAS		1,90 %	0,19 %		0,57 %		31,81 %	2,48 %		10,29 %	0,19 %		0,95 %	10,10 %	4,19 %	74,86 %
TORENO		3,38 %	0,48 %		7,25 %		39,61 %	0,97 %		6,76 %				9,66 %	3,86 %	62,32 %
TORO	0,17 %	1,51 %			3,02 %		22,15 %	3,02 %		8,22 %				10,23 %	5,03 %	78,86 %
TORQUEMADA		1,30 %			2,60 %		14,29 %	5,19 %		7,79 %				3,90 %	6,49 %	80,52 %
TORTOLA		1,75 %			3,66 %	0,16 %	17,97 %	9,06 %		4,77 %				16,69 %	4,77 %	75,99 %
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN		1,09 %	0,20 %		1,78 %	0,10 %	37,33 %	5,15 %		3,66 %	0,10 %	0,30 %		10,00 %	7,52 %	69,41 %
TUDELA		1,51 %			3,52 %		16,92 %	7,20 %		5,86 %	0,34 %			18,26 %	6,53 %	78,06 %
UNIVERSIDAD CENTRO		5,60 %			2,43 %		39,42 %	3,89 %		8,03 %				4,87 %	12,17 %	63,02 %
VALDERAS		0,88 %	0,44 %		2,19 %		39,47 %	4,39 %		5,26 %	0,88 %	0,44 %		10,53 %	7,89 %	71,93 %
VALENCIA DE DON JUAN		1,44 %			2,55 %		39,39 %	2,55 %		4,31 %		0,32 %		16,75 %	4,94 %	68,90 %
VALLADOLID RURAL I		2,76 %			3,35 %		20,91 %	2,37 %		5,33 %	0,79 %			17,16 %	3,35 %	75,74 %
VALLADOLID RURAL II		1,08 %			1,62 %		22,16 %	2,97 %		11,08 %	0,27 %		0,54 %	7,57 %	7,84 %	71,89 %
VALLE DE LOSA		5,88 %			5,88 %			5,88 %		5,88 %				11,76 %		88,24 %
VALLE DE MENA					6,53 %		6,94 %	28,98 %		2,86 %	0,82 %			29,39 %	2,04 %	62,45 %
VALLE DE TOBALINA					5,36 %		39,29 %	5,36 %						8,93 %	1,79 %	73,21 %
VALLE DE VALDEBEZANA		5,45 %			7,27 %		29,09 %	3,64 %		3,64 %	3,64 %			27,27 %		60,00 %
VENTA DE BAÑOS		2,36 %			4,13 %	0,20 %	26,18 %	3,15 %		12,01 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	12,60 %	8,27 %	73,82 %
VIDRIALES		3,81 %			4,76 %		27,62 %	4,76 %		14,29 %				9,52 %	1,90 %	78,10 %
VILLABLINO		4,29 %			5,15 %	0,21 %	40,34 %	0,86 %		10,94 %	0,21 %	0,21 %		17,17 %	6,44 %	56,44 %
VILLACASTIN		5,76 %			8,63 %		28,78 %	0,72 %		4,32 %				5,76 %	3,60 %	77,70 %
VILLADA		2,94 %			2,94 %		29,41 %	4,90 %		6,86 %				7,84 %	2,94 %	74,51 %
VILLADIEGO		0,82 %			6,56 %		24,59 %	17,21 %		4,10 %				8,20 %	2,46 %	72,95 %
VILLAFRANCA		0,76 %			6,60 %		55,08 %	1,02 %		11,42 %	0,25 %			21,83 %	7,61 %	48,98 %
VILLAFRECHOS		10,14 %			2,90 %		27,54 %			5,80 %				18,84 %	4,35 %	73,91 %
VILLALON DE CAMPOS		2,68 %			4,46 %	0,89 %	37,50 %	0,89 %		1,79 %				15,18 %	11,61 %	69,64 %
VILLALPANDO		0,98 %			3,43 %		27,45 %	6,86 %		6,37 %				13,24 %	3,43 %	75,49 %
VILLAMURIEL		6,98 %			1,40 %		31,63 %	1,40 %		6,98 %				12,09 %	3,72 %	73,02 %
VILLARCAYO		1,84 %			3,31 %	0,37 %	33,82 %	4,04 %		2,57 %				15,07 %	3,68 %	82,72 %
VILLARRAMIEL	0,72 %	2,90 %			1,45 %		15,94 %	4,35 %		6,52 %				9,42 %	10,87 %	74,64 %
VILLORIA		2,64 %			1,65 %		43,23 %	6,93 %		6,93 %	0,33 %			5,28 %	13,53 %	64,03 %
VIRGEN CONCHA	0,12 %	2,65 %			3,01 %	0,24 %	27,11 %	10,60 %		4,58 %	0,36 %		0,12 %	8,92 %	3,13 %	72,05 %
VITIGUDINO		3,39 %			1,36 %		40,00 %	5,08 %		4,75 %	0,34 %		0,34 %	11,19 %	9,83 %	63,39 %
ZAMORA NORTE		1,12 %			3,07 %		29,89 %	6,15 %		6,42 %	0,56 %			12,29 %	3,35 %	67,32 %
ZAMORA SUR		3,11 %			4,85 %		28,54 %	10,49 %		13,59 %	0,19 %		2,52 %	10,29 %	4,85 %	67,38 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	0,00 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
AGREDA	274	89,84 %	305
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AGREDA	94,51 %	85,71 %	88,75 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	85,71 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	259	98,84 %
	TOTAL PACIENTES ITU	270	98,52 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA	4,84 %	6,45 %	48,39 %	1,61 %	9,68 %	1,61 %	6,45 %	38,71 %	3,23 %	32,26 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA	4,25 %	6,60 %	0,94 %	33,96 %	3,30 %	1,89 %	1,42 %	5,19 %	17,45 %	2,83 %	72,64 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

AGUILAR DE CAMPOO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
AGUILAR DE CAMPOO	499	84,86 %	588									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
AGUILAR DE CAMPOO	91,48 %	74,79 %	82,47 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	34	79,41 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	457	98,47 %
	TOTAL PACIENTES ITU	500	96,40 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	34	79,41 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	457	98,47 %
TOTAL PACIENTES ITU		500	96,40 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGUILAR DE CAMPOO	0,91 %	1,82 %	11,82 %	41,82 %	3,64 %	9,09 %	37,27 %	5,45 %	27,27 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGUILAR DE CAMPOO	1,54 %	2,31 %	41,90 %	1,29 %	3,60 %	17,99 %	2,83 %	59,64 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ALAEJOS	198	89,59 %	221
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALAEJOS	94,94 %	73,53 %	88,29 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	183	98,36 %
	TOTAL PACIENTES ITU	195	97,44 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALAEJOS	21,28 %	42,55 %	19,15 %	19,15 %	42,55 %	21,28 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALAEJOS	0,66 %	0,66 %	2,65 %	34,44 %	10,60 %	5,30 %	14,57 %	1,32 %	68,87 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ALBA DE TORMES				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ALBA DE TORMES	991	89,44 %	1.108									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
ALBA DE TORMES	93,61 %	85,55 %	86,83 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	71,43 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	7	57,14 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	5	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	15	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	35	97,14 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	950	97,47 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.004	96,51 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	71,43 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	7	57,14 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	5	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	15	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	35	97,14 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	950	97,47 %
TOTAL PACIENTES ITU		1.004	96,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALBA DE TORMES	0,47 %	3,76 %	5,16 %	42,25 %	23,94 %	11,27 %	1,41 %	1,41 %	35,68 %	2,35 %	30,05 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALBA DE TORMES	3,21 %	2,06 %	34,06 %	7,07 %	8,10 %	0,39 %	0,26 %	7,33 %	5,40 %	73,65 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ALDEADAVILA DE LA RIBER.	315	94,03 %	335
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALDEADAVILA DE LA RIBER	100,00 %	97,50 %	92,08 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	309	98,71 %
	TOTAL PACIENTES ITU	315	98,73 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	1,20 %	7,23 %	26,51 %	28,92 %	7,23 %	8,43 %	1,20 %	48,19 %	2,41 %	26,51 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	0,43 %	5,17 %	19,83 %	34,91 %	6,90 %	4,74 %	0,43 %	0,86 %	16,81 %	2,59 %	54,31 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ALISTE	320	89,14 %	359
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALISTE	91,46 %	91,84 %	86,96 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	303	98,68 %
	TOTAL PACIENTES ITU	318	97,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALISTE	4,40 %	9,89 %	27,47 %	10,99 %	14,29 %	1,10 %	31,87 %	5,49 %	40,66 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALISTE	3,49 %	3,06 %	31,00 %	5,24 %	11,35 %	10,04 %	16,59 %	69,00 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ALMAZAN	387	86,77 %	446
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALMAZAN	92,64 %	80,95 %	83,41 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	353	97,45 %
	TOTAL PACIENTES ITU	366	95,90 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALMAZAN	4,17 %	9,38 %	33,33 %	6,25 %	8,33 %	4,17 %	30,21 %	7,29 %	41,67 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALMAZAN	4,47 %	4,81 %	28,52 %	2,41 %	6,19 %	1,03 %	11,00 %	5,15 %	71,13 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ALTA SANABRIA	36	85,71 %	42
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	35	97,14 %
	TOTAL PACIENTES ITU	38	94,74 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALTA SANABRIA	88,89 %	77,78 %	84,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALTA SANABRIA	9,09 %	9,09 %	9,09 %	9,09 %	54,55 %	45,45 %
TOTAL GAP	7,04 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ALTA SANABRIA	4,00 %	4,00 %	36,00 %	68,00 %
TOTAL GAP	3,27 %	4,44 %	12,09 %	71,53 %

ANTONIO GUTIERREZ				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
ANTONIO GUTIERREZ	2.105	90,89 %	2.316										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70										
	ANTONIO GUTIERREZ	95,57 %	90,05 %	84,74 %									
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)								Nº Pac ITU	% Pac ITU J01			
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda								6	50,00 %			
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica								2	100,00 %			
N13.30	Hidronefrosis no especificadas								2				
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado								1	100,00 %			
N28.1	Quiste de riñón, adquirido								1				
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter								1	100,00 %			
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado								6				
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria								64	96,88 %			
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria								1				
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria								3	66,67 %			
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria								177	98,31 %			
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga								2				
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada								1				
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina								1				
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada								1.893	98,57 %			
	TOTAL PACIENTES ITU								2.091	98,04 %			

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ANTONIO GUTIERREZ	0,30 %	2,44 %	0,30 %	6,71 %	0,61 %	47,56 %	15,24 %	7,93 %	0,91 %	0,30 %	25,91 %	3,96 %	26,22 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EA / TRIMETOPRIMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ANTONIO GUTIERREZ	0,06 %	0,90 %	0,17 %	2,19 %	0,06 %	37,82 %	4,61 %	0,06 %	4,05 %	0,11 %	0,28 %	9,06 %	5,23 %	70,40 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	0,00 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ARANDA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ARANDA NORTE	1.042	87,86 %	1.186									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=+70									
ARANDA NORTE	90,98 %	83,98 %	85,16 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	71,43 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	48	95,83 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	27	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	40,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	984	97,15 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.047	96,47 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA NORTE	0,93 %	4,19 %	0,47 %	45,12 %	16,28 %	11,63 %	0,47 %	29,30 %	1,40 %	29,77 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EA / TRIMETOPRIMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA NORTE	1,57 %	0,85 %	0,24 %	32,65 %	3,63 %	0,12 %	5,32 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	10,52 %	6,65 %	71,34 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	0,00 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ARANDA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ARANDA RURAL	560	89,60 %	625									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
ARANDA RURAL	93,72 %	86,52 %	87,39 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	15	93,33 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	540	99,07 %
	TOTAL PACIENTES ITU	562	98,40 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	15	93,33 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	540	99,07 %
TOTAL PACIENTES ITU		562	98,40 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA RURAL	3,60 %	5,04 %	0,72 %	39,57 %	10,79 %	10,07 %	1,44 %	36,69 %	0,72 %	35,97 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA RURAL	0,24 %	1,66 %	2,14 %	31,59 %	4,99 %	7,60 %	0,48 %	13,06 %	4,75 %	69,83 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ARANDA SUR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ARANDA SUR	976	87,07 %	1.121									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	ARANDA SUR	90,91 %	81,22 %	84,78 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)									Nº Pac ITU	% Pac ITU J01	
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda									4	100,00 %	
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada									1		
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica									3	33,33 %	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas									5		
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada									1	100,00 %	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter									1		
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado									1		
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria									39	97,44 %	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria									4	75,00 %	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria									23	91,30 %	
N32.1	Fístula vesicointestinal									2	50,00 %	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga									1		
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada									3	66,67 %	
N36.2	Carúncula uretral									1		
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada									907	98,79 %	
	TOTAL PACIENTES ITU									971	97,84 %	

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA SUR	0,51 %	1,02 %	6,60 %	0,51 %	38,07 %	14,21 %	9,14 %	0,51 %	0,51 %	36,04 %	3,05 %	41,12 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARANDA SUR	2,95 %	1,93 %	27,21 %	3,85 %	4,11 %	0,13 %	12,07 %	4,75 %	76,77 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ARCOS DE JALON	233	89,96 %	259
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARCOS DE JALON	93,59 %	82,86 %	89,19 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	42	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	195	98,46 %
	TOTAL PACIENTES ITU	229	98,69 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARCOS DE JALON	5,88 %	11,76 %	39,22 %	9,80 %	7,84 %	1,96 %	3,92 %	31,37 %	3,92 %	43,14 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARCOS DE JALON	2,20 %	4,40 %	30,22 %	12,64 %	2,75 %	2,20 %	16,48 %	4,40 %	68,13 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ARENAS DE SAN PEDRO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ARENAS DE SAN PEDRO	712	92,59 %	769									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	ARENAS DE SAN PEDRO	95,29 %	90,91 %	90,96 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)								Nº Pac ITU	% Pac ITU J01		
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada								1			
N15.1	Absceso renal y perirrenal								1			
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter								1			
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado								1			
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria								6	100,00 %		
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria								17	82,35 %		
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada								3			
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra								2			
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada								698	99,00 %		
	TOTAL PACIENTES ITU								718	97,91 %		

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARENAS DE SAN PEDRO	3,97 %	8,73 %	32,54 %	6,35 %	8,73 %	0,79 %	0,79 %	37,30 %	4,76 %	47,62 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARENAS DE SAN PEDRO	1,71 %	7,34 %	25,09 %	4,10 %	5,63 %	0,34 %	19,97 %	3,24 %	73,38 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
AREVALO	1.029	89,79 %	1.146
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AREVALO	92,21 %	87,82 %	87,65 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	91,67 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	75	92,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	970	97,11 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.042	96,55 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AREVALO	4,17 %	17,59 %	46,30 %	7,87 %	8,33 %	0,93 %	0,46 %	0,46 %	40,28 %	5,09 %	23,61 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AREVALO	4,67 %	0,25 %	6,40 %	0,12 %	25,46 %	2,09 %	3,08 %	0,86 %	0,12 %	19,31 %	6,40 %	70,48 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ARMUNIA	841	90,04 %	934
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARMUNIA	94,56 %	82,72 %	86,69 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	5	20,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	73	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	47	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	740	97,70 %
	TOTAL PACIENTES ITU	844	97,16 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARMUNIA	3,39 %	5,08 %	0,56 %	33,33 %	5,08 %	8,47 %	1,13 %	1,13 %	37,85 %	5,65 %	38,42 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARMUNIA	1,66 %	0,15 %	3,92 %	21,54 %	6,63 %	3,16 %	0,45 %	0,15 %	14,16 %	7,98 %	76,05 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ARTURO EYRIES	952	85,53 %	1.113
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARTURO EYRIES	92,76 %	81,77 %	79,80 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	88,89 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	40,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	37	97,30 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	821	98,42 %
	TOTAL PACIENTES ITU	877	97,15 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARTURO EYRIES	0,58 %	3,49 %	41,86 %	18,02 %	11,05 %	1,16 %	30,23 %	2,91 %	22,67 %
TOTAL GAP	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARTURO EYRIES	1,92 %	0,64 %	0,26 %	28,08 %	1,92 %	7,69 %	0,13 %	5,77 %	5,38 %	79,62 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ASTORGA I	918	89,56 %	1.025
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ASTORGA I	95,33 %	84,52 %	85,91 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	92,86 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	891	97,42 %
	TOTAL PACIENTES ITU	909	97,14 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ASTORGA I	1,18 %	2,35 %	3,53 %	1,76 %	46,47 %	4,12 %	8,82 %	0,59 %	44,71 %	2,94 %	27,65 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ASTORGA I	2,27 %	0,40 %	2,54 %	0,53 %	39,97 %	1,07 %	4,55 %	0,67 %	0,40 %	29,28 %	5,21 %	58,82 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ASTORGA II				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ASTORGA II	298	87,65 %	340									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	293	98,29 %
	TOTAL PACIENTES ITU	296	97,30 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ASTORGA II	93,02 %	83,33 %	85,28 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ASTORGA II	6,15 %	1,54 %	32,31 %	3,08 %	9,23 %	50,77 %	1,54 %	36,92 %
TOTAL GAP	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ASTORGA II	0,86 %	3,00 %	0,43 %	3,43 %	33,48 %	1,29 %	3,86 %	1,29 %	0,43 %	24,03 %	4,29 %	63,95 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

AVILA ESTACION				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
AVILA ESTACION	902	89,93 %	1.003									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
AVILA ESTACION	92,36 %	88,36 %	87,22 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	66,67 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	66,67 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	38	94,74 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	40	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	40,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	815	97,79 %
	TOTAL PACIENTES ITU	885	96,95 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA ESTACION	1,37 %	10,96 %	39,73 %	10,96 %	16,44 %	39,73 %	7,53 %	23,97 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA ESTACION	3,17 %	3,57 %	0,13 %	24,74 %	3,31 %	4,23 %	0,53 %	0,13 %	11,38 %	6,35 %	76,32 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

AVILA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
AVILA NORTE	570	85,33 %	668									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
AVILA NORTE	88,17 %	82,86 %	83,33 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	85,71 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	17	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	29	79,31 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	511	97,65 %
	TOTAL PACIENTES ITU	563	95,91 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	85,71 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	17	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	29	79,31 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	511	97,65 %
	TOTAL PACIENTES ITU	563	95,91 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA NORTE	4,04 %	5,05 %	32,32 %	14,14 %	20,20 %	2,02 %	43,43 %	3,03 %	13,13 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA NORTE	3,40 %	5,10 %	25,05 %	3,82 %	7,43 %	0,21 %	11,25 %	5,10 %	69,64 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
AVILA RURAL	577	89,18 %	647
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA RURAL	92,37 %	83,18 %	88,06 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	93,75 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	503	98,01 %
	TOTAL PACIENTES ITU	566	97,53 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA RURAL	4,96 %	9,93 %	21,99 %	6,38 %	12,77 %	1,42 %	43,97 %	2,84 %	34,04 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA RURAL	5,50 %	5,05 %	16,51 %	0,92 %	8,03 %	0,69 %	0,46 %	16,28 %	4,59 %	78,21 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

AVILA SUR ESTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
AVILA SUR ESTE	838	86,93 %	964									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
AVILA SUR ESTE	91,73 %	79,45 %	79,85 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01									
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	88,89 %									
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	7	71,43 %									
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2										
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %									
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1										
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1										
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1										
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	39	97,44 %									
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1										
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1										
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	35	91,43 %									
N32.1	Fístula vesicointestinal	1										
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1										
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %									
N36.2	Carúncula uretral	1										
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	748	98,13 %									
	TOTAL PACIENTES ITU	821	96,95 %									

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA SUR ESTE	4,48 %	11,19 %	37,31 %	15,67 %	13,43 %	0,75 %	34,33 %	2,99 %	16,42 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA SUR ESTE	2,27 %	5,68 %	26,70 %	4,26 %	5,26 %	13,07 %	4,55 %	71,02 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
AVILA SUR OESTE	694	86,00 %	807
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA SUR OESTE	91,57 %	80,13 %	81,59 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	4	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	88,24 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	669	97,16 %
	TOTAL PACIENTES ITU	701	95,72 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA SUR OESTE	3,33 %	6,67 %	38,33 %	12,50 %	19,17 %	1,67 %	37,50 %	2,50 %	16,67 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AVILA SUR OESTE	2,96 %	0,35 %	4,53 %	26,83 %	2,44 %	5,23 %	11,85 %	7,67 %	68,47 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BABIA	53	92,98 %	57
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	50	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	52	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BABIA	90,00 %	92,31 %	95,83 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
BABIA	27,27 %	27,27 %	9,09 %	36,36 %	27,27 %
TOTAL GAP	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
BABIA	26,19 %	2,38 %	11,90 %	7,14 %	85,71 %
TOTAL GAP	30,29 %	4,44 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BALTANAS	205	89,52 %	229
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	202	97,52 %
	TOTAL PACIENTES ITU	204	97,06 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BALTANAS	94,83 %	77,78 %	88,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BALTANAS	2,00 %	2,00 %	4,00 %	52,00 %	24,00 %	24,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BALTANAS	4,52 %	1,94 %	39,35 %	3,87 %	18,06 %	21,94 %	2,58 %	67,74 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BAÑEZA I	933	91,02 %	1.025
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA I	96,23 %	89,02 %	85,05 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	33,33 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	5	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	33	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	185	98,38 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	761	98,42 %
	TOTAL PACIENTES ITU	930	97,85 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BAÑEZA I	0,57 %	0,57 %	7,39 %	35,80 %	12,50 %	5,11 %	0,57 %	36,36 %	6,25 %	36,93 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BAÑEZA I	0,13 %	1,06 %	3,70 %	32,23 %	1,32 %	3,57 %	0,26 %	0,13 %	19,95 %	12,81 %	66,97 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BAÑEZA II	711	89,89 %	791
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA II	91,10 %	90,41 %	89,04 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	39	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	61	96,72 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	641	98,13 %
	TOTAL PACIENTES ITU	718	97,35 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BAÑEZA II	0,59 %	0,59 %	7,10 %	34,91 %	7,10 %	9,47 %	44,38 %	6,51 %	28,99 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BAÑEZA II	0,92 %	0,37 %	2,03 %	35,79 %	3,32 %	4,98 %	0,55 %	18,27 %	7,20 %	69,93 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BARCO DE AVILA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
BARCO DE AVILA	291	85,09 %	342									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
BARCO DE AVILA	91,35 %	80,60 %	82,56 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	94,12 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	276	97,10 %
	TOTAL PACIENTES ITU	299	95,99 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	94,12 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	276	97,10 %
TOTAL PACIENTES ITU		299	95,99 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
BARCO DE AVILA	11,29 %	8,06 %	25,81 %	6,45 %	11,29 %	40,32 %	4,84 %	29,03 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
BARCO DE AVILA	8,30 %	0,44 %	5,68 %	0,44 %	25,33 %	2,62 %	4,37 %	17,03 %	7,86 %	68,56 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BARRIO ESPAÑA	345	92,49 %	373
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BARRIO ESPAÑA	93,44 %	91,53 %	90,98 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	85,71 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	88,89 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	320	99,06 %
	TOTAL PACIENTES ITU	340	97,65 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BARRIO ESPAÑA	1,89 %	13,21 %	30,19 %	32,08 %	5,66 %	52,83 %	7,55 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BARRIO ESPAÑA	0,34 %	1,37 %	24,66 %	11,30 %	3,42 %	0,34 %	15,75 %	3,08 %	72,95 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BEJAR	1.299	91,29 %	1.423
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEJAR	94,46 %	85,48 %	90,71 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	4	25,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	84,62 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	39	94,87 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	33,33 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.261	98,10 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.309	97,56 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BEJAR	7,57 %	3,95 %	36,84 %	26,97 %	10,20 %	0,66 %	0,66 %	30,26 %	2,63 %	28,29 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BEJAR	3,62 %	0,10 %	2,31 %	35,28 %	9,55 %	7,04 %	0,40 %	0,10 %	13,97 %	6,63 %	63,22 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BELORADO	295	89,67 %	329
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BELORADO	88,42 %	88,46 %	90,16 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	265	98,49 %
	TOTAL PACIENTES ITU	275	97,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BELORADO	16,90 %	59,15 %	5,63 %	7,04 %	18,31 %	4,23 %	36,62 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BELORADO	1,79 %	38,39 %	4,91 %	8,93 %	5,80 %	1,79 %	79,02 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BEMBIBRE	1.101	91,60 %	1.202
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEMBIBRE	95,37 %	87,16 %	90,19 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	29	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	117	99,15 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	998	96,89 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.113	97,04 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BEMBIBRE	0,46 %	0,46 %	0,46 %	5,56 %	45,37 %	12,50 %	23,15 %	37,96 %	3,70 %	12,50 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,03 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BEMBIBRE	0,68 %	0,11 %	4,41 %	52,77 %	3,73 %	9,27 %	0,23 %	12,32 %	4,29 %	56,16 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BENAVENTE NORTE

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BENAVENTE NORTE	734	88,33 %	831
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BENAVENTE NORTE	93,29 %	81,58 %	84,96 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	25	84,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	22	77,27 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	685	98,83 %
	TOTAL PACIENTES ITU	727	96,70 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE NORTE	4,90 %	7,69 %	29,37 %	28,67 %	16,08 %	30,07 %	2,80 %	25,87 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE NORTE	1,69 %	2,88 %	0,34 %	22,84 %	11,51 %	9,14 %	0,17 %	11,00 %	5,25 %	73,27 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BENAVENTE SUR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
BENAVENTE SUR	935	88,04 %	1.062									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=+70									
BENAVENTE SUR	90,93 %	80,98 %	86,62 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	4	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	85,29 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	42	85,71 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	883	96,49 %
	TOTAL PACIENTES ITU	949	95,05 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE SUR	2,65 %	5,29 %	26,98 %	21,69 %	12,17 %	0,53 %	36,51 %	2,12 %	30,69 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE SUR	1,88 %	2,95 %	0,54 %	29,62 %	9,25 %	6,30 %	0,27 %	11,13 %	5,90 %	66,89 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BERLANGA DE DUERO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
BERLANGA DE DUERO	99	88,39 %	112									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
BERLANGA DE DUERO				96,67 %	88,89 %	84,93 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	94,44 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	80	98,75 %
	TOTAL PACIENTES ITU	103	96,12 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BERLANGA DE DUERO	4,17 %	45,83 %	16,67 %	12,50 %	20,83 %	4,17 %	50,00 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BERLANGA DE DUERO	4,00 %	2,67 %	18,67 %	1,33 %	6,67 %	20,00 %	1,33 %	77,33 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BOÑAR	268	90,85 %	295
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BOÑAR	98,92 %	85,45 %	87,25 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	88,89 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	257	99,22 %
	TOTAL PACIENTES ITU	270	97,78 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BOÑAR	8,77 %	19,30 %	28,07 %	7,02 %	28,07 %	5,26 %	64,91 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BOÑAR	0,95 %	0,47 %	1,90 %	18,01 %	12,32 %	3,79 %	0,47 %	0,95 %	9,48 %	5,69 %	80,09 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BRIVIESCA	513	88,75 %	578
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BRIVIESCA	93,16 %	78,30 %	87,76 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	30	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	456	96,71 %
	TOTAL PACIENTES ITU	497	96,18 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BRIVIESCA	1,74 %	6,09 %	50,43 %	9,57 %	4,35 %	0,87 %	27,83 %	1,74 %	31,30 %
TOTAL GAP	0,32 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BRIVIESCA	1,01 %	0,75 %	0,25 %	38,19 %	2,26 %	5,03 %	0,25 %	0,25 %	18,09 %	4,77 %	66,83 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BURGO DE OSMA	436	88,08 %	495
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGO DE OSMA	91,77 %	84,71 %	86,22 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	40	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	392	97,19 %
	TOTAL PACIENTES ITU	429	96,97 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGO DE OSMA	0,88 %	2,65 %	9,73 %	35,40 %	12,39 %	23,01 %	0,88 %	0,88 %	7,96 %	44,25 %	7,08 %	27,43 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGO DE OSMA	0,31 %	1,86 %	4,64 %	0,31 %	27,24 %	3,41 %	8,36 %	1,55 %	16,72 %	8,67 %	68,42 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
BURGOHONDO	339	88,28 %	384
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOHONDO	89,63 %	87,88 %	87,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	84,62 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	327	96,94 %
	TOTAL PACIENTES ITU	347	95,97 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
BURGOHONDO	4,00 %	5,33 %	1,33 %	32,00 %	2,67 %	10,67 %	42,67 %	4,00 %	36,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
BURGOHONDO	0,38 %	0,38 %	3,03 %	0,76 %	24,62 %	2,65 %	8,33 %	1,14 %	21,97 %	3,03 %	69,32 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BURGOS RURAL NORTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
BURGOS RURAL NORTE	384	89,10 %	431										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70							
BURGOS RURAL NORTE	90,95 %	85,90 %	87,39 %										
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %										

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	91,67 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	50,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	358	96,93 %
	TOTAL PACIENTES ITU	390	95,38 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGOS RURAL NORTE	1,05 %	3,16 %	4,21 %	44,21 %	22,11 %	3,16 %	31,58 %	1,05 %	35,79 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGOS RURAL NORTE	1,04 %	2,08 %	24,22 %	6,23 %	2,42 %	6,57 %	3,81 %	82,01 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

BURGOS RURAL SUR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
BURGOS RURAL SUR	703	86,26 %	815									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
BURGOS RURAL SUR	91,55 %	78,40 %	82,40 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	91,67 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	50,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	16,67 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	652	98,31 %
	TOTAL PACIENTES ITU	678	97,49 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	91,67 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	50,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	16,67 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	652	98,31 %
TOTAL PACIENTES ITU		678	97,49 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGOS RURAL SUR	1,25 %	3,13 %	43,13 %	13,75 %	9,38 %	0,63 %	22,50 %	5,63 %	40,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGOS RURAL SUR	0,74 %	2,21 %	0,18 %	34,07 %	4,97 %	3,68 %	0,18 %	8,66 %	6,81 %	70,53 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CACABELOS				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CACABELOS	959	91,60 %	1.047									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	CACABELOS	96,02 %	85,71 %	89,07 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)								Nº Pac ITU	% Pac ITU J01		
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda								3	100,00 %		
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica								2	50,00 %		
N13.30	Hidronefrosis no especificadas								1			
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis								1			
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada								1			
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter								1			
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado								1			
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria								33	96,97 %		
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria								2	50,00 %		
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria								3	100,00 %		
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria								50	94,00 %		
N32.1	Fístula vesicointestinal								1	100,00 %		
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga								1			
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada								2	50,00 %		
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada								897	97,66 %		
	TOTAL PACIENTES ITU								964	96,99 %		

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CACABELOS	0,99 %	9,85 %	48,28 %	1,97 %	11,33 %	0,49 %	34,98 %	1,97 %	28,57 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CACABELOS	0,79 %	5,82 %	0,13 %	42,59 %	1,06 %	3,70 %	22,62 %	2,91 %	58,47 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CALZADA DE VALDUNCIEL	163	87,63 %	186
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CALZADA DE VALDUNCIEL	90,77 %	86,21 %	84,95 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	19	94,74 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	80,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	144	97,22 %
	TOTAL PACIENTES ITU	168	95,24 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CALZADA DE VALDUNCIEL	10,81 %	29,73 %	10,81 %	24,32 %	16,22 %	2,70 %	37,84 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CALZADA DE VALDUNCIEL	6,35 %	2,38 %	34,13 %	4,76 %	9,52 %	7,94 %	4,76 %	68,25 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CAMARZANA DE TERA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CAMARZANA DE TERA	261	87,29 %	299
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMARZANA DE TERA	83,61 %	85,00 %	88,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	75,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	87,50 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	255	98,43 %
	TOTAL PACIENTES ITU	264	98,11 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CAMARZANA DE TERA	8,00 %	2,67 %	29,33 %	29,33 %	12,00 %	1,33 %	22,67 %	50,67 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CAMARZANA DE TERA	4,30 %	2,15 %	0,54 %	27,42 %	16,67 %	7,53 %	13,44 %	2,15 %	72,58 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CAMPOS LAMPREANA	175	89,74 %	195
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMPOS LAMPREANA	92,31 %	80,00 %	90,91 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	162	98,77 %
	TOTAL PACIENTES ITU	175	98,29 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CAMPOS LAMPREANA	11,11 %	7,41 %	40,74 %	37,04 %	9,26 %	11,11 %	5,56 %	18,52 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CAMPOS LAMPREANA	6,61 %	9,92 %	19,83 %	11,57 %	5,79 %	3,31 %	4,13 %	73,55 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	438	91,82 %	477
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	95,70 %	90,00 %	88,89 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	409	99,02 %
	TOTAL PACIENTES ITU	438	98,86 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	7,14 %	7,14 %	25,71 %	20,00 %	12,86 %	1,43 %	37,14 %	15,71 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	2,72 %	1,90 %	0,27 %	30,43 %	2,45 %	12,77 %	9,24 %	8,15 %	72,01 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CANDELEDA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CANDELEDA	412	93,21 %	442									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
CANDELEDA	95,18 %	95,29 %	89,29 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	20	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	61	98,36 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	356	98,31 %
	TOTAL PACIENTES ITU	413	97,82 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	20	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	61	98,36 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	356	98,31 %
TOTAL PACIENTES ITU		413	97,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANDELEDA	4,08 %	11,22 %	11,22 %	4,08 %	5,10 %	1,02 %	55,10 %	7,14 %	34,69 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANDELEDA	2,23 %	1,91 %	16,56 %	3,82 %	4,14 %	21,02 %	13,69 %	76,43 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CANTALAPIEDRA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CANTALAPIEDRA	217	91,95 %	236									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	CANTALAPIEDRA	96,67 %	83,33 %	92,59 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	91,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	211	97,63 %
	TOTAL PACIENTES ITU	219	96,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANTALAPIEDRA	6,90 %	6,90 %	27,59 %	13,79 %	13,79 %	60,34 %	6,90 %	15,52 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANTALAPIEDRA	4,40 %	6,29 %	37,11 %	14,47 %	15,09 %	0,63 %	0,63 %	22,01 %	13,84 %	52,83 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CANTALEJO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CANTALEJO	401	89,11 %	450									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad												
CANTALEJO	94,74 %	88,89 %	84,69 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	26	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	20	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	366	98,63 %
	TOTAL PACIENTES ITU	398	97,99 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	26	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	20	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	366	98,63 %
TOTAL PACIENTES ITU		398	97,99 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CANTALEJO	2,41 %	18,07 %	46,99 %	10,84 %	9,64 %	30,12 %	6,02 %	31,33 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CANTALEJO	3,46 %	11,01 %	1,57 %	33,02 %	2,83 %	7,55 %	0,31 %	12,89 %	11,64 %	64,47 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CANTERAC	593	85,32 %	695
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANTERAC	90,94 %	73,11 %	84,23 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	60,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	22	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	92,86 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	532	98,68 %
	TOTAL PACIENTES ITU	570	97,37 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANTERAC	1,71 %	4,27 %	0,85 %	5,13 %	23,08 %	26,50 %	14,53 %	35,90 %	26,50 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CANTERAC	1,26 %	3,15 %	0,21 %	17,44 %	9,03 %	5,46 %	13,87 %	3,36 %	77,73 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CAPUCHINOS	673	91,69 %	734
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAPUCHINOS	93,80 %	84,82 %	90,81 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	14	85,71 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	92,31 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	643	97,51 %
	TOTAL PACIENTES ITU	677	96,16 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CAPUCHINOS	5,74 %	5,74 %	33,61 %	13,93 %	7,38 %	0,82 %	28,69 %	0,82 %	43,44 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CAPUCHINOS	0,18 %	7,44 %	2,90 %	0,18 %	28,49 %	6,53 %	5,63 %	6,53 %	8,35 %	73,87 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CARBAJALES DE ALBA	55	82,09 %	67
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	88,89 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	45	95,56 %
	TOTAL PACIENTES ITU	55	94,55 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBAJALES DE ALBA	88,89 %	90,91 %	78,72 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARBAJALES DE ALBA	4,55 %	18,18 %	4,55 %	31,82 %	63,64 %	13,64 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARBAJALES DE ALBA	12,12 %	24,24 %	6,06 %	12,12 %	12,12 %	9,09 %	63,64 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CARBALLEDA	245	95,33 %	257
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBALLEDA	97,87 %	93,75 %	94,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	240	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	245	100,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CARBALLEDA	1,59 %	4,76 %	4,76 %	47,62 %	3,17 %	25,40 %	28,57 %	6,35 %	42,86 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CARBALLEDA	6,59 %	3,30 %	1,65 %	35,71 %	10,44 %	14,29 %	1,10 %	7,14 %	11,54 %	69,78 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CARBONERO	618	87,78 %	704
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBONERO	91,27 %	84,55 %	86,29 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	75,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	87,50 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	4	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	590	98,47 %
	TOTAL PACIENTES ITU	622	97,11 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARBONERO	3,47 %	21,53 %	47,22 %	6,94 %	4,86 %	0,69 %	29,17 %	2,78 %	31,25 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARBONERO	1,69 %	12,66 %	0,21 %	25,32 %	1,48 %	5,70 %	13,50 %	4,64 %	74,05 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CARRION DE LOS CONDES	283	86,02 %	329
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARRION DE LOS CONDES	86,27 %	88,00 %	84,44 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	260	98,46 %
	TOTAL PACIENTES ITU	274	98,18 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARRION DE LOS CONDES	4,11 %	28,77 %	26,03 %	12,33 %	26,03 %	8,22 %	42,47 %
TOTAL GAP	3,11 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CARRION DE LOS CONDES	1,43 %	2,86 %	21,90 %	1,90 %	7,14 %	6,67 %	4,76 %	86,19 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CASA DEL BARCO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CASA DEL BARCO	668	83,92 %	796									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
CASA DEL BARCO	89,81 %	76,27 %	79,28 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	3	33,33 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	20	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	43	93,02 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	548	97,45 %
	TOTAL PACIENTES ITU	617	95,30 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CASA DEL BARCO	1,05 %	1,05 %	4,21 %	36,84 %	10,53 %	8,42 %	1,05 %	1,05 %	33,68 %	3,16 %	31,58 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CASA DEL BARCO	0,70 %	1,40 %	22,86 %	1,92 %	9,60 %	8,20 %	7,33 %	79,23 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CEBREROS	573	86,30 %	664
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CEBREROS	95,04 %	79,82 %	80,47 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	3	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	83,33 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	24	95,83 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	553	98,01 %
	TOTAL PACIENTES ITU	580	96,90 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CEBREROS	1,59 %	6,35 %	30,16 %	8,73 %	10,32 %	39,68 %	1,59 %	42,86 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CEBREROS	1,79 %	4,03 %	17,45 %	3,58 %	2,91 %	0,45 %	11,63 %	4,25 %	75,39 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CENTRO-GAMAZO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CENTRO-GAMAZO	697	83,77 %	832									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

% de pacientes con j01 por grupo de edad

14 a 59	60 a 69	=+70
92,50 %	79,51 %	78,90 %
92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	36	97,22 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	34	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	618	95,95 %
	TOTAL PACIENTES ITU	684	95,61 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CENTRO-GAMAZO	0,74 %	2,96 %	6,67 %	22,22 %	16,30 %	10,37 %	1,48 %	45,93 %	0,74 %	17,04 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CENTRO-GAMAZO	1,78 %	3,02 %	0,18 %	21,71 %	8,72 %	4,45 %	16,73 %	3,38 %	69,93 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CERVERA DE PISUERGA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CERVERA DE PISUERGA	233	88,93 %	262									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CIGALES	451	90,20 %	500
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIGALES	92,02 %	88,71 %	88,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	428	98,36 %
	TOTAL PACIENTES ITU	441	97,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIGALES	1,10 %	3,30 %	7,69 %	29,67 %	29,67 %	13,19 %	1,10 %	2,20 %	37,36 %	18,68 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIGALES	1,94 %	3,06 %	15,56 %	5,56 %	5,00 %	9,17 %	5,28 %	82,50 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CIRCULAR	751	87,02 %	863
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIRCULAR	94,14 %	83,09 %	82,66 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	19	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	65	98,46 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	654	98,17 %
	TOTAL PACIENTES ITU	723	97,37 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIRCULAR	0,69 %	4,14 %	7,59 %	31,03 %	20,69 %	11,03 %	0,69 %	48,28 %	0,69 %	17,24 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIRCULAR	0,50 %	2,15 %	23,10 %	4,29 %	3,14 %	0,17 %	14,03 %	3,47 %	76,73 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CIRCUNVALACION				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CIRCUNVALACION	759	87,85 %	864									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
CIRCUNVALACION	91,15 %	78,01 %	85,41 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	13	84,62 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	23	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	28	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	679	98,38 %
	TOTAL PACIENTES ITU	737	97,01 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIRCUNVALACION	0,68 %	4,76 %	10,20 %	19,05 %	27,21 %	9,52 %	2,04 %	35,37 %	2,72 %	23,81 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIRCUNVALACION	2,12 %	3,10 %	0,16 %	16,99 %	10,62 %	4,25 %	9,15 %	2,45 %	80,88 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CISTIERNA	505	91,16 %	554
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CISTIERNA	96,65 %	88,79 %	87,82 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	19	89,47 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	497	98,39 %
	TOTAL PACIENTES ITU	512	97,46 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CISTIERNA	1,04 %	3,13 %	1,04 %	10,42 %	43,75 %	6,25 %	10,42 %	1,04 %	25,00 %	9,38 %	47,92 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CISTIERNA	2,69 %	0,49 %	7,33 %	0,49 %	31,05 %	5,87 %	5,62 %	0,24 %	14,67 %	6,85 %	72,13 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CIUDAD RODRIGO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CIUDAD RODRIGO	1.132	91,14 %	1.242	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01					
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797	N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	80,00 %					
% de pacientes con j01 por grupo de edad	109,00	14 a 59	60 a 69	=+70	N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1					
					N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	100,00 %				
					N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3					
					N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1					
					N13.1	Quiste de riñón, adquirido	2	100,00 %				
					N13.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1					
					N50.00	Cistitis aguda sin hematuria	19	94,74 %				
					N50.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	72,73 %				
					N59.19	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2					
					N59.2	Carúncula uretral	2					
					N59.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.093	98,08 %				
						TOTAL PACIENTES ITU	1.128	97,16 %				
					CIUDAD RODRIGO	100,00 %	93,46 %	89,74 %	88,87 %			
TOTAL GAP	100,00 %	92,96 %	83,70 %	85,54 %								

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIUDAD RODRIGO	4,26 %	6,81 %	48,51 %	19,15 %	10,21 %	1,70 %	0,85 %	30,64 %	2,13 %	17,02 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CIUDAD RODRIGO	3,79 %	3,57 %	0,33 %	43,26 %	4,79 %	5,91 %	0,11 %	6,91 %	11,93 %	60,31 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CONDADO DE TREVIÑO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CONDADO DE TREVIÑO	127	92,70 %	137									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
CONDADO DE TREVIÑO	94,74 %	84,21 %	92,19 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	92,31 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	106	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	125	96,80 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	92,31 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	106	100,00 %
TOTAL PACIENTES ITU		125	96,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CONDADO DE TREVIÑO	4,17 %	25,00 %	20,83 %	12,50 %	41,67 %	4,17 %	16,67 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CONDADO DE TREVIÑO	8,74 %	14,56 %	22,33 %	4,85 %	13,59 %	5,83 %	73,79 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CONDESA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CONDESA	1.092	86,94 %	1.256									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	109,00	14 a 59	60 a 69	=+70	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01				
					N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %				
					N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	80,00 %				
					N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %				
					N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %				
					N13.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %				
					N14.00	Cistitis aguda sin hematuria	32	96,88 %				
					N14.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	173	96,53 %				
					N14.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1					
					N15.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %				
					N16.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %				
					N16.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	902	97,78 %				
					TOTAL PACIENTES ITU		1.086	97,15 %				
					CONDESA	100,00 %	95,06 %	84,12 %	81,32 %			
TOTAL GAP	100,00 %	92,96 %	83,70 %	85,54 %								

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CONDESA	0,60 %	1,20 %	0,60 %	4,82 %	43,98 %	12,65 %	10,84 %	0,60 %	39,16 %	8,43 %	31,93 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CONDESA	1,19 %	0,32 %	0,11 %	3,13 %	0,11 %	37,37 %	3,13 %	4,00 %	0,22 %	9,94 %	3,67 %	68,36 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CORRALES	213	89,50 %	238
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CORRALES	96,36 %	82,35 %	87,42 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	88,89 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	71,43 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	206	96,12 %
	TOTAL PACIENTES ITU	218	95,41 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CORRALES	8,93 %	12,50 %	30,36 %	12,50 %	12,50 %	41,07 %	1,79 %	35,71 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CORRALES	5,10 %	6,37 %	21,66 %	7,64 %	3,82 %	0,64 %	7,01 %	1,91 %	73,89 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CRISTOBAL ACOSTA	758	85,07 %	891
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRISTOBAL ACOSTA	91,91 %	83,72 %	79,87 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	19	94,74 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	697	97,56 %
	TOTAL PACIENTES ITU	736	97,28 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CRISTOBAL ACOSTA	0,76 %	7,58 %	53,03 %	14,39 %	8,33 %	29,55 %	5,30 %	34,09 %
TOTAL GAP	0,32 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CRISTOBAL ACOSTA	0,32 %	0,16 %	1,44 %	33,23 %	3,67 %	3,99 %	0,16 %	6,39 %	5,91 %	74,76 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CRUCERO	622	89,11 %	698
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRUCERO	94,83 %	85,25 %	84,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	69	94,20 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	75,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	70	97,14 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	496	97,98 %
	TOTAL PACIENTES ITU	620	97,10 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CRUCERO	1,96 %	9,80 %	44,12 %	8,82 %	3,92 %	0,98 %	15,69 %	4,90 %	41,18 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CRUCERO	1,15 %	0,19 %	1,15 %	0,19 %	30,38 %	1,73 %	4,04 %	0,19 %	8,85 %	7,50 %	71,73 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
CUELLAR	741	84,01 %	882
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CUELLAR	89,66 %	82,69 %	78,44 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	3	66,67 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	84,62 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	22	90,91 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	675	98,07 %
	TOTAL PACIENTES ITU	707	97,17 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CUELLAR	4,58 %	0,65 %	16,34 %	47,71 %	5,23 %	11,76 %	1,96 %	30,72 %	3,27 %	23,53 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CUELLAR	0,17 %	2,55 %	10,03 %	1,36 %	29,59 %	0,85 %	6,46 %	12,59 %	3,74 %	71,43 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

CUENCA DEL BERNESGA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
CUENCA DEL BERNESGA	584	92,99 %	628									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
CUENCA DEL BERNESGA	96,91 %	91,06 %	91,08 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	25	96,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	64	98,44 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	507	99,21 %
	TOTAL PACIENTES ITU	588	98,13 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CUENCA DEL BERNESGA	1,60 %	8,80 %	35,20 %	8,00 %	14,40 %	0,80 %	0,80 %	38,40 %	5,60 %	32,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
CUENCA DEL BERNESGA	1,09 %	2,40 %	34,20 %	5,88 %	8,06 %	0,22 %	0,22 %	12,42 %	3,70 %	71,46 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

DELICIAS I		Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
DELICIAS I	1.402	87,30 %	1.606										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70										
	DELICIAS I	92,00 %	79,35 %	83,07 %									
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
				Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01						
				N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	80,00 %						
				N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %						
				N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %						
				N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1							
				N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %						
				N28.1	Quiste de riñón, adquirido	3	33,33 %						
			N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2								
			N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	25,00 %							
			N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	46	97,83 %							
			N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %							
			N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	66,67 %							
			N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	92	94,57 %							
			N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	3								
			N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4								
			N36.2	Carúncula uretral	1								
			N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1								
			N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.208	97,52 %							
						TOTAL PACIENTES ITU	1.328	96,31 %					
Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS			
	DELICIAS I	2,87 %	1,23 %	36,89 %	8,20 %	7,38 %	0,41 %	0,41 %	34,02 %	2,46 %	34,02 %		
	TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %		
Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS	
	DELICIAS I	2,25 %	1,12 %	0,26 %	31,61 %	1,55 %	7,17 %	0,26 %	0,09 %	0,09 %	8,38 %	3,71 %	75,39 %
	TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
DELICIAS II	950	88,13 %	1.078
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
DELICIAS II	92,50 %	80,27 %	84,22 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	81,82 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	6	16,67 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	88,89 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	3	33,33 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	63	96,83 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	835	97,72 %
	TOTAL PACIENTES ITU	914	96,39 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
DELICIAS II	0,63 %	3,14 %	3,14 %	50,31 %	8,18 %	7,55 %	0,63 %	31,45 %	1,89 %	37,11 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
DELICIAS II	2,15 %	1,14 %	0,38 %	28,57 %	1,77 %	4,80 %	0,13 %	0,25 %	6,70 %	7,59 %	76,74 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-12

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
DESCONOCIDO	2	15,38 %	13
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
DESCONOCIDO	100,00 %		10,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres
TOTAL GAP

Subgrupos del J01 - Mujer	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ON
DESCONOCIDO	100,00 %
TOTAL GAP	30,29 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES ITU	4	50,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
EL EJIDO	1.201	87,79 %	1.368
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
EL EJIDO	94,36 %	84,23 %	81,70 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	101	99,01 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	67	95,52 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.070	99,16 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.199	98,17 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
EL EJIDO	1,09 %	0,55 %	3,83 %	32,79 %	14,75 %	11,48 %	0,55 %	32,24 %	7,65 %	30,60 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
EL EJIDO	1,18 %	0,29 %	2,26 %	0,10 %	35,17 %	2,55 %	4,72 %	0,20 %	0,39 %	0,10 %	10,41 %	8,15 %	70,14 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
EL ESPINAR	439	89,05 %	493
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
EL ESPINAR	92,31 %	80,95 %	86,67 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	420	98,33 %
	TOTAL PACIENTES ITU	435	97,01 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
EL ESPINAR	3,37 %	6,74 %	37,08 %	10,11 %	6,74 %	32,58 %	5,62 %	28,09 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
EL ESPINAR	0,86 %	1,71 %	23,71 %	4,00 %	5,43 %	0,29 %	6,00 %	10,29 %	78,00 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ERAS DEL BOSQUE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ERAS DEL BOSQUE	919	84,94 %	1.082									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
ERAS DEL BOSQUE	94,71 %	77,83 %	77,12 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	62,50 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	33,33 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	5	20,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	63	96,83 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	33,33 %
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	824	97,09 %
	TOTAL PACIENTES ITU	911	95,83 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ERAS DEL BOSQUE	6,35 %	5,29 %	35,45 %	5,82 %	12,17 %	36,51 %	3,17 %	29,63 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ERAS DEL BOSQUE	2,05 %	3,42 %	22,74 %	2,33 %	9,04 %	0,27 %	0,14 %	16,44 %	3,84 %	70,00 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

ESGUEVILLAS				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
ESGUEVILLAS	84	89,36 %	94									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
ESGUEVILLAS	93,75 %	100,00 %	85,94 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	84	97,62 %
	TOTAL PACIENTES ITU	86	96,51 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	84	97,62 %
TOTAL PACIENTES ITU		86	96,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ESGUEVILLAS	6,90 %	20,69 %	20,69 %	55,17 %	17,24 %	24,14 %	3,45 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ESGUEVILLAS	3,64 %	16,36 %	12,73 %	5,45 %	12,73 %	9,09 %	76,36 %
TOTAL GAP	2,32 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ESPINOSA DE LOS MONTER	226	91,87 %	246
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ESPINOSA DE LOS MONTER	92,65 %	87,10 %	92,52 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	213	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	220	100,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	3,13 %	12,50 %	29,69 %	26,56 %	1,56 %	45,31 %	35,94 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	1,23 %	4,94 %	32,72 %	9,88 %	1,23 %	27,78 %	1,23 %	64,81 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FABERO	519	90,42 %	574
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FABERO	94,05 %	87,39 %	88,64 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	10	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	27	96,30 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	481	97,51 %
	TOTAL PACIENTES ITU	513	96,69 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FABERO	27,52 %	0,92 %	32,11 %	12,84 %	11,01 %	26,61 %	2,75 %	30,28 %
TOTAL GAP	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FABERO	3,41 %	10,24 %	1,71 %	29,51 %	1,71 %	4,39 %	0,49 %	0,24 %	13,17 %	4,88 %	72,20 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FONTIVEROS	215	88,11 %	244
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FONTIVEROS	90,38 %	90,00 %	86,84 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	80,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	15	93,33 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	206	98,54 %
	TOTAL PACIENTES ITU	219	97,72 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FONTIVEROS	3,39 %	8,47 %	47,46 %	5,08 %	10,17 %	13,56 %	1,69 %	37,29 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FONTIVEROS	2,56 %	7,69 %	39,74 %	6,41 %	2,56 %	0,64 %	12,82 %	3,85 %	59,62 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FROMISTA	207	76,38 %	271
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FROMISTA	92,98 %	60,38 %	75,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	77,78 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	189	96,83 %
	TOTAL PACIENTES ITU	200	95,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FROMISTA	3,77 %	11,32 %	45,28 %	9,43 %	9,43 %	24,53 %	1,89 %	41,51 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FROMISTA	0,65 %	4,55 %	5,84 %	21,43 %	1,95 %	3,25 %	0,65 %	19,48 %	5,84 %	76,62 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FUENTEGUINALDO	173	96,65 %	179
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FUENTEGUINALDO	93,10 %	96,00 %	97,60 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	49	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	140	99,29 %
	TOTAL PACIENTES ITU	172	100,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FUENTEGUINALDO	20,00 %	5,71 %	37,14 %	5,71 %	5,71 %	25,71 %	11,43 %	48,57 %
TOTAL GAP	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FUENTEGUINALDO	1,45 %	7,97 %	12,32 %	31,88 %	1,45 %	5,80 %	16,67 %	13,04 %	74,64 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FUENTESAUCO	75	76,53 %	98
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FUENTESAUCO	87,50 %	69,23 %	75,36 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	42	97,62 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	40	97,50 %
	TOTAL PACIENTES ITU	74	98,65 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FUENTESAUCO	4,35 %	4,35 %	52,17 %	13,04 %	4,35 %	26,09 %	30,43 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FUENTESAUCO	7,69 %	3,85 %	1,92 %	17,31 %	3,85 %	1,92 %	11,54 %	21,15 %	71,15 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
FUENTES DE OÑORO	158	89,27 %	177
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FUENTES DE OÑORO	94,44 %	90,00 %	85,11 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	152	97,37 %
	TOTAL PACIENTES ITU	161	96,89 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FUENTES DE OÑORO	2,04 %	4,08 %	48,98 %	6,12 %	6,12 %	30,61 %	6,12 %	20,41 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FUENTES DE OÑORO	0,92 %	2,75 %	1,83 %	36,70 %	0,92 %	6,42 %	0,92 %	0,92 %	11,01 %	20,18 %	65,14 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

GAMONAL-ANTIGUA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
GAMONAL-ANTIGUA	766	82,63 %	927										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70										
	GAMONAL-ANTIGUA	86,46 %	77,86 %	79,81 %									
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS			
	GAMONAL-ANTIGUA	0,59 %	0,59 %	7,10 %	39,05 %	19,53 %	5,33 %	0,59 %	34,91 %	3,55 %	23,67 %		
	TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %		
	Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS			
		GAMONAL-ANTIGUA	0,67 %	1,51 %	32,50 %	5,03 %	1,84 %	0,17 %	8,04 %	5,36 %	73,70 %		
		TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %		

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GARCIA LORCA	782	82,75 %	945
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARCIA LORCA	91,13 %	77,78 %	78,47 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	4	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	27	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	10	30,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	704	97,87 %
	TOTAL PACIENTES ITU	769	96,10 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARCIA LORCA	1,18 %	0,59 %	57,65 %	6,47 %	5,88 %	38,24 %	5,88 %	22,94 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARCIA LORCA	0,16 %	0,33 %	1,63 %	36,93 %	1,63 %	2,12 %	12,75 %	5,07 %	69,44 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GARRIDO NORTE	1.196	89,72 %	1.333
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARRIDO NORTE	93,68 %	85,48 %	87,82 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	80,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	4	25,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	88,46 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	50,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.138	97,36 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.187	96,55 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO NORTE	0,40 %	4,80 %	6,40 %	40,00 %	17,60 %	16,40 %	0,40 %	1,60 %	28,00 %	0,80 %	30,40 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO NORTE	3,91 %	2,11 %	30,66 %	3,38 %	10,47 %	0,11 %	8,56 %	6,24 %	73,15 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

GARRIDO SUR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
GARRIDO SUR	1.358	86,00 %	1.579									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
GARRIDO SUR	90,68 %	84,72 %	81,40 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	16	62,50 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	6	66,67 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	4	25,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	35	91,43 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	55	90,91 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	5	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	50,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.304	95,17 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.406	93,74 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO SUR	6,49 %	4,76 %	43,29 %	13,42 %	16,88 %	0,87 %	31,60 %	3,46 %	29,87 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO SUR	4,17 %	0,27 %	2,31 %	0,09 %	36,91 %	2,57 %	9,14 %	0,09 %	6,21 %	7,54 %	68,86 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GOMARA	73	89,02 %	82
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GOMARA	93,75 %	88,24 %	86,27 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	67	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	73	98,63 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GOMARA	13,64 %	13,64 %	40,91 %	4,55 %	9,09 %	36,36 %	40,91 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GOMARA	3,92 %	3,92 %	23,53 %	3,92 %	1,96 %	5,88 %	1,96 %	82,35 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GREDOS	142	91,61 %	155
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	80,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	138	99,28 %
	TOTAL PACIENTES ITU	142	98,59 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GREDOS	92,11 %	96,30 %	90,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GREDOS	13,51 %	10,81 %	16,22 %	2,70 %	27,03 %	29,73 %	5,41 %	51,35 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GREDOS	3,81 %	2,86 %	19,05 %	0,95 %	11,43 %	5,71 %	9,52 %	80,00 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GUARDO	522	89,85 %	581
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUARDO	95,95 %	83,21 %	87,56 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	66,67 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	27	96,30 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	501	98,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	526	97,34 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUARDO	0,95 %	5,71 %	1,90 %	34,29 %	4,76 %	18,10 %	0,95 %	30,48 %	4,76 %	30,48 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUARDO	2,64 %	1,92 %	0,96 %	28,06 %	0,72 %	6,47 %	0,24 %	0,48 %	11,51 %	7,67 %	72,42 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GUAREÑA	296	81,54 %	363
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUAREÑA	92,22 %	77,94 %	78,16 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	85,71 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	285	96,49 %
	TOTAL PACIENTES ITU	305	94,10 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUAREÑA	4,62 %	38,46 %	23,08 %	6,15 %	41,54 %	23,08 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUAREÑA	1,30 %	3,46 %	21,65 %	8,66 %	6,93 %	12,99 %	2,16 %	77,49 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
GUIJUELO	734	90,62 %	810
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUIJUELO	94,78 %	81,48 %	88,99 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	40	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	96,15 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	702	96,87 %
	TOTAL PACIENTES ITU	750	96,53 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUIJUELO	0,76 %	3,03 %	0,76 %	6,82 %	44,70 %	25,00 %	18,94 %	37,88 %	0,76 %	13,64 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,03 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GUIJUELO	3,16 %	3,32 %	0,17 %	46,35 %	8,80 %	10,63 %	11,30 %	4,82 %	58,80 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
HERRERA DE PISUERGA	281	86,73 %	324
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HERRERA DE PISUERGA	95,33 %	87,69 %	80,39 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	75,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	266	98,87 %
	TOTAL PACIENTES ITU	284	97,18 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
HERRERA DE PISUERGA	27,69 %	12,31 %	12,31 %	44,62 %	6,15 %	29,23 %
TOTAL GAP	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DB / CEFALOSP ORINAS DE PRIMERA GENERACI ÓN	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACRÓLID OS	J01FF / LINCOSAMI DAS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
HERRERA DE PISUERGA	6,02 %	0,93 %	0,46 %	13,43 %	2,31 %	2,78 %	0,93 %	0,46 %	18,52 %	11,11 %	74,07 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

HUERTA DEL REY				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
HUERTA DEL REY	1.107	83,61 %	1.324									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
HUERTA DEL REY	89,78 %	81,04 %	77,56 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	13	92,31 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	80,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	66,67 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	6	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	39	97,44 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	6	83,33 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	71	91,55 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	882	97,05 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.000	95,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
HUERTA DEL REY	3,09 %	4,12 %	44,85 %	11,34 %	12,89 %	1,03 %	0,52 %	27,32 %	4,12 %	26,29 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
HUERTA DEL REY	0,88 %	1,97 %	26,62 %	1,20 %	6,13 %	0,11 %	0,22 %	6,02 %	6,79 %	80,28 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
HUERTA DE REY	113	92,62 %	122
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HUERTA DE REY	95,45 %	92,59 %	90,38 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	87,50 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	110	97,27 %
	TOTAL PACIENTES ITU	117	96,58 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
HUERTA DE REY	10,71 %	50,00 %	17,86 %	7,14 %	28,57 %	32,14 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
HUERTA DE REY	1,18 %	4,71 %	1,18 %	37,65 %	1,18 %	1,18 %	14,12 %	1,18 %	64,71 %
TOTAL GAP	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
IGNACIO LOPEZ SAIZ	671	81,73 %	821
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
IGNACIO LOPEZ SAIZ	89,68 %	79,00 %	76,33 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	33	96,97 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	609	96,06 %
	TOTAL PACIENTES ITU	666	94,59 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	1,43 %	5,71 %	52,86 %	9,29 %	3,57 %	1,43 %	25,00 %	3,57 %	32,14 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	0,56 %	2,82 %	33,71 %	3,20 %	3,39 %	6,03 %	4,90 %	71,75 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ISCAR	813	90,23 %	901
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ISCAR	92,65 %	88,52 %	88,24 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	779	98,33 %
	TOTAL PACIENTES ITU	801	98,00 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ISCAR	1,19 %	8,33 %	25,60 %	21,43 %	12,50 %	0,60 %	48,81 %	5,36 %	29,76 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ISCAR	1,55 %	2,79 %	17,96 %	6,97 %	6,04 %	0,31 %	0,31 %	13,16 %	11,92 %	77,86 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
JARDINILLOS	750	81,08 %	925
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JARDINILLOS	85,92 %	77,78 %	77,73 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	5	20,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	6	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	96,15 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	690	95,51 %
	TOTAL PACIENTES ITU	754	93,90 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JARDINILLOS	2,38 %	10,12 %	36,90 %	14,88 %	10,12 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	27,38 %	0,60 %	26,79 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JARDINILLOS	2,23 %	2,92 %	0,17 %	24,40 %	2,92 %	8,42 %	0,34 %	0,17 %	9,79 %	4,64 %	71,99 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
JOSE AGUADO	1.593	91,08 %	1.749
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSE AGUADO	94,95 %	91,97 %	86,77 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	68	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	92	92,39 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.464	98,22 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.588	97,98 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSE AGUADO	0,69 %	1,04 %	3,82 %	47,92 %	8,68 %	10,42 %	0,69 %	0,35 %	1,04 %	36,46 %	6,25 %	26,39 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSE AGUADO	0,15 %	1,53 %	0,08 %	1,76 %	34,56 %	3,83 %	5,21 %	0,38 %	0,15 %	17,39 %	8,05 %	66,44 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	1.140	87,22 %	1.307
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	91,63 %	76,72 %	83,13 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	4	25,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	40	97,50 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	41	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.023	97,56 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.119	96,25 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	1,61 %	1,08 %	9,14 %	40,32 %	13,44 %	4,30 %	0,54 %	32,80 %	3,76 %	27,42 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	0,10 %	0,73 %	0,10 %	2,31 %	32,49 %	2,83 %	1,89 %	8,91 %	6,92 %	74,95 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

LA ALAMEDILLA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
LA ALAMEDILLA	1.033	85,30 %	1.211									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
LA ALAMEDILLA	89,67 %	81,22 %	82,86 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	90,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	4	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	21	95,24 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	41	90,24 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	3	33,33 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	974	97,13 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.047	95,70 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA ALAMEDILLA	8,72 %	4,10 %	36,92 %	24,62 %	12,82 %	31,79 %	2,56 %	18,46 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA ALAMEDILLA	4,53 %	0,36 %	1,67 %	0,24 %	30,91 %	2,98 %	6,68 %	0,12 %	0,12 %	0,24 %	5,61 %	8,59 %	74,46 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA ALBERCA	175	94,09 %	186
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA ALBERCA	92,86 %	93,55 %	95,10 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	66,67 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	173	99,42 %
	TOTAL PACIENTES ITU	176	98,86 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA ALBERCA	8,11 %	8,11 %	32,43 %	32,43 %	24,32 %	8,11 %	8,11 %	21,62 %	2,70 %	21,62 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA ALBERCA	2,17 %	7,25 %	44,20 %	5,07 %	13,77 %	2,90 %	1,45 %	7,25 %	9,42 %	65,22 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA CABRERA	40	88,89 %	45
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA CABRERA	93,75 %	77,78 %	90,48 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	36	97,22 %
	TOTAL PACIENTES ITU	40	97,50 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
LA CABRERA	11,11 %	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	14,02 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINA S CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
LA CABRERA	9,68 %	6,45 %	19,35 %	3,23 %	29,03 %	3,23 %	61,29 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA FUENTE SAN ESTEBAN	288	90,28 %	319
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA FUENTE SAN ESTEBAN	93,33 %	89,19 %	89,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	75,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	280	98,57 %
	TOTAL PACIENTES ITU	293	97,61 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	7,46 %	7,46 %	35,82 %	5,97 %	5,97 %	44,78 %	4,48 %	29,85 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	10,41 %	5,43 %	45,70 %	5,43 %	11,31 %	14,48 %	6,33 %	57,47 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

LAGUNA DE DUERO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
LAGUNA DE DUERO	1.488	85,42 %	1.742										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70										
LAGUNA DE DUERO	90,85 %	73,49 %	80,97 %										
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %										
				Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)					Nº Pac ITU	% Pac ITU J01		
				N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda					7	85,71 %		
				N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica					4	100,00 %		
				N13.30	Hidronefrosis no especificadas					4	25,00 %		
				N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis					3			
				N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado					1			
				N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada					2	50,00 %		
				N28.1	Quiste de riñón, adquirido					3			
				N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter					1			
				N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado					3	33,33 %		
				N30.00	Cistitis aguda sin hematuria					11	90,91 %		
				N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria					1	100,00 %		
				N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria					2	50,00 %		
				N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria					46	93,48 %		
				N32.1	Fístula vesicointestinal					1			
				N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga					2			
				N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada					8	25,00 %		
				N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada					1.237	97,57 %		
									TOTAL PACIENTES ITU	1.297	96,07 %		
Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS			
	LAGUNA DE DUERO	2,00 %	6,00 %	44,00 %	12,80 %	12,00 %	0,80 %	0,40 %	32,00 %	1,20 %	26,00 %		
	TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %		
Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS	
	LAGUNA DE DUERO	0,16 %	1,78 %	1,70 %	0,08 %	28,68 %	1,53 %	7,27 %	0,40 %	0,16 %	9,29 %	4,93 %	77,54 %
	TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA MAGDALENA	178	88,56 %	201
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA MAGDALENA	90,48 %	80,56 %	90,29 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	168	95,83 %
	TOTAL PACIENTES ITU	183	96,17 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA MAGDALENA	2,86 %	8,57 %	45,71 %	11,43 %	11,43 %	31,43 %	8,57 %	25,71 %
TOTAL GAP	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA MAGDALENA	5,59 %	2,10 %	1,40 %	19,58 %	1,40 %	2,80 %	27,27 %	7,69 %	60,84 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LANZAHITA	203	90,63 %	224
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LANZAHITA	98,00 %	86,11 %	88,57 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	93,75 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	180	97,22 %
	TOTAL PACIENTES ITU	207	96,62 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LANZAHITA	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %	28,57 %	9,52 %	4,76 %	23,81 %	7,14 %	38,10 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LANZAHITA	1,24 %	8,70 %	1,86 %	21,12 %	10,56 %	12,42 %	0,62 %	27,95 %	13,04 %	42,24 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

LA PALOMERA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
LA PALOMERA	1.442	90,58 %	1.592									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
				LA PALOMERA	94,57 %	86,38 %	86,06 %					
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	87,50 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	112	98,21 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	115	98,26 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.273	97,72 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.450	97,31 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA PALOMERA	0,88 %	0,44 %	0,44 %	7,08 %	36,28 %	12,39 %	7,96 %	0,88 %	0,44 %	38,05 %	5,75 %	28,76 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	0,03 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA PALOMERA	0,16 %	2,47 %	0,49 %	1,64 %	0,08 %	36,43 %	4,36 %	5,02 %	0,16 %	0,33 %	0,08 %	12,01 %	5,02 %	72,29 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA PUEBLA	959	78,67 %	1.219
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA PUEBLA	88,04 %	72,38 %	72,96 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	3	33,33 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	35	91,43 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	54	92,59 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N36.2	Carúncula uretral	2	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	872	95,87 %
TOTAL PACIENTES ITU		955	94,55 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA PUEBLA	0,53 %	3,19 %	4,26 %	35,11 %	14,36 %	9,04 %	1,06 %	0,53 %	33,51 %	4,79 %	35,64 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA PUEBLA	0,13 %	2,98 %	3,24 %	0,13 %	23,74 %	2,08 %	4,93 %	0,13 %	0,13 %	11,15 %	5,06 %	74,32 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

LAS HUELGAS

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
LAS HUELGAS	479	87,73 %	546									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

% de pacientes con j01 por grupo de edad

LAS HUELGAS	92,62 %	82,26 %	80,53 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	80,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	430	97,67 %
	TOTAL PACIENTES ITU	454	96,92 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	80,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	430	97,67 %
TOTAL PACIENTES ITU		454	96,92 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS HUELGAS	4,00 %	58,67 %	5,33 %	10,67 %	1,33 %	28,00 %	4,00 %	21,33 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS HUELGAS	0,25 %	1,24 %	40,10 %	4,70 %	2,72 %	5,69 %	2,48 %	67,08 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA SIERRA	92	86,79 %	106
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA SIERRA	91,43 %	68,75 %	87,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	92	93,48 %
	TOTAL PACIENTES ITU	97	92,78 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA SIERRA	5,26 %	10,53 %	26,32 %	5,26 %	47,37 %	47,37 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA SIERRA	12,33 %	10,96 %	15,07 %	2,74 %	4,11 %	12,33 %	2,74 %	69,86 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LAS NAVAS DEL MARQUES	429	91,67 %	468
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS NAVAS DEL MARQUES	95,91 %	89,53 %	86,59 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	4	25,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	18	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	90,91 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	413	97,82 %
	TOTAL PACIENTES ITU	435	97,24 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LAS NAVAS DEL MARQUES	4,94 %	9,88 %	32,10 %	6,17 %	17,28 %	44,44 %	4,94 %	16,05 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LAS NAVAS DEL MARQUES	2,59 %	0,57 %	5,75 %	18,97 %	15,52 %	7,18 %	14,94 %	4,31 %	70,69 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LAS TORRES	760	85,49 %	889
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS TORRES	89,92 %	78,46 %	83,33 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	87,50 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	4	50,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	42	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	681	97,65 %
	TOTAL PACIENTES ITU	739	97,56 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS TORRES	2,13 %	10,64 %	34,75 %	19,15 %	7,09 %	1,42 %	31,91 %	3,55 %	27,66 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LAS TORRES	0,48 %	2,10 %	29,89 %	2,58 %	3,55 %	0,16 %	8,08 %	5,65 %	76,90 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LA VICTORIA	739	86,33 %	856
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA VICTORIA	90,39 %	84,00 %	81,96 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	24	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	680	96,76 %
	TOTAL PACIENTES ITU	739	96,08 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA VICTORIA	0,68 %	0,68 %	0,68 %	6,12 %	2,04 %	25,17 %	15,65 %	12,24 %	36,05 %	29,25 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,03 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LA VICTORIA	0,17 %	0,84 %	2,36 %	0,34 %	16,39 %	5,57 %	3,04 %	0,17 %	11,99 %	3,38 %	79,73 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LEDESMA	257	91,13 %	282
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LEDESMA	96,10 %	82,69 %	90,32 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	259	95,75 %
	TOTAL PACIENTES ITU	266	95,86 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LEDESMA	2,50 %	2,50 %	23,75 %	17,50 %	15,00 %	1,25 %	55,00 %	3,75 %	32,50 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LEDESMA	2,82 %	1,13 %	0,56 %	27,68 %	10,17 %	9,60 %	20,34 %	11,86 %	72,88 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LERMA	360	86,54 %	416
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LERMA	92,31 %	75,81 %	85,92 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	97,06 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	93,75 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	309	97,41 %
	TOTAL PACIENTES ITU	361	95,84 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LERMA	1,14 %	7,95 %	45,45 %	15,91 %	6,82 %	1,14 %	30,68 %	31,82 %
TOTAL GAP	0,32 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LERMA	0,74 %	0,37 %	40,81 %	6,25 %	1,84 %	0,37 %	0,37 %	12,87 %	2,21 %	74,26 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LINARES DE RIOFRIO	194	91,94 %	211
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LINARES DE RIOFRIO	90,74 %	87,18 %	94,12 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	191	98,95 %
	TOTAL PACIENTES ITU	194	98,97 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LINARES DE RIOFRIO	4,17 %	2,08 %	41,67 %	31,25 %	8,33 %	25,00 %	2,08 %	12,50 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LINARES DE RIOFRIO	1,37 %	4,11 %	2,05 %	32,88 %	8,22 %	7,53 %	6,16 %	8,22 %	70,55 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LOS COMUNEROS	812	82,60 %	983
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS COMUNEROS	90,91 %	73,85 %	79,46 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	13	69,23 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	46	93,48 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	35	97,14 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	720	97,64 %
	TOTAL PACIENTES ITU	802	95,76 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LOS COMUNEROS	0,56 %	2,26 %	0,56 %	10,17 %	46,89 %	16,38 %	6,21 %	0,56 %	29,94 %	6,21 %	26,55 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LOS COMUNEROS	2,36 %	2,68 %	30,08 %	9,76 %	2,83 %	0,31 %	0,16 %	8,35 %	5,98 %	73,54 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LOS CUBOS	683	84,53 %	808
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS CUBOS	87,83 %	83,48 %	79,79 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	71,43 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	25	88,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	18	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	617	98,06 %
	TOTAL PACIENTES ITU	662	96,68 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LOS CUBOS	1,52 %	3,03 %	42,42 %	14,39 %	9,09 %	0,76 %	0,76 %	42,42 %	6,82 %	18,18 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LOS CUBOS	1,27 %	1,27 %	26,68 %	6,35 %	2,72 %	0,36 %	10,16 %	4,54 %	77,31 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
LUMBRALES	318	87,60 %	363
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LUMBRALES	92,41 %	86,27 %	86,27 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	320	97,19 %
	TOTAL PACIENTES ITU	328	96,34 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LUMBRALES	3,03 %	6,06 %	29,29 %	32,32 %	8,08 %	2,02 %	35,35 %	16,16 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LUMBRALES	0,46 %	5,48 %	3,20 %	36,07 %	15,53 %	9,13 %	2,74 %	0,46 %	17,35 %	4,57 %	45,21 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MADRIGAL ALTAS TORRES	177	88,50 %	200
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MADRIGAL ALTAS TORRES	93,55 %	86,96 %	85,11 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	80,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	156	98,72 %
	TOTAL PACIENTES ITU	174	97,13 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MADRIGAL ALTAS TORRES	2,33 %	6,98 %	41,86 %	16,28 %	11,63 %	37,21 %	2,33 %	23,26 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MADRIGAL ALTAS TORRES	0,75 %	6,72 %	17,16 %	4,48 %	2,99 %	17,91 %	1,49 %	79,85 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MAGDALENA	564	89,38 %	631
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MAGDALENA	96,65 %	84,51 %	85,55 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	24	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	19	89,47 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	520	98,85 %
	TOTAL PACIENTES ITU	562	97,86 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MAGDALENA	2,88 %	4,81 %	25,00 %	30,77 %	12,50 %	0,96 %	0,96 %	47,12 %	10,58 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MAGDALENA	1,30 %	5,00 %	18,04 %	13,70 %	6,52 %	10,00 %	3,26 %	74,57 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MANSILLA DE LAS MULAS	371	93,22 %	398
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MANSILLA DE LAS MULAS	95,95 %	92,86 %	91,35 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	17	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	18	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	340	98,53 %
	TOTAL PACIENTES ITU	367	97,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MANSILLA DE LAS MULAS	1,45 %	60,87 %	14,49 %	10,14 %	30,43 %	8,70 %	34,78 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MANSILLA DE LAS MULAS	0,66 %	1,66 %	50,66 %	4,64 %	6,29 %	0,33 %	8,94 %	4,97 %	61,59 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MATALLANA DE TORIO	99	87,61 %	113
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MATALLANA DE TORIO	91,49 %	89,47 %	83,33 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	87,50 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	86	97,67 %
	TOTAL PACIENTES ITU	96	95,83 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MATALLANA DE TORIO	6,25 %	25,00 %	31,25 %	18,75 %	6,25 %	43,75 %	6,25 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MATALLANA DE TORIO	2,41 %	4,82 %	44,58 %	4,82 %	1,20 %	13,25 %	7,23 %	61,45 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MATILLA DE LOS CAÑOS				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
MATILLA DE LOS CAÑOS	133	93,66 %	142									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad												
				14 a 59	60 a 69	=+70						
MATILLA DE LOS CAÑOS				92,45 %	89,47 %	94,34 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	4	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	130	98,46 %
	TOTAL PACIENTES ITU	135	97,04 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	4	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	130	98,46 %
TOTAL PACIENTES ITU		135	97,04 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MATILLA DE LOS CAÑOS	7,14 %	3,57 %	21,43 %	25,00 %	10,71 %	42,86 %	28,57 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MATILLA DE LOS CAÑOS	8,57 %	6,67 %	24,76 %	4,76 %	5,71 %	19,05 %	11,43 %	60,95 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MAYORGA DE CAMPOS	208	94,12 %	221
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MAYORGA DE CAMPOS	98,33 %	87,50 %	93,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	197	99,49 %
	TOTAL PACIENTES ITU	206	99,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
MAYORGA DE CAMPOS	1,75 %	1,75 %	5,26 %	28,07 %	5,26 %	10,53 %	40,35 %	36,84 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
MAYORGA DE CAMPOS	1,32 %	1,99 %	26,49 %	1,32 %	6,62 %	17,22 %	1,99 %	68,87 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MEDINA DEL CAMPO RURAL	637	89,34 %	713
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO RURAL	93,50 %	84,55 %	86,89 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	25	96,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	25	92,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	599	98,66 %
	TOTAL PACIENTES ITU	639	97,81 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
MEDINA DEL CAMPO RURAL	1,85 %	4,94 %	30,86 %	11,73 %	12,35 %	1,23 %	33,95 %	2,47 %	37,65 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
MEDINA DEL CAMPO RURAL	0,63 %	5,26 %	16,21 %	5,05 %	1,89 %	0,21 %	13,26 %	4,42 %	82,53 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MEDINA DEL CAMPO URBANO	1.519	91,45 %	1.661
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO URBANO	94,87 %	82,35 %	90,21 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	5	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	63	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	33	87,88 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	66,67 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.416	98,73 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.509	97,81 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,68 %	0,68 %	6,48 %	30,03 %	20,82 %	17,75 %	0,34 %	44,37 %	2,39 %	26,28 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DEL CAMPO URBANO	0,08 %	2,04 %	0,16 %	3,10 %	0,08 %	16,48 %	9,87 %	7,59 %	0,08 %	16,72 %	8,16 %	76,35 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MEDINA DE POMAR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
MEDINA DE POMAR	452	90,22 %	501									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
MEDINA DE POMAR	93,06 %	89,29 %	87,19 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	63,64 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	447	98,21 %
	TOTAL PACIENTES ITU	461	96,53 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	63,64 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	447	98,21 %
	TOTAL PACIENTES ITU	461	96,53 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DE POMAR	1,01 %	3,03 %	5,05 %	40,40 %	29,29 %	14,14 %	1,01 %	30,30 %	23,23 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DE POMAR	3,12 %	1,70 %	32,29 %	8,50 %	4,82 %	11,33 %	1,13 %	70,82 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MEDINA DE RIOSECO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
MEDINA DE RIOSECO	430	88,30 %	487									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
MEDINA DE RIOSECO				91,06 %	88,89 %	85,45 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	91,67 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	78,57 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	403	96,77 %
	TOTAL PACIENTES ITU	431	95,82 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	91,67 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	78,57 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	403	96,77 %
	TOTAL PACIENTES ITU	431	95,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DE RIOSECO	5,21 %	47,92 %	7,29 %	11,46 %	29,17 %	2,08 %	36,46 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MEDINA DE RIOSECO	0,90 %	1,20 %	35,63 %	2,10 %	7,49 %	4,49 %	9,88 %	76,05 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MELGAR DE FERNAMENTAL	220	91,67 %	240
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MELGAR DE FERNAMENTAL	93,06 %	85,71 %	92,54 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	85,71 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	209	98,09 %
	TOTAL PACIENTES ITU	216	97,69 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MELGAR DE FERNAMENTAL	4,23 %	35,21 %	9,86 %	4,23 %	35,21 %	1,41 %	39,44 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MELGAR DE FERNAMENTAL	0,67 %	2,01 %	33,56 %	3,36 %	2,68 %	14,77 %	1,34 %	79,87 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MIGUEL ARMIJO	928	87,71 %	1.058
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIGUEL ARMIJO	91,93 %	84,08 %	84,60 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	13	76,92 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	33,33 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	47	80,85 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	3	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	71	90,14 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	824	96,84 %
	TOTAL PACIENTES ITU	951	94,95 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIGUEL ARMIJO	0,63 %	2,52 %	5,66 %	31,45 %	32,08 %	14,47 %	1,26 %	22,64 %	3,77 %	21,38 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIGUEL ARMIJO	3,38 %	1,82 %	0,13 %	24,32 %	5,98 %	7,67 %	0,13 %	0,13 %	4,29 %	11,18 %	72,04 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MIRANDA DEL CASTAÑAR	91	81,25 %	112
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA DEL CASTAÑAR	93,33 %	76,19 %	74,60 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	14	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	81	95,06 %
	TOTAL PACIENTES ITU	96	93,75 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	4,55 %	50,00 %	13,64 %	4,55 %	36,36 %	4,55 %	22,73 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	5,80 %	11,59 %	37,68 %	1,45 %	5,80 %	18,84 %	10,14 %	71,01 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MIRANDA ESTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
MIRANDA ESTE	1.113	88,40 %	1.259										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=+70										
MIRANDA ESTE	94,00 %	82,44 %	82,41 %										
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %										

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	9	77,78 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	6	83,33 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	5	40,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	50,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	40	95,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	50,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	55	90,91 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	2	50,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	25,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.032	96,51 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.113	96,05 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA ESTE	1,99 %	3,48 %	31,84 %	15,42 %	8,46 %	46,27 %	6,97 %	34,83 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA ESTE	0,88 %	2,63 %	22,81 %	4,06 %	2,85 %	11,95 %	8,00 %	82,68 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

MIRANDA OESTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
MIRANDA OESTE	1.181	90,71 %	1.302									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
MIRANDA OESTE	93,45 %	85,31 %	88,29 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	90,91 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	43	95,35 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	59	91,53 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.090	97,34 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.176	96,60 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA OESTE	0,88 %	0,44 %	6,64 %	37,61 %	14,16 %	4,87 %	0,88 %	0,44 %	0,44 %	34,96 %	3,98 %	42,04 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA OESTE	0,21 %	0,73 %	2,72 %	23,35 %	2,83 %	1,78 %	0,21 %	0,10 %	8,80 %	5,24 %	81,15 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MOMBELTRAN	178	84,76 %	210
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MOMBELTRAN	90,38 %	84,44 %	80,87 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	159	98,74 %
	TOTAL PACIENTES ITU	176	96,02 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MOMBELTRAN	2,44 %	9,76 %	17,07 %	24,39 %	14,63 %	2,44 %	39,02 %	7,32 %	31,71 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MOMBELTRAN	2,92 %	7,30 %	21,17 %	11,68 %	6,57 %	19,71 %	8,03 %	66,42 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MOTA DEL MARQUES	90	88,24 %	102
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MOTA DEL MARQUES	92,31 %	72,00 %	92,31 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	81	98,77 %
	TOTAL PACIENTES ITU	90	96,67 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MOTA DEL MARQUES	3,70 %	3,70 %	33,33 %	3,70 %	7,41 %	51,85 %	25,93 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MOTA DEL MARQUES	9,52 %	12,70 %	19,05 %	1,59 %	11,11 %	11,11 %	3,17 %	65,08 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MUNANA	138	83,64 %	165
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MUÑANA	87,93 %	84,38 %	78,21 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	114	96,49 %
	TOTAL PACIENTES ITU	117	95,73 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MUÑANA	2,56 %	15,38 %	28,21 %	10,26 %	12,82 %	35,90 %	35,90 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MUÑANA	1,01 %	8,08 %	18,18 %	1,01 %	4,04 %	10,10 %	87,88 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	71,53 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
MUNICO	62	88,57 %	70
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MUÑICO	76,92 %	83,33 %	94,87 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	38	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	23	95,65 %
	TOTAL PACIENTES ITU	62	98,39 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
MUÑICO	10,53 %	10,53 %	15,79 %	68,42 %	5,26 %	26,32 %
TOTAL GAP	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01FA / MACROLID OS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
MUÑICO	9,30 %	16,28 %	2,33 %	9,30 %	2,33 %	39,53 %	65,12 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	71,53 %

NAVA DE LA ASUNCION				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
NAVA DE LA ASUNCION	686	89,32 %	768									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
NAVA DE LA ASUNCION	89,55 %	83,33 %	91,04 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	33,33 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	21	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	651	98,62 %
	TOTAL PACIENTES ITU	678	98,38 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
NAVA DE LA ASUNCION	0,65 %	3,25 %	14,94 %	50,65 %	9,74 %	12,34 %	22,73 %	1,30 %	38,31 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
NAVA DE LA ASUNCION	3,76 %	10,15 %	33,46 %	3,57 %	6,95 %	0,56 %	0,38 %	10,71 %	3,20 %	75,75 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
OLMEDO	316	90,29 %	350
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLMEDO	89,84 %	88,41 %	90,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	303	97,69 %
TOTAL PACIENTES ITU		320	96,56 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
OLMEDO	5,17 %	10,34 %	31,03 %	20,69 %	8,62 %	32,76 %	1,72 %	25,86 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
OLMEDO	0,39 %	5,81 %	17,83 %	5,43 %	1,55 %	10,08 %	3,10 %	76,36 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
OLVEGA	295	90,49 %	326
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLVEGA	95,21 %	84,75 %	87,80 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	14	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	84,62 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	255	96,47 %
	TOTAL PACIENTES ITU	274	96,72 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
OLVEGA	5,26 %	3,51 %	7,02 %	29,82 %	12,28 %	1,75 %	42,11 %	3,51 %	26,32 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
OLVEGA	7,14 %	0,42 %	2,94 %	2,52 %	29,41 %	2,10 %	3,36 %	19,33 %	10,08 %	58,82 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
OSORNO	142	78,02 %	182
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OSORNO	91,89 %	83,33 %	72,95 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	136	97,79 %
	TOTAL PACIENTES ITU	141	97,16 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
OSORNO	13,79 %	6,90 %	51,72 %	3,45 %	3,45 %	34,48 %	10,34 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
OSORNO	1,77 %	0,88 %	44,25 %	1,77 %	3,54 %	8,85 %	2,65 %	66,37 %
TOTAL GAP	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PALENCIA RURAL	405	91,42 %	443
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PALENCIA RURAL	96,26 %	83,78 %	89,13 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	5	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	85,71 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	66,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	92,31 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	384	99,48 %
TOTAL PACIENTES ITU		410	97,56 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PALENCIA RURAL	1,10 %	8,79 %	8,79 %	35,16 %	10,99 %	16,48 %	48,35 %	2,20 %	20,88 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PALENCIA RURAL	3,50 %	2,23 %	34,08 %	4,14 %	4,14 %	14,01 %	7,64 %	62,42 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PAMPLIEGA	97	88,18 %	110
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PAMPLIEGA	86,36 %	81,25 %	90,41 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	94	97,87 %
	TOTAL PACIENTES ITU	98	97,96 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
PAMPLIEGA	40,00 %	25,00 %	35,00 %	20,00 %	55,00 %
TOTAL GAP	38,61 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
PAMPLIEGA	1,30 %	33,77 %	1,30 %	9,09 %	18,18 %	9,09 %	77,92 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PARADA DE MOLINO	751	88,04 %	853
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PARADA DE MOLINO	93,27 %	81,82 %	82,42 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	21	95,24 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	8	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	715	98,60 %
	TOTAL PACIENTES ITU	750	97,47 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PARADA DE MOLINO	2,36 %	3,94 %	39,37 %	31,50 %	14,17 %	26,77 %	14,17 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PARADA DE MOLINO	2,24 %	0,96 %	0,16 %	30,93 %	7,21 %	6,41 %	0,16 %	6,41 %	1,28 %	73,56 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PAREDES DE NAVA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PAREDES DE NAVA	204	86,44 %	236									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
PAREDES DE NAVA				93,75 %	81,82 %	83,06 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	5	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	92,86 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	182	97,80 %
	TOTAL PACIENTES ITU	202	97,03 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PAREDES DE NAVA	1,96 %	3,92 %	3,92 %	1,96 %	35,29 %	11,76 %	7,84 %	43,14 %	29,41 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PAREDES DE NAVA	2,61 %	4,58 %	41,18 %	3,27 %	5,88 %	17,65 %	5,23 %	70,59 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PARQUESOL				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos												
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico																
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12			
CGF AP		Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
PARQUESOL		1.114	83,95 %	1.327									N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	70,00 %
TOTAL GAP		137.865	88,49 %	155.797									N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
% de pacientes con j01 por grupo de edad		14 a 59	60 a 69	=+70									N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
													N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
													N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
													N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
													N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
													N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	4	75,00 %
													N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
													N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	53	98,11 %
													N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	3	
													N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
PARQUESOL		91,10 %	77,30 %	77,09 %									N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	42	92,86 %
TOTAL GAP		92,96 %	83,70 %	85,54 %									N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
													N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
													N36.2	Carúncula uretral	1	
													N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	881	97,28 %
													TOTAL PACIENTES ITU		986	96,25 %
Subgrupos del J01 - Hombres		J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS				
PARQUESOL		0,49 %	1,47 %	2,45 %	38,24 %	8,82 %	9,80 %	0,49 %	0,98 %	45,59 %	2,45 %	20,10 %				
TOTAL GAP		0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %				
Subgrupos del J01 - Mujer		J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS		
PARQUESOL		0,11 %	0,77 %	0,11 %	0,99 %	0,11 %	22,64 %	1,87 %	5,27 %	0,33 %	0,11 %	7,03 %	6,92 %	78,35 %		
TOTAL GAP		0,04 %	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %		

Año y mes núm.	2025-01	2025-07
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	1	100,00 %	1
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	100,00 %
TOTAL GAP	92,96 %

Subgrupos del J01 - Hombres
TOTAL GAP

Subgrupos del J01 - Mujer	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEDIATRIA DE AREA ZAMORA	100,00 %
TOTAL GAP	71,53 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1	100,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PEDROSILLO EL RALO	264	92,63 %	285
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEDROSILLO EL RALO	97,14 %	88,89 %	91,16 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	33,33 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	14	92,86 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	15	93,33 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	241	96,68 %
	TOTAL PACIENTES ITU	270	95,93 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEDROSILLO EL RALO	2,53 %	7,59 %	22,78 %	10,13 %	12,66 %	3,80 %	30,38 %	7,59 %	40,51 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEDROSILLO EL RALO	4,32 %	6,49 %	23,78 %	8,11 %	15,68 %	0,54 %	1,08 %	12,97 %	11,89 %	71,35 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PEÑAFIEL	765	92,28 %	829
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑAFIEL	95,59 %	89,34 %	90,58 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	19	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	738	97,97 %
	TOTAL PACIENTES ITU	765	97,25 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑAFIEL	3,72 %	9,04 %	29,26 %	15,43 %	3,72 %	0,53 %	49,47 %	2,66 %	26,60 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑAFIEL	1,39 %	4,16 %	19,24 %	9,53 %	2,43 %	0,17 %	29,12 %	3,29 %	69,32 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	892	90,74 %	983
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	94,82 %	85,56 %	89,68 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	88,24 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	88,89 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	3	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	20,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	869	98,16 %
	TOTAL PACIENTES ITU	904	97,35 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	0,45 %	4,09 %	5,00 %	36,82 %	9,09 %	12,73 %	0,45 %	1,36 %	44,09 %	7,73 %	30,00 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	6,10 %	1,79 %	0,15 %	39,88 %	2,38 %	6,85 %	0,15 %	18,15 %	11,31 %	67,11 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PERIURBANA NORTE	1.477	92,37 %	1.599
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PERIURBANA NORTE	95,50 %	88,10 %	88,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	40,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	33	93,94 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	76,92 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	50,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.421	98,66 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.477	97,77 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA NORTE	3,82 %	5,56 %	0,35 %	49,31 %	8,68 %	14,24 %	0,69 %	0,69 %	25,35 %	3,13 %	29,51 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA NORTE	2,78 %	0,08 %	2,52 %	0,08 %	36,42 %	4,79 %	9,25 %	0,08 %	0,08 %	8,83 %	6,48 %	65,10 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PERIURBANA SUR	927	91,33 %	1.015
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PERIURBANA SUR	94,88 %	85,03 %	88,92 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	66,67 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	63	98,41 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	36	94,44 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	2	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	853	97,07 %
	TOTAL PACIENTES ITU	933	96,57 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA SUR	0,52 %	7,25 %	6,22 %	0,52 %	41,97 %	14,51 %	11,40 %	1,55 %	26,94 %	4,15 %	32,12 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA SUR	5,45 %	0,14 %	4,22 %	34,60 %	3,95 %	4,09 %	0,14 %	8,17 %	4,77 %	73,16 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PIEDRAHITA	276	89,32 %	309
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PIEDRAHITA	92,59 %	90,91 %	86,63 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	29	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	18	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	233	97,42 %
	TOTAL PACIENTES ITU	272	97,06 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PIEDRAHITA	1,67 %	6,67 %	25,00 %	10,00 %	15,00 %	36,67 %	5,00 %	35,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PIEDRAHITA	4,17 %	1,85 %	24,07 %	2,78 %	1,85 %	0,93 %	17,59 %	1,39 %	75,93 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PILARICA	791	86,54 %	914
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PILARICA	90,74 %	77,27 %	85,27 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	81,82 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	25	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	736	97,55 %
	TOTAL PACIENTES ITU	786	96,95 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PILARICA	0,71 %	2,84 %	5,67 %	24,11 %	25,53 %	22,70 %	41,84 %	2,13 %	10,64 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PILARICA	1,69 %	3,38 %	0,15 %	21,85 %	6,00 %	8,62 %	0,15 %	11,38 %	4,62 %	73,23 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PINARES-COVALEDA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PINARES-COVALEDA	265	90,14 %	294									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
PINARES-COVALEDA	93,48 %	80,95 %	90,74 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	252	98,02 %
	TOTAL PACIENTES ITU	260	97,69 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PINARES-COVALEDA	3,57 %	5,36 %	1,79 %	10,71 %	62,50 %	5,36 %	12,50 %	26,79 %	3,57 %	16,07 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PINARES-COVALEDA	4,31 %	1,91 %	0,48 %	45,93 %	3,83 %	8,61 %	0,96 %	8,13 %	10,53 %	58,85 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PINTOR OLIVA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
PINTOR OLIVA	1.053	85,06 %	1.238										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70										
	PINTOR OLIVA	91,20 %	75,12 %	81,89 %									
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
	Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)								Nº Pac ITU	% Pac ITU J01		
	N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda								9	55,56 %		
	N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica								7	57,14 %		
	N13.30	Hidronefrosis no especificadas								1			
	N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis								2	50,00 %		
	N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada								7			
N28.1	Quiste de riñón, adquirido								1				
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado								6				
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria								29	96,55 %			
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria								1				
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria								43	97,67 %			
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga								1				
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada								7	14,29 %			
N36.2	Carúncula uretral								1				
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada								979	97,65 %			
	TOTAL PACIENTES ITU								1.060	95,57 %			

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PINTOR OLIVA	4,63 %	6,02 %	41,20 %	8,80 %	9,72 %	33,33 %	2,78 %	22,69 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PINTOR OLIVA	2,27 %	2,39 %	0,12 %	26,40 %	3,11 %	4,90 %	0,24 %	15,41 %	6,33 %	71,33 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PISUERGA	1.157	91,90 %	1.259
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PISUERGA	93,97 %	87,41 %	87,99 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	62,50 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	21	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	94,12 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.019	98,72 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.058	98,30 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PISUERGA	0,60 %	2,38 %	6,55 %	38,69 %	8,33 %	10,71 %	1,19 %	26,79 %	1,79 %	34,52 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PISUERGA	1,31 %	1,92 %	0,10 %	18,50 %	2,43 %	5,46 %	4,45 %	4,85 %	85,74 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PIZARRALES	809	88,13 %	918
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PIZARRALES	93,69 %	80,86 %	83,71 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	80,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	5	40,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	50,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	22	95,45 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	27	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	761	98,16 %
	TOTAL PACIENTES ITU	811	97,16 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PIZARRALES	0,68 %	6,80 %	0,68 %	4,08 %	35,37 %	17,01 %	21,77 %	1,36 %	0,68 %	23,13 %	1,36 %	20,41 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PIZARRALES	0,30 %	3,02 %	0,15 %	4,23 %	31,72 %	3,17 %	6,19 %	1,36 %	7,40 %	6,65 %	68,13 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PLAZA DEL EJERCITO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PLAZA DEL EJERCITO	954	85,87 %	1.111									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
PLAZA DEL EJERCITO	90,91 %	81,21 %	82,39 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	72,73 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	32	90,63 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	45	97,78 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	765	97,39 %
	TOTAL PACIENTES ITU	842	96,20 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PLAZA DEL EJERCITO	3,14 %	3,14 %	42,14 %	8,81 %	17,61 %	0,63 %	35,22 %	1,26 %	16,35 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PLAZA DEL EJERCITO	1,26 %	0,63 %	0,13 %	26,29 %	1,13 %	9,94 %	0,13 %	6,16 %	6,29 %	77,36 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PONFERRADA I				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PONFERRADA I	1.377	89,77 %	1.534									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
PONFERRADA I	93,50 %	84,67 %	87,64 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	83,33 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	92	96,74 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	66,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	259	96,91 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.055	97,25 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.358	96,83 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA I	0,37 %	1,12 %	0,37 %	0,37 %	13,11 %	43,07 %	1,50 %	13,86 %	0,37 %	37,45 %	3,00 %	22,47 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,08 %	0,03 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA I	1,44 %	5,95 %	0,27 %	41,98 %	0,72 %	4,41 %	0,09 %	18,02 %	5,14 %	59,46 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PONFERRADA II				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PONFERRADA II	1.402	89,76 %	1.562									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
PONFERRADA II	94,77 %	85,47 %	86,23 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
				Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01					
				N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %					
				N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %					
				N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2						
				N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %					
				N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1						
				N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2						
				N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2						
				N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	76	94,74 %					
				N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1						
				N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	50,00 %					
				N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	138	94,93 %					
				N32.1	Fístula vesicointestinal	1	100,00 %					
				N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1						
				N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1						
				N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1						
				N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.229	97,23 %					
						TOTAL PACIENTES ITU		1.395	96,92 %			

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA II	0,37 %	1,12 %	7,12 %	39,70 %	7,87 %	14,61 %	0,37 %	33,33 %	3,37 %	26,97 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA II	1,15 %	0,26 %	3,17 %	0,09 %	40,35 %	2,73 %	4,85 %	17,80 %	6,08 %	59,82 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PONFERRADA III	1.075	90,49 %	1.188
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA III	95,43 %	84,09 %	86,48 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	70	98,57 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	66,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	88	94,32 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	942	98,30 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.056	97,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA III	2,11 %	7,89 %	0,53 %	45,79 %	3,68 %	10,00 %	0,53 %	40,53 %	4,21 %	31,58 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA III	1,36 %	2,60 %	0,23 %	41,69 %	0,68 %	5,08 %	0,11 %	0,11 %	16,05 %	4,41 %	66,44 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PONFERRADA IV	811	92,79 %	874
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad

14 a 59	60 a 69	=+70
93,66 %	88,89 %	91,74 %
92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	49	97,96 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	35	97,14 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	747	98,26 %
	TOTAL PACIENTES ITU	819	97,44 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA IV	0,68 %	4,05 %	0,68 %	10,81 %	0,68 %	49,32 %	2,70 %	12,84 %	0,68 %	1,35 %	32,43 %	2,70 %	25,00 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,03 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PONFERRADA IV	1,81 %	5,58 %	0,15 %	42,99 %	1,66 %	9,35 %	0,15 %	15,08 %	5,73 %	55,35 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PORTILLO	871	90,82 %	959
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PORTILLO	93,08 %	84,25 %	90,45 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	28	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	38	94,74 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	790	99,24 %
	TOTAL PACIENTES ITU	859	98,02 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PORTILLO	4,55 %	2,60 %	36,36 %	18,83 %	14,29 %	0,65 %	31,17 %	1,30 %	28,57 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PORTILLO	0,98 %	0,14 %	3,49 %	20,50 %	7,11 %	6,00 %	0,70 %	9,90 %	4,88 %	78,80 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PUEBLA DE SANABRIA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PUEBLA DE SANABRIA	309	91,42 %	338									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
PUEBLA DE SANABRIA	91,67 %	88,33 %	92,55 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	5	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	22	90,91 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	289	97,23 %
	TOTAL PACIENTES ITU	320	95,63 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	5	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	22	90,91 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	289	97,23 %
	TOTAL PACIENTES ITU	320	95,63 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PUEBLA DE SANABRIA	4,55 %	9,09 %	4,55 %	28,79 %	15,15 %	1,52 %	22,73 %	4,55 %	48,48 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PUEBLA DE SANABRIA	3,70 %	2,88 %	0,41 %	14,40 %	6,58 %	3,29 %	9,05 %	12,35 %	81,48 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
PUENTE DOMINGO FLOREZ	193	90,19 %	214
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUENTE DOMINGO FLOREZ	98,72 %	75,68 %	88,89 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	172	98,26 %
	TOTAL PACIENTES ITU	196	95,92 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	27,03 %	35,14 %	2,70 %	10,81 %	32,43 %	5,41 %	13,51 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	0,64 %	6,41 %	0,64 %	35,90 %	3,85 %	3,21 %	8,97 %	6,41 %	69,23 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

PUERTA NUEVA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
PUERTA NUEVA	847	87,14 %	972									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
PUERTA NUEVA	93,50 %	82,86 %	80,70 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	33,33 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	3	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	54	94,44 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	24	95,83 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	780	96,28 %
	TOTAL PACIENTES ITU	847	95,75 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PUERTA NUEVA	0,61 %	3,64 %	7,27 %	35,76 %	22,42 %	20,00 %	0,61 %	32,73 %	0,61 %	23,64 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PUERTA NUEVA	2,20 %	2,64 %	29,77 %	5,13 %	5,87 %	0,15 %	0,15 %	5,13 %	2,49 %	76,25 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

QUINTANAR DE LA SIERRA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
QUINTANAR DE LA SIERRA	248	91,85 %	270									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	QUINTANAR DE LA SIERRA	97,53 %	93,33 %	88,19 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								
				Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)					Nº Pac ITU	% Pac ITU J01	
				N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis					1		
				N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado					1		
				N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter					1		
				N30.00	Cistitis aguda sin hematuria					3	100,00 %	
				N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria					4	100,00 %	
				N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada					237	99,16 %	
				TOTAL PACIENTES ITU					246	98,37 %		

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
QUINTANAR DE LA SIERRA	8,33 %	43,06 %	4,17 %	6,94 %	2,78 %	19,44 %	6,94 %	54,17 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
QUINTANAR DE LA SIERRA	1,14 %	6,25 %	27,84 %	1,70 %	3,41 %	13,64 %	6,25 %	79,55 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
RIAÑO	95	89,62 %	106
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAÑO	93,48 %	81,25 %	86,67 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	85	98,82 %
	TOTAL PACIENTES ITU	94	98,94 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIAÑO	3,70 %	7,41 %	29,63 %	11,11 %	3,70 %	44,44 %	7,41 %	48,15 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIAÑO	2,94 %	2,94 %	27,94 %	8,82 %	1,47 %	22,06 %	2,94 %	79,41 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
RIAZA	215	84,65 %	254
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAZA	90,80 %	70,27 %	84,62 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	66,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	208	98,56 %
	TOTAL PACIENTES ITU	221	95,93 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIAZA	16,07 %	46,43 %	16,07 %	5,36 %	33,93 %	12,50 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIAZA	0,63 %	10,69 %	27,67 %	6,92 %	3,77 %	15,09 %	4,40 %	68,55 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
RIBERA DEL ESLA	155	89,60 %	173
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	139	97,84 %
	TOTAL PACIENTES ITU	155	98,06 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIBERA DEL ESLA	89,36 %	88,00 %	89,22 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIBERA DEL ESLA	5,41 %	37,84 %	8,11 %	5,41 %	35,14 %	2,70 %	48,65 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIBERA DEL ESLA	1,69 %	0,85 %	1,69 %	30,51 %	6,78 %	5,08 %	22,03 %	0,85 %	65,25 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

RIBERA DEL ORBIGO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
RIBERA DEL ORBIGO	993	89,78 %	1.106									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
RIBERA DEL ORBIGO	95,81 %	84,97 %	86,83 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	5	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	45	95,56 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	75,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	72	95,83 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	904	98,56 %
	TOTAL PACIENTES ITU	999	97,40 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIBERA DEL ORBIGO	0,51 %	0,51 %	5,08 %	53,30 %	9,14 %	10,15 %	27,92 %	4,57 %	39,59 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RIBERA DEL ORBIGO	1,38 %	2,14 %	0,13 %	30,40 %	4,90 %	4,40 %	0,25 %	0,50 %	12,81 %	8,79 %	73,62 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ROA	353	88,92 %	397
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ROA	93,10 %	81,97 %	87,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	85,71 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	343	97,08 %
	TOTAL PACIENTES ITU	356	95,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ROA	3,49 %	5,81 %	67,44 %	12,79 %	11,63 %	1,16 %	26,74 %	3,49 %	34,88 %
TOTAL GAP	0,32 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ROA	1,87 %	1,87 %	35,96 %	2,62 %	4,49 %	0,75 %	10,49 %	5,24 %	76,40 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ROBLEDA	168	93,33 %	180
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ROBLEDA	96,88 %	87,88 %	93,97 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	168	98,21 %
	TOTAL PACIENTES ITU	171	97,66 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ROBLEDA	2,22 %	13,33 %	15,56 %	13,33 %	46,67 %	2,22 %	40,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ROBLEDA	1,63 %	8,94 %	22,76 %	5,69 %	4,88 %	0,81 %	28,46 %	5,69 %	57,72 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
RONDILLA I	612	89,08 %	687
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RONDILLA I	94,34 %	86,36 %	85,40 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	75,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	31	90,32 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	566	98,23 %
	TOTAL PACIENTES ITU	609	97,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RONDILLA I	5,81 %	2,33 %	22,09 %	20,93 %	13,95 %	52,33 %	1,16 %	19,77 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RONDILLA I	1,71 %	3,42 %	0,19 %	16,35 %	11,79 %	5,51 %	0,95 %	18,82 %	6,46 %	72,62 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
RONDILLA II	889	90,53 %	982
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RONDILLA II	94,58 %	88,08 %	87,42 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	14	85,71 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	23	95,65 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	842	99,17 %
	TOTAL PACIENTES ITU	879	98,18 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RONDILLA II	1,86 %	3,73 %	25,47 %	19,25 %	13,04 %	0,62 %	38,51 %	32,30 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
RONDILLA II	1,24 %	3,30 %	0,27 %	18,68 %	6,87 %	5,63 %	0,27 %	12,36 %	3,43 %	78,71 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SACRAMENIA	44	93,62 %	47
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	42	97,62 %
	TOTAL PACIENTES ITU	45	97,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SACRAMENIA	100,00 %	90,91 %	93,55 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01FA / MACRÓLID OS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS
SACRAMENIA	63,64 %	9,09 %	36,36 %
TOTAL GAP	38,61 %	0,51 %	34,92 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACI ONES DE PENICILINA S, INCLUYEND O INHIBIDORE S DE LA BETALACT AMASA	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01DD / CEFALOSP ORINAS DE TERCERA GENERACI ÓN	J01EE / COMBINACI ONES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPR IMA, INCLUYEND O DERIVADOS	J01MA / FLUOROQU INOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURA NO	J01XX / OTROS ANTIBACTE RIANOS
SACRAMENIA	12,12 %	12,12 %	3,03 %	9,09 %	9,09 %	6,06 %	87,88 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAHAGUN	414	92,83 %	446
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAHAGUN	95,49 %	84,21 %	93,70 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	398	98,74 %
	TOTAL PACIENTES ITU	417	98,08 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAHAGUN	1,94 %	0,97 %	4,85 %	43,69 %	25,24 %	19,42 %	39,81 %	7,77 %	38,83 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAHAGUN	1,61 %	0,32 %	3,54 %	35,05 %	6,11 %	13,83 %	0,64 %	17,36 %	10,29 %	71,38 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SALAS DE LOS INFANTES	276	88,18 %	313
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALAS DE LOS INFANTES	90,35 %	84,09 %	86,16 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	270	98,15 %
	TOTAL PACIENTES ITU	277	97,11 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SALAS DE LOS INFANTES	12,50 %	57,81 %	4,69 %	3,13 %	28,13 %	3,13 %	32,81 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SALAS DE LOS INFANTES	1,42 %	2,36 %	0,47 %	41,04 %	1,89 %	1,89 %	0,47 %	8,02 %	6,60 %	72,17 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SALDAÑA	364	87,71 %	415
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALDAÑA	92,75 %	78,95 %	87,25 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	5	80,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	7	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	351	98,58 %
	TOTAL PACIENTES ITU	363	97,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SALDAÑA	10,47 %	5,81 %	44,19 %	5,81 %	8,14 %	27,91 %	31,40 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SALDAÑA	7,55 %	7,91 %	0,36 %	22,66 %	2,16 %	3,60 %	13,67 %	3,60 %	75,90 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN AGUSTIN	1.032	84,80 %	1.217
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN AGUSTIN	91,77 %	75,00 %	81,94 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	85,71 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	29	96,55 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	8	25,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	976	97,34 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.021	96,47 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN AGUSTIN	0,99 %	0,49 %	6,40 %	55,17 %	4,93 %	6,90 %	28,57 %	3,45 %	27,59 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN AGUSTIN	0,72 %	0,12 %	1,69 %	40,41 %	1,81 %	2,90 %	0,36 %	11,34 %	8,08 %	70,69 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SAN ANDRES DEL RABANI				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN ANDRES DEL RABANEI	1.303	91,06 %	1.431
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ANDRES DEL RABANEI	94,42 %	90,38 %	87,22 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	4	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	47	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	50	94,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.225	98,53 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.303	98,16 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ANDRES DEL RABANEDO	0,90 %	2,26 %	2,26 %	41,63 %	22,62 %	5,43 %	1,81 %	0,45 %	0,45 %	29,86 %	4,07 %	22,62 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ANDRES DEL RABANEDO	0,18 %	1,02 %	0,28 %	1,76 %	37,34 %	7,02 %	2,68 %	0,09 %	0,28 %	12,57 %	6,84 %	68,30 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	288	92,01 %	313
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	98,23 %	92,16 %	86,67 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	283	97,53 %
	TOTAL PACIENTES ITU	289	97,23 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	2,82 %	8,45 %	7,04 %	2,82 %	40,85 %	21,13 %	4,23 %	28,17 %	5,63 %	32,39 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	0,46 %	2,76 %	4,15 %	0,92 %	33,64 %	2,30 %	3,23 %	0,46 %	12,90 %	6,91 %	71,89 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SAN ILDEFONSO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SAN ILDEFONSO	338	86,01 %	393									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
				Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)					Nº Pac ITU	% Pac ITU J01	
				N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda					2	50,00 %	
				N30.00	Cistitis aguda sin hematuria					1	100,00 %	
				N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria					1		
				N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria					7	85,71 %	
				N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga					2		
				N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada					316	98,10 %	
				TOTAL PACIENTES ITU					324	97,84 %		
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
SAN ILDEFONSO				87,50 %	85,00 %	84,82 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ILDEFONSO	4,62 %	12,31 %	41,54 %	7,69 %	13,85 %	1,54 %	1,54 %	23,08 %	3,08 %	21,54 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ILDEFONSO	2,20 %	4,40 %	39,93 %	4,40 %	7,69 %	5,13 %	5,86 %	68,86 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN JOSE	739	90,12 %	820
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JOSE	92,50 %	87,41 %	87,28 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	50,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	24	95,83 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	711	98,45 %
	TOTAL PACIENTES ITU	741	97,71 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JOSE	3,70 %	6,17 %	37,65 %	20,37 %	15,43 %	1,23 %	0,62 %	33,33 %	2,47 %	20,99 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EA / TRIMETOPRIMA Y DERIVADOS	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JOSE	6,24 %	1,04 %	35,70 %	3,99 %	0,17 %	8,67 %	0,17 %	8,49 %	6,76 %	68,11 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	0,00 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN JUAN	810	90,00 %	900
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JUAN	90,57 %	83,82 %	91,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	80,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	10	90,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	16	93,75 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	775	98,58 %
	TOTAL PACIENTES ITU	807	97,77 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JUAN	0,62 %	8,02 %	0,62 %	6,17 %	29,63 %	17,28 %	13,58 %	30,86 %	1,85 %	31,48 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	0,03 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JUAN	6,17 %	0,15 %	0,15 %	2,16 %	0,31 %	35,65 %	4,94 %	12,04 %	7,41 %	4,94 %	64,51 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN LEONARDO DE YAGUE	268	88,45 %	303
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN LEONARDO DE YAGUE	90,70 %	86,44 %	87,58 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	83,33 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6	83,33 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	256	98,44 %
	TOTAL PACIENTES ITU	268	97,39 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN LEONARDO DE YAGUE	1,52 %	1,52 %	7,58 %	40,91 %	4,55 %	7,58 %	1,52 %	62,12 %	3,03 %	33,33 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN LEONARDO DE YAGUE	3,96 %	0,50 %	5,45 %	50,00 %	1,98 %	1,49 %	1,49 %	22,77 %	8,42 %	74,75 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SAN PABLO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SAN PABLO	605	86,93 %	696									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
SAN PABLO	91,63 %	89,19 %	84,03 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	15	93,33 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	563	98,05 %
	TOTAL PACIENTES ITU	593	97,13 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PABLO	8,65 %	7,69 %	25,96 %	13,46 %	18,27 %	1,92 %	50,00 %	2,88 %	30,77 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PABLO	2,20 %	0,20 %	3,79 %	27,74 %	6,99 %	5,99 %	0,40 %	16,77 %	6,99 %	69,46 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN PEDRO DEL ARROYO	142	93,42 %	152
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PEDRO DEL ARROYO	97,50 %	94,87 %	90,67 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	133	99,25 %
	TOTAL PACIENTES ITU	138	99,28 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PEDRO DEL ARROYO	8,11 %	10,81 %	16,22 %	10,81 %	21,62 %	48,65 %	21,62 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PEDRO DEL ARROYO	3,81 %	5,71 %	19,05 %	1,90 %	7,62 %	20,00 %	4,76 %	70,48 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAN PEDRO MANRIQUE	82	93,18 %	88
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %	94,12 %	87,80 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	74	97,30 %
	TOTAL PACIENTES ITU	77	97,40 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PEDRO MANRIQUE	5,00 %	15,00 %	35,00 %	15,00 %	5,00 %	40,00 %	15,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN PEDRO MANRIQUE	3,23 %	6,45 %	30,65 %	1,61 %	8,06 %	8,06 %	4,84 %	70,97 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SANTA CLARA		Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SANTA CLARA	806	85,65 %	941									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
SANTA CLARA	93,33 %	80,79 %	80,22 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	29	89,66 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	33	93,94 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	736	96,74 %
	TOTAL PACIENTES ITU	796	95,48 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	29	89,66 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	33	93,94 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	6	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	736	96,74 %
TOTAL PACIENTES ITU		796	95,48 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA CLARA	3,68 %	50,00 %	6,62 %	7,35 %	2,21 %	36,03 %	2,94 %	29,41 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA CLARA	0,75 %	1,49 %	39,70 %	2,09 %	1,94 %	0,15 %	11,49 %	3,43 %	68,81 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SANTA ELENA	591	85,16 %	694
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA ELENA	95,27 %	81,95 %	75,19 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	4	25,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	46	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	19	94,74 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	521	97,70 %
	TOTAL PACIENTES ITU	587	96,42 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA ELENA	1,92 %	6,73 %	27,88 %	28,85 %	12,50 %	35,58 %	0,96 %	19,23 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA ELENA	4,72 %	1,64 %	29,36 %	5,54 %	5,75 %	0,21 %	4,72 %	4,52 %	74,95 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SANTA MARIA	657	92,02 %	714
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA MARIA	97,42 %	87,72 %	89,73 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	32	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	45	93,33 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	610	98,36 %
	TOTAL PACIENTES ITU	660	98,18 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA MARIA	2,80 %	0,70 %	3,50 %	43,36 %	6,29 %	11,89 %	1,40 %	0,70 %	2,10 %	48,25 %	8,39 %	30,77 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA MARIA	0,19 %	1,75 %	0,19 %	2,14 %	32,10 %	2,33 %	5,84 %	0,78 %	0,19 %	11,87 %	7,00 %	76,26 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SANTA MARTA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SANTA MARTA	1.164	88,12 %	1.321									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
	SANTA MARTA	93,17 %	80,00 %	85,05 %								
	TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %								
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)								Nº Pac ITU	% Pac ITU J01		
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda								9	77,78 %		
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica								1	100,00 %		
N13.30	Hidronefrosis no especificadas								1			
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis								3	66,67 %		
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada								2			
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter								2	50,00 %		
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado								4			
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria								15	100,00 %		
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria								3			
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria								2	100,00 %		
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria								35	88,57 %		
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada								5			
N36.2	Carúncula uretral								1			
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada								1.108	97,92 %		
	TOTAL PACIENTES ITU								1.168	96,58 %		

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA MARTA	3,26 %	2,79 %	0,47 %	42,79 %	23,26 %	9,77 %	0,47 %	37,67 %	3,72 %	35,81 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA MARTA	3,37 %	2,85 %	0,11 %	31,51 %	4,74 %	6,95 %	0,11 %	10,12 %	6,01 %	71,34 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SAYAGO	340	86,73 %	392
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAYAGO	96,83 %	81,36 %	85,24 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	339	96,46 %
	TOTAL PACIENTES ITU	350	95,71 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAYAGO	1,05 %	17,89 %	1,05 %	40,00 %	10,53 %	6,32 %	1,05 %	44,21 %	2,11 %	17,89 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAYAGO	1,22 %	5,31 %	33,88 %	6,53 %	9,39 %	13,47 %	6,12 %	66,94 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SEDANO	28	84,85 %	33
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEDANO	81,82 %	100,00 %	81,25 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	25	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	28	96,43 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEDANO	20,00 %	60,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEDANO	39,13 %	30,43 %	4,35 %	8,70 %	8,70 %	60,87 %
TOTAL GAP	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SEGOVIA I	855	84,15 %	1.016
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA I	92,00 %	75,65 %	78,43 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	3	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	65	96,92 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	82	96,34 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	653	97,40 %
	TOTAL PACIENTES ITU	787	95,93 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA I	0,66 %	0,66 %	8,55 %	0,66 %	48,68 %	7,24 %	15,13 %	1,32 %	0,66 %	30,92 %	2,63 %	15,79 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA I	3,27 %	3,98 %	0,71 %	29,02 %	1,56 %	7,54 %	0,14 %	8,96 %	4,27 %	72,69 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SEGOVIA II				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SEGOVIA II	868	87,32 %	994									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
SEGOVIA II	92,64 %	80,37 %	83,18 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	94,12 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	59	94,92 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	723	98,34 %
	TOTAL PACIENTES ITU	800	97,38 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	34	94,12 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	59	94,92 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	723	98,34 %
TOTAL PACIENTES ITU		800	97,38 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
SEGOVIA II	6,54 %	9,15 %	0,65 %	45,10 %	7,84 %	13,07 %	31,37 %	2,61 %	17,65 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
SEGOVIA II	2,94 %	5,31 %	0,28 %	38,18 %	1,54 %	7,13 %	0,14 %	9,79 %	5,31 %	65,87 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SEGOVIA III	691	84,99 %	813
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA III	91,47 %	80,00 %	78,20 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	28	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	96,88 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	551	98,91 %
	TOTAL PACIENTES ITU	608	98,68 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA III	0,75 %	5,22 %	6,72 %	0,75 %	47,01 %	8,96 %	12,69 %	33,58 %	2,24 %	16,42 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA III	2,87 %	2,87 %	0,36 %	27,65 %	2,69 %	4,49 %	0,18 %	5,03 %	4,67 %	76,30 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SEGOVIA RURAL				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SEGOVIA RURAL	1.216	87,48 %	1.390									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
SEGOVIA RURAL	92,00 %	79,91 %	83,96 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	81,82 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	45	97,78 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	102	94,12 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.029	97,96 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.154	97,14 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	11	81,82 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	45	97,78 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	102	94,12 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.029	97,96 %
TOTAL PACIENTES ITU		1.154	97,14 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA RURAL	0,41 %	4,98 %	10,37 %	48,55 %	7,47 %	7,88 %	0,41 %	0,41 %	34,02 %	2,49 %	18,26 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA RURAL	1,95 %	0,10 %	4,62 %	0,10 %	35,59 %	2,05 %	6,26 %	0,21 %	0,10 %	8,72 %	5,33 %	67,49 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SEPULVEDA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SEPULVEDA	171	93,44 %	183									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad												
				14 a 59	60 a 69	=+70						
SEPULVEDA				95,45 %	80,95 %	94,79 %						
TOTAL GAP				92,96 %	83,70 %	85,54 %						

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	80,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	155	99,35 %
	TOTAL PACIENTES ITU	169	97,63 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	66,67 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	80,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	155	99,35 %
TOTAL PACIENTES ITU		169	97,63 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEPULVEDA	5,13 %	28,21 %	35,90 %	5,13 %	12,82 %	25,64 %	5,13 %	53,85 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEPULVEDA	3,03 %	15,91 %	23,48 %	1,52 %	11,36 %	14,39 %	6,82 %	77,27 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SERRADA	347	85,47 %	406
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SERRADA	90,38 %	79,03 %	82,29 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	10	90,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	17	94,12 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	10	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	310	97,10 %
	TOTAL PACIENTES ITU	339	96,76 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SERRADA	1,19 %	5,95 %	28,57 %	20,24 %	4,76 %	47,62 %	1,19 %	44,05 %
TOTAL GAP	0,32 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SERRADA	1,52 %	0,38 %	4,56 %	20,15 %	4,18 %	8,75 %	9,13 %	3,04 %	79,47 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SORIA NORTE				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
SORIA NORTE	1.212	86,94 %	1.394									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
SORIA NORTE	92,52 %	76,15 %	85,38 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	16	93,75 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	32	90,63 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	7	28,57 %
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.144	97,64 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.215	96,63 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA NORTE	4,47 %	6,50 %	0,81 %	33,74 %	14,63 %	10,57 %	0,81 %	2,85 %	34,96 %	3,66 %	32,52 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA NORTE	3,62 %	0,10 %	3,42 %	31,16 %	1,55 %	5,28 %	0,21 %	0,52 %	14,29 %	4,87 %	69,88 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SORIA RURAL	564	86,24 %	654
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA RURAL	89,43 %	84,85 %	84,19 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	33,33 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	9	77,78 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	542	97,79 %
	TOTAL PACIENTES ITU	564	96,63 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA RURAL	1,71 %	7,69 %	7,69 %	35,04 %	18,80 %	14,53 %	0,85 %	1,71 %	36,75 %	4,27 %	31,62 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA RURAL	3,36 %	4,25 %	32,66 %	4,47 %	6,94 %	1,12 %	19,69 %	4,25 %	73,15 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SORIA SUR	1.065	87,08 %	1.223
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA SUR	92,08 %	79,91 %	83,51 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	33,33 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	13	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	94,12 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	5	20,00 %
N36.2	Carúncula uretral	2	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.039	97,59 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.076	96,47 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA SUR	0,45 %	4,50 %	5,41 %	35,14 %	11,26 %	9,46 %	0,45 %	0,90 %	33,78 %	3,15 %	39,64 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA SUR	3,68 %	4,27 %	0,12 %	28,94 %	2,49 %	4,86 %	0,47 %	14,47 %	3,68 %	76,87 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SORIA TARDE	167	87,89 %	190
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA TARDE	90,71 %	75,00 %	87,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	156	98,72 %
	TOTAL PACIENTES ITU	162	98,77 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA TARDE	11,76 %	41,18 %	5,88 %	5,88 %	29,41 %	29,41 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SORIA TARDE	2,67 %	1,33 %	24,67 %	2,00 %	2,00 %	8,00 %	10,00 %	81,33 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SOTILLO DE LA ADRADA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
SOTILLO DE LA ADRADA	728	89,22 %	816
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad

	14 a 59	60 a 69	=+70
SOTILLO DE LA ADRADA	93,09 %	84,55 %	85,76 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	83,33 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	50,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	30	96,67 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	52	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	663	98,19 %
	TOTAL PACIENTES ITU	728	96,98 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SOTILLO DE LA ADRADA	6,06 %	11,36 %	17,42 %	15,15 %	16,67 %	0,76 %	47,73 %	4,55 %	24,24 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SOTILLO DE LA ADRADA	0,34 %	4,36 %	4,70 %	0,84 %	14,93 %	3,19 %	10,40 %	0,67 %	0,17 %	17,11 %	8,05 %	67,28 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

SUR				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos																																																																																	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico																																																																																					
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																																																																									
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac ITU</th><th>% Pac ITU J01</th></tr><tr><td>N10</td><td>Nefritis túbulo-intersticial aguda</td><td>8</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>N11.9</td><td>Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada</td><td>1</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>N12</td><td>Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica</td><td>3</td><td>66,67 %</td></tr><tr><td>N13.30</td><td>Hidronefrosis no especificadas</td><td>1</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>N13.5</td><td>Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>N13.9</td><td>Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada</td><td>3</td><td>33,33 %</td></tr><tr><td>N28.1</td><td>Quiste de riñón, adquirido</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>N28.89</td><td>Otros trastornos especificados de riñón y uréter</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>N28.9</td><td>Trastorno del riñón y del uréter, no especificado</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>N30.00</td><td>Cistitis aguda sin hematuria</td><td>71</td><td>92,96 %</td></tr><tr><td>N30.10</td><td>Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>N30.20</td><td>Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria</td><td>5</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>N30.90</td><td>Cistitis, no especificada, sin hematuria</td><td>39</td><td>94,87 %</td></tr><tr><td>N32.89</td><td>Otros trastornos especificados de vejiga</td><td>1</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>N35.919</td><td>Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada</td><td>3</td><td>33,33 %</td></tr><tr><td>N39.0</td><td>Infección de tracto urinario, localización no especificada</td><td>894</td><td>98,88 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL PACIENTES ITU</td><td>993</td><td>97,68 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01	N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	100,00 %	N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %	N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %	N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %	N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1		N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %	N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2		N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2		N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3		N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	71	92,96 %	N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1		N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	5	100,00 %	N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	39	94,87 %	N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	100,00 %	N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %	N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	894	98,88 %			TOTAL PACIENTES ITU	993	97,68 %
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01																																																																																		
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	100,00 %																																																																																		
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %																																																																																		
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %																																																																																		
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	100,00 %																																																																																		
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1																																																																																			
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %																																																																																		
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2																																																																																			
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2																																																																																			
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3																																																																																			
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	71	92,96 %																																																																																		
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1																																																																																			
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	5	100,00 %																																																																																		
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	39	94,87 %																																																																																		
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	100,00 %																																																																																		
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	33,33 %																																																																																		
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	894	98,88 %																																																																																		
		TOTAL PACIENTES ITU	993	97,68 %																																																																																	
SUR	1.074	89,13 %	1.205																																																																																		
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797																																																																																		

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SUR	90,43 %	83,08 %	88,75 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SUR	1,10 %	4,97 %	6,08 %	47,51 %	12,71 %	18,23 %	1,10 %	1,66 %	28,73 %	2,21 %	24,31 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SUR	0,34 %	2,80 %	1,34 %	0,11 %	24,64 %	2,91 %	8,40 %	0,11 %	0,90 %	5,71 %	12,32 %	74,24 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TABARA	216	83,40 %	259
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TABARA	92,31 %	78,38 %	81,87 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	190	95,79 %
	TOTAL PACIENTES ITU	215	94,88 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
TABARA	1,52 %	1,52 %	7,58 %	30,30 %	13,64 %	12,12 %	45,45 %	1,52 %	27,27 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
TABARA	5,33 %	4,00 %	38,00 %	16,67 %	6,67 %	2,67 %	0,67 %	14,67 %	3,33 %	54,67 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TAMAMES	159	88,83 %	179
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TAMAMES	89,66 %	96,77 %	85,71 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	12	91,67 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	100,00 %
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	142	97,18 %
	TOTAL PACIENTES ITU	163	96,32 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TAMAMES	2,44 %	46,34 %	4,88 %	2,44 %	41,46 %	43,90 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TAMAMES	5,08 %	0,85 %	0,85 %	26,27 %	3,39 %	2,54 %	21,19 %	12,71 %	71,19 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TEJARES	620	91,31 %	679
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TEJARES	93,51 %	87,16 %	89,36 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	5	80,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	66,67 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	6	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	590	98,81 %
	TOTAL PACIENTES ITU	609	98,03 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TEJARES	6,31 %	0,90 %	45,95 %	25,23 %	10,81 %	0,90 %	2,70 %	28,83 %	3,60 %	17,12 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TEJARES	2,36 %	0,20 %	3,54 %	0,20 %	31,24 %	6,88 %	6,29 %	0,39 %	12,57 %	7,66 %	69,55 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,02 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TORDESILLAS	681	87,76 %	776
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORDESILLAS	92,43 %	81,98 %	85,14 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	100,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	31	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N35.92	Estenosis de uretra, no especificada, femenina	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	634	98,11 %
	TOTAL PACIENTES ITU	663	98,04 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORDESILLAS	0,64 %	2,56 %	2,56 %	35,90 %	6,41 %	15,38 %	0,64 %	0,64 %	34,62 %	1,28 %	41,67 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORDESILLAS	1,90 %	0,19 %	0,57 %	31,81 %	2,48 %	10,29 %	0,19 %	0,95 %	10,10 %	4,19 %	74,86 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TORENO	259	88,70 %	292
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORENO	91,96 %	82,69 %	87,60 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	1	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	240	98,75 %
	TOTAL PACIENTES ITU	245	98,37 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORENO	1,92 %	11,54 %	55,77 %	13,46 %	11,54 %	23,08 %	7,69 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORENO	3,38 %	0,48 %	7,25 %	39,61 %	0,97 %	6,76 %	9,66 %	3,86 %	62,32 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TORO	737	88,48 %	833
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORO	91,46 %	86,08 %	86,41 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	33,33 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	4	25,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	4	50,00 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	6	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	3	66,67 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	25	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	701	97,86 %
	TOTAL PACIENTES ITU	744	96,77 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORO	0,71 %	2,84 %	5,67 %	21,28 %	13,48 %	16,31 %	51,06 %	1,42 %	29,08 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORO	0,17 %	1,51 %	3,02 %	22,15 %	3,02 %	8,22 %	10,23 %	5,03 %	78,86 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TORQUEMADA	112	86,15 %	130
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORQUEMADA	97,44 %	88,89 %	78,46 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	11	90,91 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	96	98,96 %
	TOTAL PACIENTES ITU	109	96,33 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORQUEMADA	8,57 %	25,71 %	25,71 %	5,71 %	17,14 %	5,71 %	57,14 %
TOTAL GAP	3,11 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORQUEMADA	1,30 %	2,60 %	14,29 %	5,19 %	7,79 %	3,90 %	6,49 %	80,52 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TORTOLA	768	86,00 %	893
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORTOLA	92,80 %	82,26 %	79,90 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	2	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	5	20,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	16	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	28	96,43 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	728	97,39 %
	TOTAL PACIENTES ITU	771	96,37 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORTOLA	0,72 %	4,32 %	7,19 %	30,94 %	30,22 %	13,67 %	0,72 %	30,94 %	2,16 %	21,58 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TORTOLA	1,75 %	3,66 %	0,16 %	17,97 %	9,06 %	4,77 %	16,69 %	4,77 %	75,99 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

TROBAJO DEL CAMINO - V

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TROBAJO DEL CAMINO - VA	1.216	90,75 %	1.340
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TROBAJO DEL CAMINO - VA	95,09 %	87,28 %	83,03 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	2	50,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	51	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	72	94,44 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	1.127	98,23 %
	TOTAL PACIENTES ITU	1.225	97,80 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	0,49 %	0,49 %	4,37 %	46,12 %	17,96 %	6,80 %	0,49 %	39,32 %	3,40 %	17,96 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	1,09 %	0,20 %	1,78 %	0,10 %	37,33 %	5,15 %	3,66 %	0,10 %	0,30 %	10,00 %	7,52 %	69,41 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
TUDELA	754	89,55 %	842
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TUDELA	92,01 %	85,92 %	88,08 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	7	57,14 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	50,00 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	31	96,77 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	36	97,22 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	677	98,38 %
	TOTAL PACIENTES ITU	739	97,43 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TUDELA	3,18 %	10,83 %	24,20 %	19,11 %	14,65 %	0,64 %	38,85 %	3,18 %	29,30 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
TUDELA	1,51 %	3,52 %	16,92 %	7,20 %	5,86 %	0,34 %	18,26 %	6,53 %	78,06 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

UNIVERSIDAD CENTRO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU										
UNIVERSIDAD CENTRO	519	87,08 %	596										
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797										
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70							
UNIVERSIDAD CENTRO	94,34 %	84,09 %	82,89 %										
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %										

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	91,67 %
N32.1	Fístula vesicointestinal	1	
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	502	97,81 %
	TOTAL PACIENTES ITU	526	96,01 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
UNIVERSIDAD CENTRO	4,63 %	7,41 %	48,15 %	18,52 %	8,33 %	2,78 %	26,85 %	1,85 %	14,81 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
UNIVERSIDAD CENTRO	5,60 %	2,43 %	39,42 %	3,89 %	8,03 %	4,87 %	12,17 %	63,02 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VALDERAS	298	90,58 %	329
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALDERAS	94,95 %	84,44 %	89,25 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	28	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	13	92,31 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	261	98,08 %
	TOTAL PACIENTES ITU	294	97,28 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALDERAS	1,43 %	8,57 %	48,57 %	17,14 %	20,00 %	1,43 %	20,00 %	2,86 %	31,43 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALDERAS	0,88 %	0,44 %	2,19 %	39,47 %	4,39 %	5,26 %	0,88 %	0,44 %	10,53 %	7,89 %	71,93 %
TOTAL GAP	2,32 %	0,06 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VALENCIA DE DON JUAN				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VALENCIA DE DON JUAN	785	93,68 %	838									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
VALENCIA DE DON JUAN	97,24 %	91,13 %	91,16 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	17	88,24 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	110	97,27 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	688	99,13 %
	TOTAL PACIENTES ITU	789	98,99 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALENCIA DE DON JUAN	4,43 %	4,43 %	46,84 %	10,13 %	10,76 %	0,63 %	0,63 %	41,14 %	8,86 %	32,28 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,11 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALENCIA DE DON JUAN	1,44 %	2,55 %	39,39 %	2,55 %	4,31 %	0,32 %	16,75 %	4,94 %	68,90 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VALLADOLID RURAL I				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VALLADOLID RURAL I	610	94,57 %	645									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
VALLADOLID RURAL I	97,13 %	93,07 %	90,86 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	92,86 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	585	99,66 %
	TOTAL PACIENTES ITU	606	99,17 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	14	92,86 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	585	99,66 %
	TOTAL PACIENTES ITU	606	99,17 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VALLADOLID RURAL I	5,83 %	7,77 %	35,92 %	19,42 %	12,62 %	0,97 %	39,81 %	34,95 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VALLADOLID RURAL I	2,76 %	3,35 %	20,91 %	2,37 %	5,33 %	0,79 %	17,16 %	3,35 %	75,74 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VALLADOLID RURAL II				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VALLADOLID RURAL II	439	92,23 %	476									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	33	93,94 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	392	97,70 %
	TOTAL PACIENTES ITU	430	97,44 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLADOLID RURAL II	93,21 %	94,83 %	88,96 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	8	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	33	93,94 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	392	97,70 %
TOTAL PACIENTES ITU		430	97,44 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLADOLID RURAL II	2,90 %	2,90 %	26,09 %	26,09 %	11,59 %	39,13 %	8,70 %	24,64 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLADOLID RURAL II	1,08 %	1,62 %	22,16 %	2,97 %	11,08 %	0,27 %	0,54 %	7,57 %	7,84 %	71,89 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VALLE DE LOSA	22	100,00 %	22
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	22	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	22	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE LOSA	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VALLE DE LOSA	40,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VALLE DE LOSA	5,88 %	5,88 %	5,88 %	5,88 %	11,76 %	88,24 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VALLE DE MENA	296	94,87 %	312
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE MENA	95,93 %	87,23 %	96,50 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	32	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	242	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	272	98,90 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE MENA	5,88 %	3,92 %	33,33 %	64,71 %	31,37 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE MENA	6,53 %	6,94 %	28,98 %	2,86 %	0,82 %	29,39 %	2,04 %	62,45 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VALLE DE TOBALINA	69	88,46 %	78
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	65	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	67	100,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE TOBALINA	95,45 %	64,29 %	92,86 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE TOBALINA	7,69 %	15,38 %	15,38 %	7,69 %	15,38 %	15,38 %	46,15 %
TOTAL GAP	3,11 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE TOBALINA	5,36 %	39,29 %	5,36 %	8,93 %	1,79 %	73,21 %
TOTAL GAP	3,27 %	30,29 %	4,44 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VALLE DE VALDEBEZANA	76	92,68 %	82
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE VALDEBEZANA	91,30 %	93,33 %	93,33 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	1	100,00 %
N36.2	Carúncula uretral	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	75	100,00 %
	TOTAL PACIENTES ITU	77	98,70 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE VALDEBEZANA	9,52 %	42,86 %	9,52 %	9,52 %	4,76 %	80,95 %	9,52 %	9,52 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLE DE VALDEBEZANA	5,45 %	7,27 %	29,09 %	3,64 %	3,64 %	3,64 %	27,27 %	60,00 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	71,53 %

VENTA DE BAÑOS				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VENTA DE BAÑOS	670	87,13 %	769									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
VENTA DE BAÑOS	92,81 %	83,76 %	83,07 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	31	93,55 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	20	80,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	616	97,89 %
	TOTAL PACIENTES ITU	662	96,53 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	50,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	2	50,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	31	93,55 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	20	80,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	616	97,89 %
	TOTAL PACIENTES ITU	662	96,53 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VENTA DE BAÑOS	0,62 %	2,47 %	9,88 %	33,95 %	18,52 %	18,52 %	29,01 %	6,79 %	29,01 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VENTA DE BAÑOS	2,36 %	4,13 %	0,20 %	26,18 %	3,15 %	12,01 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	12,60 %	8,27 %	73,82 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VIDRIALES	155	89,60 %	173
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VIDRIALES	91,30 %	89,47 %	88,99 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	140	98,57 %
	TOTAL PACIENTES ITU	153	97,39 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VIDRIALES	6,00 %	10,00 %	34,00 %	10,00 %	12,00 %	12,00 %	48,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VIDRIALES	3,81 %	4,76 %	27,62 %	4,76 %	14,29 %	9,52 %	1,90 %	78,10 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLABLINO	572	88,27 %	648
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLABLINO	92,91 %	86,09 %	82,94 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	33,33 %
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	26	96,15 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	25	92,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	520	97,88 %
	TOTAL PACIENTES ITU	563	96,98 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLABLINO	1,89 %	0,94 %	6,60 %	0,94 %	36,79 %	10,38 %	16,98 %	39,62 %	1,89 %	16,04 %
TOTAL GAP	3,11 %	0,08 %	7,04 %	0,16 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLABLINO	4,29 %	5,15 %	0,21 %	40,34 %	0,86 %	10,94 %	0,21 %	0,21 %	17,17 %	6,44 %	56,44 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,07 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLACASTIN	171	79,91 %	214
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLACASTIN	86,75 %	80,00 %	71,91 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	9	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	4	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	159	96,86 %
	TOTAL PACIENTES ITU	168	96,43 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLACASTIN	3,13 %	12,50 %	50,00 %	9,38 %	21,88 %	15,63 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLACASTIN	5,76 %	8,63 %	28,78 %	0,72 %	4,32 %	5,76 %	3,60 %	77,70 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLADA	140	86,42 %	162
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLADA	100,00 %	70,00 %	85,32 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	128	97,66 %
	TOTAL PACIENTES ITU	137	97,08 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLADA	7,89 %	2,63 %	31,58 %	7,89 %	5,26 %	23,68 %	2,63 %	52,63 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLADA	2,94 %	2,94 %	29,41 %	4,90 %	6,86 %	7,84 %	2,94 %	74,51 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VILLADIEGO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VILLADIEGO	166	86,91 %	191									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
VILLADIEGO	90,00 %	68,97 %	90,16 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	155	99,35 %
	TOTAL PACIENTES ITU	163	97,55 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	155	99,35 %
TOTAL PACIENTES ITU		163	97,55 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLADIEGO	4,55 %	40,91 %	6,82 %	11,36 %	61,36 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLADIEGO	0,82 %	6,56 %	24,59 %	17,21 %	4,10 %	8,20 %	2,46 %	72,95 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLAFRANCA	503	88,71 %	567
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAFRANCA	91,67 %	87,96 %	87,46 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	6	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	31	90,32 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	50	96,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N36.2	Carúncula uretral	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	437	97,71 %
	TOTAL PACIENTES ITU	503	96,82 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLAFRANCA	0,92 %	6,42 %	50,46 %	4,59 %	16,51 %	41,28 %	1,83 %	14,68 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLAFRANCA	0,76 %	6,60 %	55,08 %	1,02 %	11,42 %	0,25 %	21,83 %	7,61 %	48,98 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLAFRECHOS	94	84,68 %	111
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAFRECHOS	93,55 %	96,00 %	75,44 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	3	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	84	98,81 %
	TOTAL PACIENTES ITU	90	96,67 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VILLAFRECHOS	4,00 %	48,00 %	4,00 %	4,00 %	32,00 %	4,00 %	48,00 %
TOTAL GAP	3,11 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VILLAFRECHOS	10,14 %	2,90 %	27,54 %	5,80 %	18,84 %	4,35 %	73,91 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VILLALON DE CAMPOS				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VILLALON DE CAMPOS	176	88,44 %	199									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
VILLALON DE CAMPOS	95,92 %	86,21 %	85,95 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	167	98,80 %
	TOTAL PACIENTES ITU	172	98,84 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	3	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	167	98,80 %
TOTAL PACIENTES ITU		172	98,84 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLALON DE CAMPOS	4,69 %	4,69 %	43,75 %	1,56 %	25,00 %	1,56 %	1,56 %	26,56 %	3,13 %	53,13 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLALON DE CAMPOS	2,68 %	4,46 %	0,89 %	37,50 %	0,89 %	1,79 %	15,18 %	11,61 %	69,64 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VILLALPANDO				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VILLALPANDO	266	89,26 %	298									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									

VILLAMURIEL	Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos
-------------	---

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLAMURIEL	265	80,55 %	329
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAMURIEL	84,74 %	74,14 %	72,62 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1	
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	66,67 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	90,91 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	29	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	215	97,67 %
	TOTAL PACIENTES ITU	256	94,92 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLAMURIEL	2,00 %	2,00 %	2,00 %	32,00 %	6,00 %	10,00 %	40,00 %	26,00 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VILLAMURIEL	6,98 %	1,40 %	31,63 %	1,40 %	6,98 %	12,09 %	3,72 %	73,02 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLARCAYO	351	90,93 %	386
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLARCAYO	92,75 %	84,85 %	91,85 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	1	100,00 %
N13.70	Reflujo vesicoureteral, no especificado	1	
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	7	85,71 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	50,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	5	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	338	98,82 %
	TOTAL PACIENTES ITU	349	97,71 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLARCAYO	3,80 %	29,11 %	12,66 %	7,59 %	49,37 %	2,53 %	35,44 %
TOTAL GAP	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLARCAYO	1,84 %	3,31 %	0,37 %	33,82 %	4,04 %	2,57 %	15,07 %	3,68 %	82,72 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VILLARRAMIEL				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VILLARRAMIEL	182	89,66 %	203									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70						
VILLARRAMIEL	91,07 %	91,49 %	88,24 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	159	98,74 %
	TOTAL PACIENTES ITU	176	97,73 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	1	100,00 %
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	2	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	12	100,00 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	159	98,74 %
	TOTAL PACIENTES ITU	176	97,73 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VILLARRAMIEL	2,27 %	4,55 %	9,09 %	13,64 %	31,82 %	13,64 %	15,91 %	6,82 %	36,36 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VILLARRAMIEL	0,72 %	2,90 %	1,45 %	15,94 %	4,35 %	6,52 %	9,42 %	10,87 %	74,64 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VILLORIA	389	85,68 %	454
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLORIA	92,70 %	80,56 %	82,93 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	3	100,00 %
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	1	100,00 %
N30.10	Cistitis intersticial (crónica) sin hematuria	2	
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	393	96,69 %
	TOTAL PACIENTES ITU	399	96,24 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLORIA	5,81 %	2,33 %	43,02 %	41,86 %	8,14 %	1,16 %	19,77 %	1,16 %	31,40 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLORIA	2,64 %	1,65 %	43,23 %	6,93 %	6,93 %	0,33 %	5,28 %	13,53 %	64,03 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

VIRGEN CONCHA				Indicadores PRAN por proceso: ITU filtrados los códigos								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU									
VIRGEN CONCHA	1.015	87,35 %	1.162									
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797									
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=70									
VIRGEN CONCHA	92,94 %	81,09 %	83,79 %									
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %									
Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01									
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	8	75,00 %									
N11.9	Nefritis túbulo-intersticial crónica, no especificada	1	100,00 %									
N12	Nefritis túbulo-intersticial, no especificada como aguda ni como crónica	3	66,67 %									
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	1										
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	2										
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	4										
N15.1	Absceso renal y perirrenal	1	100,00 %									
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	2										
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	3										
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2										
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	84	96,43 %									
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	4	100,00 %									
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	17	94,12 %									
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	2										
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	4										
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	900	97,00 %									
	TOTAL PACIENTES ITU	1.004	95,42 %									

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VIRGEN CONCHA	0,54 %	2,16 %	3,78 %	38,38 %	25,41 %	12,43 %	1,08 %	29,73 %	20,54 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VIRGEN CONCHA	0,12 %	2,65 %	3,01 %	0,24 %	27,11 %	10,60 %	4,58 %	0,36 %	0,12 %	8,92 %	3,13 %	72,05 %
TOTAL GAP	0,04 %	2,32 %	3,27 %	0,16 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
VITIGUDINO	390	89,45 %	436
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VITIGUDINO	94,40 %	89,89 %	85,71 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N13.5	Cruce vascular y estenosis de uréter sin hidronefrosis	1	100,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	1	100,00 %
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	1	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	1	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	11	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	15	86,67 %
N32.89	Otros trastornos especificados de vejiga	1	
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	3	
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	374	98,40 %
	TOTAL PACIENTES ITU	399	97,24 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VITIGUDINO	5,26 %	3,16 %	41,05 %	6,32 %	13,68 %	1,05 %	1,05 %	52,63 %	2,11 %	18,95 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VITIGUDINO	3,39 %	1,36 %	40,00 %	5,08 %	4,75 %	0,34 %	0,34 %	11,19 %	9,83 %	63,39 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ZAMORA NORTE	496	85,52 %	580
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ZAMORA NORTE	90,43 %	81,40 %	83,01 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	2	50,00 %
N13.30	Hidronefrosis no especificadas	3	33,33 %
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	2	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	25	96,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	2	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	26	88,46 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	2	
N36.8	Otros trastornos especificados de uretra	2	50,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	455	95,82 %
	TOTAL PACIENTES ITU	504	94,44 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ZAMORA NORTE	5,07 %	7,97 %	45,65 %	18,12 %	14,49 %	2,90 %	23,19 %	5,07 %	22,46 %
TOTAL GAP	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ZAMORA NORTE	1,12 %	3,07 %	29,89 %	6,15 %	6,42 %	0,56 %	12,29 %	3,35 %	67,32 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de ITU tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac ITU J01	% Pac ITU J01	Nº Pac ITU
ZAMORA SUR	679	88,53 %	767
TOTAL GAP	137.865	88,49 %	155.797

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ZAMORA SUR	94,65 %	80,87 %	86,44 %
TOTAL GAP	92,96 %	83,70 %	85,54 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac ITU	% Pac ITU J01
N10	Nefritis túbulo-intersticial aguda	4	75,00 %
N13.9	Uropatía obstructiva y por reflujo, no especificada	3	33,33 %
N28.1	Quiste de riñón, adquirido	1	
N28.89	Otros trastornos especificados de riñón y uréter	2	
N28.9	Trastorno del riñón y del uréter, no especificado	3	
N30.00	Cistitis aguda sin hematuria	4	75,00 %
N30.20	Otros tipos de cistitis crónica sin hematuria	1	100,00 %
N30.90	Cistitis, no especificada, sin hematuria	18	100,00 %
N35.919	Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada	1	100,00 %
N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada	656	97,87 %
	TOTAL PACIENTES ITU	688	96,51 %

Subgrupos del J01 - Hombres	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ZAMORA SUR	0,61 %	3,66 %	12,80 %	32,32 %	18,90 %	16,46 %	0,61 %	3,66 %	26,22 %	2,44 %	35,37 %
TOTAL GAP	0,32 %	3,11 %	7,04 %	38,61 %	14,02 %	11,36 %	0,51 %	0,45 %	34,92 %	3,33 %	28,75 %

Subgrupos del J01 - Mujer	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XE / DERIVADOS DEL NITROFURANO	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ZAMORA SUR	3,11 %	4,85 %	28,54 %	10,49 %	13,59 %	0,19 %	2,52 %	10,29 %	4,85 %	67,38 %
TOTAL GAP	2,32 %	3,27 %	30,29 %	4,44 %	5,92 %	0,20 %	0,12 %	12,09 %	6,02 %	71,53 %