



PAXLOVID® (Nirmatrelvir/Ritonavir) HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Paxlovid es un medicamento antiviral que se utiliza para el tratamiento de la Covid-19 en adultos que no requieren un aporte de oxígeno suplementario y que tienen un riesgo elevado de progresar a COVID-19 grave.

Inicie el tratamiento solo si los síntomas han comenzado en los 5 días previos (si no, no sería efectivo)

Es un medicamento que interacciona con muchos otros medicamentos y algunos productos de herboristería (hierba de S. Juan).

Es necesario que comunique previamente al médico y al farmacéutico todo los medicamentos que esté tomando para evitar efectos adversos que pueden llegar a ser mortales.

Mientras lo esté tomando y durante los siguientes 3 días no tome ningún medicamento por su cuenta, pida siempre información a su médico.

Si el médico le ha recomendado suspender algún tratamiento de los que toma habitualmente, o reducir la dosis del mismo, siga estrictamente sus instrucciones, de lo contrario puede ser peligroso para su salud. Compruebe su hoja de medicación.

Informe a su médico si sus síntomas empeoran o no mejoran después de 5 días o experimenta cualquier efecto adverso

No suspenda el tratamiento sin que se lo indique su médico, incluso aunque se encuentre mejor

Si tiene la Función Renal alterada advierta a su médico, puede tener que modificar la dosis de Paxlovid.

Si tiene alguna duda sobre su tratamiento consulte a su médico

Lea atentamente el prospecto del medicamento

Compruebe su última hoja de Medicación

CONTENIDO DEL ENVASE

El envase contiene dos principios activos (Nirmatrelvir (PF-07321332) y ritonavir) en comprimidos diferentes.

En cada envase hay 5 blíster*



* Imagen de un blister

Cada blíster contiene la medicación para 1 día de tratamiento (6 comprimidos), con las dosis de la mañana y la noche.

Cada blíster por el reverso se diferencia en dos colores: (ver imagen más abajo)

amarillo (símbolo sol) para tomar por la mañana 3 comprimidos

azul (símbolo luna) para tomar por la noche 3 comprimidos.

COMO SE TOMA?

Se recomienda tomar cada 12 h.

Por la mañana tomar los 3 comprimidos de la parte amarilla del blíster y por la noche los 3 comprimidos de la parte azul. Para cada dosis, tome los 3 comprimidos al mismo tiempo.

Si tiene problemas renales y su médico se lo indica, debe tomar 2 comprimidos cada 12 horas: 1 comprimido rosa de nirmatrelvir + 1 comprimido blanco de ritonavir

<p>AMARILLO (símbolo sol): Dosis MAÑANA: 3 comprimidos</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 de ritonavir• 2 de PF-07321332 (nirmatrelvir) <p>En I. Renal: 2 comprimidos</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 de ritonavir• 1 PF-07321332 (nirmatrelvir)		<p>AZUL (símbolo luna): Dosis NOCHE: 3 comprimidos</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 de ritonavir• 2 de PF-07321332 (nirmatrelvir) <p>En I. Renal: 2 comprimidos</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 de ritonavir• 1 PF-07321332 (nirmatrelvir)
--	--	--

Trague los comprimidos enteros. No mastique, rompa, ni triture los comprimidos
Paxlovid se puede tomar con y sin alimentos

QUE HACER SI SE OLVIDA TOMAR UNA DOSIS?

Si olvidó tomar Paxlovid

- Y han pasado menos de 8 horas desde la hora habitual a la que toma la medicación: **TOMELA EN CUANTO SE ACUERDE** y posteriormente siga con la pauta habitual.
- Si han pasado más de 8 horas, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada