

Información para pacientes

Citisiniclina para el tratamiento de la dependencia del tabaco

Citisiniclina está indicada en adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.

Al igual que otros tratamientos farmacológicos para la deshabituación tabáquica, en Sacyl su utilización se plantea en pacientes incluidos en el [Proceso Asistencial Integrado para la atención a las personas fumadoras](#). Es en la fase de acción cuando se valorará la posibilidad de iniciar tratamiento farmacológico.



Posología y forma de administración


La duración del tratamiento es de **25 días**.

Un envase de 100 comprimidos es suficiente para un ciclo de tratamiento completo.

Debe dejar de fumar a más tardar el 5º día de tratamiento.

En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses, aunque solo se financiará un tratamiento al año de cualquier fármaco para deshabituación.

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima
Del 1º al 3º día	1 comprimido cada 2 horas	6 comp.
Del 4º al 12º día	1 comprimido cada 2,5 horas	5 comp.
Del 13º al 16º día	1 comprimido cada 3 horas	4 comp.
Del 17º al 20º día	1 comprimido cada 5 horas	3 comp.
Del 21º al 25º día	1-2 comprimidos al día	2 comp.



- ✓ Solo debes tomar citisiniclina si tienes la **férme intención de dejar de fumar**.
- ✓ **No debes seguir fumando ni usar productos que contengan nicotina mientras estés con el tratamiento**, porque esto podría provocar reacciones adversas más graves.
- ✓ La posología es compleja y exigente. **Asegúrate de que has comprendido la forma de tomarla**.