

Indicadores PRAN por proceso: Neumonía

Año y mes núm.	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gerencia AP	Nº Pac Neumonía J01	% Pac Neumonía J01	Nº Pac Neumonía
GAP ÁVILA	401	76,38 %	525
GAP BURGOS	1.324	82,03 %	1.614
GAP LEÓN	798	75,93 %	1.051
GAP EL BIERZO	331	80,73 %	410
GAP PALENCIA	745	83,71 %	890
GAP SALAMANCA	735	76,24 %	964
GAP SEGOVIA	641	83,25 %	770
GAP SORIA	257	78,12 %	329
GAP VALLADOLID OESTE	1.156	83,29 %	1.388
GAP VALLADOLID ESTE	1.036	84,23 %	1.230
GAP ZAMORA	528	82,24 %	642
TOTAL GRS	7.952	81,09 %	9.813

Grupos Edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GAP ÁVILA	79,27 %	77,42 %	74,25 %
GAP BURGOS	84,15 %	78,91 %	81,34 %
GAP LEÓN	81,47 %	70,79 %	74,02 %
GAP EL BIERZO	88,51 %	73,97 %	75,46 %
GAP PALENCIA	87,36 %	79,21 %	82,19 %
GAP SALAMANCA	81,19 %	74,42 %	73,08 %
GAP SEGOVIA	80,32 %	79,66 %	86,96 %
GAP SORIA	84,68 %	75,00 %	74,70 %
GAP VALLADOLID OESTE	86,69 %	76,00 %	80,17 %
GAP VALLADOLID ESTE	87,92 %	81,11 %	81,54 %
GAP ZAMORA	89,47 %	73,83 %	79,88 %
TOTAL GRS	84,96 %	76,79 %	78,99 %

Codigo Diag.	Diagnostico (CIE)	Nº Pac Neumonía	% Pac Neumonía J01
A48.1	Enfermedad de los legionarios	5	80,00 %
J11.00	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con tipo de neumonía no especificado	43	69,77 %
J12.82	Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019	78	19,23 %
J12.9	Neumonía vírica, no especificada	6	33,33 %
J13	Neumonía por Streptococcus pneumoniae	50	88,00 %
J14	Neumonía por Haemophilus influenzae	2	100,00 %
J15.7	Neumonía por Mycoplasma pneumoniae	9	100,00 %
J15.9	Neumonía bacteriana no especificada	565	88,50 %
J16.0	Neumonía por clamidias	1	
J18.0	Bronconeumonía, microorganismo no especificado	397	76,57 %
J18.9	Neumonía, nmicroorganismo no especificado	8.630	81,55 %
J69.0	Neumonitis debida a inhalación de alimentos y vómito	54	61,11 %
J69.1	Neumonitis debida a inhalación de aceites y esencias	1	
J69.8	Neumonitis debida a inhalación de otros sólidos y líquidos	4	50,00 %
J82.81	Neumonía eosinofílica crónica	19	10,53 %
	TOTAL PACIENTES Neumonía	9.864	81,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Neumonía tratados con un antibiótico

Subgrupos de mayor consumo	J01AA / TETRACICLI NAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTE S A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIO NES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DB / CEFALOSPO RINAS DE PRIMERA GENERACIO N	J01DC / CEFALOSPO RINAS DE SEGUNDA GENERACIO N	J01DD / CEFALOSPO RINAS DE TERCERA GENERACIO N	J01EE / COMBINACIO NES DE SULFONAMI DAS Y TRIMETOPRI MA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDO S	J01FF / LINCOSAMID AS	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
GAP ÁVILA	0,42 %	7,35 %	0,21 %		19,33 %		3,15 %	17,44 %	2,10 %	9,87 %	1,26 %	38,87 %
GAP BURGOS	0,19 %	4,57 %			24,63 %		2,72 %	25,49 %	0,74 %	16,05 %		25,62 %
GAP LEÓN	0,11 %	7,95 %		0,11 %	19,15 %		7,39 %	11,20 %	2,24 %	7,95 %	0,56 %	43,34 %
GAP EL BIERZO	0,49 %	3,65 %			32,12 %		3,65 %	6,33 %	1,46 %	18,25 %		34,06 %
GAP PALENCIA		7,46 %		0,11 %	19,41 %		1,43 %	16,56 %	0,55 %	15,13 %	0,66 %	38,71 %
GAP SALAMANCA	0,23 %	7,31 %		0,11 %	27,09 %		3,43 %	17,26 %	1,14 %	12,57 %	1,03 %	29,83 %
GAP SEGOVIA	0,13 %	9,72 %			29,28 %		1,53 %	11,38 %	1,53 %	13,94 %	1,28 %	31,20 %
GAP SORIA	0,31 %	10,19 %			29,32 %		2,16 %	18,52 %	1,85 %	18,83 %	0,62 %	18,21 %
GAP VALLADOLID OESTE	0,20 %	8,50 %	0,20 %		21,35 %		2,86 %	14,55 %	0,20 %	21,01 %	1,50 %	29,64 %
GAP VALLADOLID ESTE	0,16 %	4,84 %			18,48 %		1,29 %	20,50 %	0,73 %	15,74 %	1,29 %	36,97 %
GAP ZAMORA	0,31 %	7,02 %		0,15 %	23,21 %	0,15 %	1,68 %	20,76 %	0,92 %	16,79 %	0,92 %	28,09 %
TOTAL GRS	0,20 %	6,91 %	0,04 %	0,04 %	23,06 %	0,01 %	2,81 %	17,36 %	1,03 %	15,38 %	0,85 %	32,33 %