

## PRESCRIPCIÓN DIFERIDA EN MÓDULO DE PRESCRIPCIÓN

La prescripción diferida de antibióticos consiste en incorporar una nueva prescripción antibiótica e instruir al paciente para que lo tome, únicamente, en caso de que los síntomas no mejoren o empeoren unos días después de la visita médica.

La funcionalidad se encuentra disponible en el Formulario de receta del Módulo de prescripción (PRES) sólo para antibióticos seleccionados y requiere la selección de la marca “Diferida”. A continuación, en el espacio de **Instrucciones de posología al paciente** se volcará el texto **“Tome sólo si sus síntomas no mejoran en 2-3 días. Si empeora, adelante el inicio del tratamiento”**. Esta información se mostrará en la Hoja de medicación del paciente y, en su caso, en la receta impresa.

The screenshot shows a medical prescription form with the following details:

- Proceso clínico:** NEUMONIA. Nuevo Proceso Clínico. Imprimir diagnóstico en hoja medicación.
- Prescripción:** AMOXICILINA 1000 MG | COMPRIMIDOS | ORAL.
- Financiación:** Tipo de financiación: Financiado. Aportación: NORMAL.
- Posología:** 1 COMP cada 8 Horas durante 5 Dias. Otras Pautas. Si precisa.
- Renovación a los:**  Diferida PROA (highlighted with a red box).
- Horario de administración:** Mañana (6-12h), Mediodía (13-16h), Tarde (17-19h), Noche (20-24h).
- Condiciones de administración:** Estómago vacío: tomar media hora antes o dos horas después de comer. Con alimentos: tomar durante las comidas o inmediatamente después.
- Instrucciones de posología al paciente:** Tome sólo si sus síntomas no mejoran en 2-3 días. Si empeora, adelante el inicio del tratamiento.
- Observaciones:** (Empty field)
- Advertencias al farmacéutico:** (Empty field)
- Autorizada enfermería:**

El registro de una alergia no avisa ante la prescripción de medicamentos. Solo se muestran las interacciones de la base de datos BotPlus. El que una interacción no aparezca descrita no significa que no sea posible.

**En los pacientes incorporados a Recyl, la marca “Diferida” tendrá efectos en la disponibilidad del antibiótico para evitar su dispensación inmediata. Por ese motivo, inmediatamente después de registrar la prescripción se mostrará el siguiente Aviso:**

The alert dialog box contains the following text:

**Atención**

Si el paciente es RECYL, la prescripción estará disponible a partir de mañana.

**Cerrar**

En las **prescripciones por SCPA** con marca “Diferida”, aunque se retrase su retirada de la farmacia, siempre se entregará el tamaño de envase con la cantidad de medicación necesaria para completar la duración de tratamiento. Es decir, ese retraso no afectará al tamaño de envase.