

LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19

Vacuna de Pfizer/BioNTech COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (tozinamerán y famtozinamerán)

A CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE LA VACUNA

- Imacunar completamente separadas de otras vacunas o medicamentos.
- Almacenar entre -90°C y -60°C hasta 12 meses, protegido de la luz.
- Identificar adecuadamente la fecha de validez de los viales tras su descongelación: máximo 10 semanas entre 2°C y 8°C . Puede transportarse a esta temperatura durante 12 horas.
- Almacenar por separado cada nuevo envío de viales según fecha de validez.
- Desechar cualquier vial que haya superado la fecha de validez.

B RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DURANTE TODO EL PROCESO DE VACUNACIÓN

DEL ENTORNO

- Dar cita previa para evitar aglomeraciones en las salas de espera.
- Habilitar espacio de fácil acceso.
- Organizar las salas habilitadas para la espera de modo que permita **mantener la distancia interpersonal de seguridad**.
- Ventilación de **salas habilitadas para la espera y zona asistencial**: mantener las ventanas abiertas si no se dispone de la ventilación mecánica adecuada.
- **En domicilios**: ventilar la habitación en la que se realiza la vacunación, minimizar el número de acompañantes y mantener la distancia interpersonal de seguridad.
- Disponer de dispensadores de productos de base alcohólica para la higiene de manos.

PARA LOS EQUIPOS DE VACUNACIÓN

- Disponer del EPI adecuado (recuerda: *profesionales seguros, pacientes seguros*).
- Higiene de manos antes de comenzar.

PARA LAS PERSONAS A VACUNAR

- Mantener **maskarilla quirúrgica** correctamente colocada.
- Mantener la **distancia interpersonal**.
- **Higiene de manos**.

1 PREVIO A LA VACUNACIÓN

- Preparar el **material para situaciones de emergencia** (accesible y en condiciones de utilización).
En domicilios: preparar maletín con el material necesario para la atención a posibles reacciones anafilácticas
- Preparar el **material necesario** para la vacunación.
- **Seleccionar VACUNA CORRECTA** (¿coexisten diferentes marcas de vacuna!).
- Revisar **condiciones de conservación de viales**
 - **Viales sin perforar**: máximo 10 semanas refrigerados (2°C a 8°C) y 12 horas a temperatura ambiente (8°C a 30°C).
 - **Viales perforados**: hasta 12 horas entre 8°C y 30°C tras extraer la primera dosis.
- **NO DILUIR** el vial
- **Homogeneizar suavemente** el vial invirtiéndolo diez veces antes de su uso (**NO agitar**)
- Comprobar el **estado del vial** (después de homogeneizar: dispersión blanquecina sin partículas visibles)
- Seleccionar la aguja adecuada para la carga de cada dosis: debe utilizarse esa misma aguja para la administración.
- **En domicilios: desinfectar el tapón del vial y dejar secar antes de cada carga.**
- **Cargar cada jeringa** con la dosis adecuada (**0,3 ml**).
- De cada vial pueden extraerse **al menos 6 dosis**; **NO mezclar remanentes** de diferentes viales para obtener dosis adicionales.

- **CONFIRMAR** la **IDENTIDAD** de la persona a vacunar: – Nombre y apellidos/Edad (≥ 12 años).

• VALORAR CONTRAINDICACIONES E HISTORIAL DE VACUNACIÓN (ficha técnica):

- Patologías o alergias a componentes de la vacuna y otras alergias.
- **Comprobar primovacunación previa completa y tiempo transcurrido desde la última dosis (5 MESES)** y realizar anamnesis sobre posibles efectos secundarios e hipersensibilidad.

• INFORMAR a la persona/familiar/cuidador:

- Realizar consentimiento informado.

• REGISTRAR LA VACUNA en:

- **HC (módulo VACU)**: comprobar persona a vacunar, marca de la vacuna a administrar y registrar dosis, marca, lote, fecha de administración e indicación de la vacunación.
- **Tarjeta de vacunación**.

2 ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA

- Realizar correcta **higiene de manos**.
- **Elección del punto** de inyección y limpieza de la zona si fuese necesario.
- Administrar por **vía intramuscular** según ficha técnica, utilizando **la misma aguja con la que se ha realizado la extracción** siempre que sea posible.
- Eliminación adecuada de **residuos biosanitarios**.

3 POSTERIOR A LA VACUNACIÓN

- **VIGILAR POSIBLES REACCIONES ADVERSAS INMEDIATAS** post administración (15-30 minutos).
Si aparece reacción adversa, NOTIFICAR en VACU y también en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
- Informar sobre:
 - **SIGNOS DE ALARMA** y posibles efectos secundarios así como de las **actuaciones a realizar** en cada caso (teléfono de contacto).
 - **NECESIDAD DE COMUNICAR REACCIONES ADVERSAS**.
 - **Fecha de la segunda dosis**.
 - Necesidad de seguir manteniendo las **medidas de protección frente a la COVID-19** (maskarilla, distancia interpersonal, etc.).
- Entregar tarjeta de vacunación y hoja de información.
- Realizar higiene de manos.

Cápsula gris




Presentación adultos (≥ 12 años)
(15/15 microgramos)/dosis
Dispersión inyectable

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS



PUNTOS CLAVE PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Vacuna de Pfizer/BioNTech COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (tozinamerán y famtozinamerán)



Se recomienda que cada equipo de vacunación **NO** utilice simultáneamente diferentes presentaciones o marcas de vacuna

DURANTE EL ACTO VACUNAL, RECUERDA:

- **NO es necesaria la desinfección de la piel de la zona de inyección**; si estuviese visiblemente sucia, limpiar con agua o suero salino y secar posteriormente.
- **NO aspirar previamente a la inyección.**
- **NO retirar la aguja hasta asegurarse de haber inyectado la dosis completa.**
- **NO es necesario utilizar guantes para la vacunación.** Una adecuada **higiene de manos** entre pacientes es suficiente para prevenir la propagación de infecciones.