

## VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA. ACTUALIZADO A 2002


**Redacción: Henar Marcos Rodríguez**  
Servicio de Epidemiología  
Dirección General de Salud Pública

### DATOS MUNDIALES

El número de casos acumulados de sida en el mundo hasta el 22 de noviembre de 2002 asciende a 2.822.111 con la siguiente distribución por continentes (**figura 1**).

ONUSIDA, Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, estima


que a finales de 2002, en el mundo hay 42 millones de personas viviendo con la infección por el VIH/Sida. Un total de 5 millones de personas han contraído la infección en 2002. Se calcula que aproximadamente se han producido 14.000 casos nuevos diarios de infección por VIH en el 2002. De ellos 12.000 son adultos entre 15 y 49 años.



### DATOS EUROPEOS

En Europa hasta 30 de junio de 2002, han sido declarados un total de 261.440 casos acumulados de sida. Tres países, Francia, España e Italia superan los 50.000 casos. Los grupos de riesgo más frecuentes son usuarios de drogas por vía intravenosa (UDI) y homosexuales/bisexuales, seguidos en frecuencia por los contactos heterosexuales (18,1%). La enfermedad indicativa de sida más frecuente en los casos de adultos declarados, es la neumonía por *Pneumocystis carinii* (34,1%).

Los casos de los países europeos pueden verse en la **figura 2**.



### DATOS EN ESPAÑA




Durante el año 2002 se estima que se diagnosticaron en España 2.437 casos de sida, según datos corregidos por el retraso en la notificación. Esta cifra supone una estabilización en la incidencia de sida en comparación con los 2.414 casos diagnosticados en 2002, y con ello, un cambio en la tendencia descendente de los años anteriores. De los casos notificados en 2002, el 79% son varones y la edad media es de 38,8 años. La vía de transmisión más frecuente fue el compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas (52%). La transmisión por relaciones heterosexuales no protegidas asciende al 27%, pero adquiere especial relevancia en mujeres, donde representa el 44% de los casos.

La tasa de incidencia de sida en España para 2002 se estima en torno a los 37,3 casos nuevos por millón de habitantes, no obstante persisten grandes diferencias geográficas con las tasas más elevadas en Madrid, Baleares y País Vasco. En la **figura 3** pueden verse la tasa de sida en el año 2002 por Comunidad Autónoma.

### DATOS EN CASTILLA Y LEÓN

Desde 1982 a 2002, en Castilla y León se han registrado 2.306 casos de sida, con una tasa acumulada de 938,74 casos por millón de habitantes y una tasa de incidencia anual para el año 2000 de 61,2 casos por millón de habitantes, de 33 para el 2001 y de 22 para 2002.


Por provincias, Valladolid tienen la mayor tasa acumulada (1.244,74), seguida por Palencia (1.159,97); la distribución de los casos acumulados y las tasas puede verse en la **figura 4**.





En relación a la distribución por sexo, un 78,8% de todos los casos son varones y un 21,2% mujeres, circunstancia explicable por el carácter de transmisión homosexual sólo varones y por la mayor frecuencia del hábito de drogadicción en varones que mujeres (**figura 5**).

En la variable edad, se registra la edad en la fecha de diagnóstico de la primera enfermedad indicativa de sida. En Castilla y León el 74,6% de todos los casos se encuentran comprendidos entre los 20 y 39 años; los casos pediátricos (menores de 13 años) suponen el 2% del total, **figura 6**.

Según el comportamiento de riesgo, el mayor porcentaje de casos en la Comunidad Autónoma corresponde a usuarios de drogas por vía intravenosa (69,9%), en segundo lugar aparece la transmisión heterosexual seguido de la homosexual con el 15,2% y el




6,3% respectivamente. Es reseñable la creciente importancia que va teniendo la transmisión heterosexual, al igual que ocurre en otros lugares del mundo. En las **figuras 7 y 8** se representa la distribución de los comportamientos de riesgo y su tendencia.



La figura 9 muestra el porcentaje de casos según el tipo de diagnóstico. Podemos observar que el diagnóstico de infec-

ción oportunista (52,9%) es el más frecuente, seguido de la tuberculosis con un 32,6% (figura 9):



## Bibliografía

- 1.- European Center for the Epidemiological Monitoring of AIDS. AIDS Surveillance in the Europe. Rapport du 2<sup>ème</sup> semestre 2002, n° 67,
- 2.- Vigilancia del Sida en España. Informe trimestral n° 2/2002. Registro Nacional de Sida. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.
- 3.- Weekly Epidemiological Record, N° 49, 6 de December de 2002.

**Suscripciones:** Envío gratuito, siempre que sea dirigido a profesionales sanitarios. Solicitudes: Consejería de Sanidad y Consumo. Avda. de Burgos, 5. 47071 VALLADOLID.