

**PRUEBAS SELECTIVAS, PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
PLAZAS DE ENFERMERO/A ESPECIALISTA:
MATRONA, DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA
Y LEÓN, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA,
(ORDEN SAN/484/2021 DE 14 DE ABRIL).**

FASE DE OPOSICIÓN.

ADVERTENCIAS.

- 1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja de respuestas".
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señala en la "Hoja de respuestas" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio.
5. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. todas las preguntas tienen el mismo valor.
6. Este cuestionario consta de 99 preguntas, de las cuales las 9 últimas son de reserva para posibles anulaciones.
7. En el caso de anulación de preguntas, las de reserva se irán utilizando por el orden en el que figuran en el cuestionario.
8. Las contestaciones erróneas no se penalizarán.
9. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
10. Sobre la forma de contestar en la "hoja de respuestas" lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la misma."
11. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar las "Hojas de respuestas.

CUESTIONARIO

Pregunta nº 1:Cuál de los siguientes datos no se considera antecedente obstétrico-ginecológico.

- A. Formula menstrual.
- B. Edad de la menarquia.
- C. Alergias medicamentosas.
- D. Anticoncepción.

Pregunta nº 2: En relación con la metodología enfermera, cuál de las siguientes corresponde a la definición de modelo:

- A. Conjunto de ideas conectadas para ilustrar un concepto más general y amplio (representación simbólica de la realidad).
- B. Conjunto de conceptos definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistemática de un fenómeno.
- C. Corriente de pensamiento y manera de ver y comprender el mundo que influye en el desarrollo del saber y de la habilidad en el seno de las disciplinas.
- D. Doctrina del conocimiento.

Pregunta nº 3: Señala la respuesta incorrecta. El partograma:

- A. Es un registro específico y común para matronas y obstetras.
- B. Ofrece una visión global del proceso del parto.
- C. No es decisivo en la toma de decisiones.
- D. Si está informatizado las anotaciones se realizan de la misma manera evitando errores de interpretación.

1

Pregunta nº 4: Quién estableció el análisis gráfico de trabajo de parto o partograma en 1954:

- A. Hodge.
- B. Friedman.
- C. Montevideo.
- D. Schultz.

Pregunta nº 5: En relación con la Educación para la Salud señala la afirmación correcta:

- A. Es un instrumento para la promoción de la salud.
- B. Es un proceso educativo que tiene como finalidad responsabilizar a los ciudadanos sobre su propia salud.
- C. Es parte de un proceso asistencial.
- D. Todas son correctas.

Pregunta nº 6: En la clasificación de Salleras de métodos directos utilizados en Educación para la Salud no se encuentra:

- A. Diálogo/entrevista.
- B. Discusión en grupo.
- C. Carteles.
- D. Clase formal y charla.

Pregunta nº 7:Cuál de las siguientes es una ventaja de la Educación sanitaria grupal.

- A. Asistencia variable de los pacientes.
- B. Aumenta la motivación y la autoestima.
- C. Es más eficiente ya que supone un menor coste.
- D. B y C son correctas

Pregunta nº 8: Para establecer el movimiento natural de la población se establecen varios registros básicos que son:

- A. Nacimientos y defunciones.
- B. Emigración exterior e interior.
- C. Matrimonios
- D. A y C son correctas.

Pregunta nº 9: Señala la respuesta incorrecta relacionada con la pubertad femenina.

- A. Es el periodo de transición, dinámico y progresivo entre la infancia y la edad adulta.
- B. Incluye el crecimiento somático, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y cambios psicológicos.
- C. El vello axilar y púbico aparecen como consecuencia de la acción de los estrógenos.
- D. La menarquia suele aparecer en los estadios finales de la pubertad.

Pregunta nº 10: Señala la afirmación incorrecta

- A. La tasa de fecundidad es el total de nacimientos en un ámbito geográfico por cada mil mujeres en edad fértil.
- B. La tasa de mortalidad infantil es el cociente entre las defunciones de menores de un año ocurridas durante un año y el número total de habitantes.
- C. La tasa de mortalidad es el número de defunciones ocurrida en una población en un tiempo determinado por cada mil habitantes.
- D. El saldo migratorio es la diferencia que existe entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones de un determinado lugar.

Pregunta nº 11: Respecto la postura que adopta la mujer durante el parto señala la incorrecta:

- A. Las posiciones verticales se asocian a una menor duración de la segunda etapa del parto comparada con la litotomía.
- B. Las mujeres en cuadrupedia presentan mayor dolor lumbar persistente.
- C. La posición sentada es un factor protector del trauma perineal.
- D. En mujeres con analgesia epidural las posiciones verticales reducen la duración de la segunda etapa del parto si se comparan con la posición supina.

Pregunta nº 12: En la valoración del bienestar fetal puede utilizarse el Test no estresante (TNS). Señala la afirmación correcta.

- A. El objetivo es valorar el grado de bienestar del feto antes del parto.
- B. Consiste en la monitorización de la Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF), de los movimientos fetales y de la actividad uterina mediante un aparato de cardiotocografía interna.
- C. Está contraindicado en gestantes diabéticas.
- D. Está indicado en el control del bienestar fetal en las embarazadas de bajo riesgo desde la semana 37 de gestación.

Pregunta nº 13: Entre las complicaciones de la inducción con oxitocina nos encontramos

- A. Intoxicación hídrica.
- B. Polisistolia.
- C. Rotura uterina.
- D. Todas son correctas.

3

Pregunta nº 14: Señala la afirmación incorrecta en relación con el óxido nitroso.

- A. Actúa limitando la sinapsis y transmisión neuronal en el sistema nervioso central.
- B. Es un gas inhalable que contiene 50% de oxígeno y 50% de óxido nitroso.
- C. Se elimina inmediatamente al minuto sin dejar rastro.
- D. Precisa instrucción previa a su uso.

Pregunta nº 15: Son complicaciones maternas del embarazo gemelar:

- A. Aumento de edemas.
- B. Anemia.
- C. Oligoamnios.
- D. A y B son ciertas.

Pregunta nº 16: Entre las situaciones clínicas que requieren traslado al hospital durante la asistencia a un parto domiciliario no se encuentra

- A. Rotura de membranas de más de 12 horas antes del trabajo de parto.
- B. Necesidad de anestesia epidural.
- C. Parto estacionado en cualquiera de sus fases.
- D. Desgarro de tercer o cuarto grado.

Pregunta nº 17: En qué fase cada espermátide sufre cambios para transformarse en espermatozoide:

- A. Fase de maduración.
- B. Fase de crecimiento.
- C. Fase de diferenciación.
- D. Fase de proliferación.

Pregunta nº 18: Los primeros escritos sobre embriología se recogen en:

- A. Garbba upanishad.
- B. En los libros de Hipócrates de Cos.
- C. En un escrito de Aristóteles de Estagira.
- D. Claudio Galeno escribió un libro en los que describió el desarrollo, nutrición del feto y las estructuras que se llaman alantoides, amnios y placenta.

4

Pregunta nº 19: Señala la causa principal de las anomalías numéricas de los cromosomas.

- A. La no disyunción durante la división celular mitótica o meiótica.
- B. Surgen a partir de una mórula triploide.
- C. La oclusión impide que el oocito entre en contacto con el espermatozoide.
- D. Los estrógenos administrados impiden la implantación al blastocisto.

Pregunta nº 20: ¿Cómo se clasifican las malformaciones genéticas?:

- A. Malformaciones, displasias, anomalías, desorganizaciones.
- B. Malformación, desorganización, deformación, displasia.
- C. Malformación, secuencia, deformación, displasia.
- D. Malformación, anomalía, secuencia, disfomorfología.

Pregunta nº 21: ¿Dónde se produce la capacitación del espermatozoide?

- A. En las vías genitales femeninas.
- B. En las vías genitales masculinas
- C. En el momento de la eyaculación.
- D. En el testículo.

Pregunta nº 22: El proceso por el cual el disco embrionario bilaminar se convierte en disco embrionario trilaminar se denomina:

- A. Gastrulación.
- B. Proceso notocordal.
- C. Nerulación.
- D. Celoma intraembrionario.

Pregunta nº 23: En la ovulación es expulsado del ovario:

- A. Un ovocito I en profase.
- B. Un ovocito I en metafase.
- C. Un ovocito II en profase.
- D. Un ovocito II en metafase.

Pregunta nº 24: ¿Qué reacción realizan las enzimas contenidas en el acrosoma?

- A. Modifican la estructura molecular de la ZP3.
- B. Destruyen la membrana plasmática del ovocito.
- C. Destruyen localmente la membrana pelúcida.
- D. Rompen las uniones intercelulares de las células foliculares.

Pregunta nº 25: El disco embrionario se caracteriza por:

- A. Estar constituido por el epiblasto y el sincitiotrofoblasto.
- B. La aparición de la estría primitiva.
- C. La formación del saco vitelino primario y surge el mesodermo extraembrionario.
- D. La constitución del hipoblasto y el citotrofoblasto.

5

Pregunta nº 26: Señale la respuesta correcta:

- A. Alrededor del 7º-8º día el embrioblasto forma el disco trilaminar.
- B. Las células externas del saco vitelino forman una nueva capa de tejido conjuntivo, el mesodermo extraembrionario.
- C. En la tercera semana de implantación se forman varias estructuras extraembrionarias: cavidad amniótica, saco vitelino, tallo de conexión y saco coriónico.
- D. La membrana de Heuser junto con el hipoblasto constituyen el saco vitelino.

Pregunta nº 27: ¿Qué células pueden originar uno o varios tejidos?

- A. Somáticas.
- B. Haploides.
- C. Diploides.
- D. Germinativas.

Pregunta nº 28: Tienen capacidad de formar un organismo completo:

- A. Células somáticas.
- B. Células germinativas.
- C. Células pluripotenciales.
- D. Ninguna de las anteriores.

Pregunta nº 29: Al inicio del periodo fetal:

- A. Son visibles los arcos faríngeos (branquiales).
- B. Los rebordes mesonefríticos indican el lugar de los riñones mesonefríticos.
- C. La principal localización de la eritropoyesis es el hígado.
- D. El arco faríngeo (hiotideo) que está creciendo con rapidez sobrepasa el tercer y cuarto arcos y forma una depresión ectodérmica lateral, seno cervical.

Pregunta nº 30: La causa más común de cardiopatía cianótica en los recién nacidos es:

- A. Estenosis aortica.
- B. Transposición de grandes arterias (TGA)
- C. Canal auricoventricular (defecto del relieve endocárdico).
- D. Conducto arterial persistente (CAP).

Pregunta nº 31: Las arterias vitelinas ,que solo permanecen tres, se transforman en:

- A. La arteria mesentérica inferior que va al intestino posterior.
- B. Las arterias vesicales superiores.
- C. Los arcos aórticos.
- D. El miocardio primitivo.

Pregunta nº 32: El conducto arterioso de botal realiza la comunicación de:

- A. Ventrículo izquierdo y derecho.
- B. La arteria pulmonar con la vena cava inferior.
- C. Las dos aurículas.
- D. La arteria pulmonar con la aorta.

Pregunta nº 33: De los siguientes compuestos químicos cual es sospechoso de producir retraso mental:

- A. Plomo.
- B. Metilmercurio.
- C. Cloruro de vinilo.
- D. Bifenilos policlorados.

Pregunta nº 34: Entre las normas básicas para el empleo de medicación en el embarazo, señale la respuesta correcta.

- A. Usar medicamentos de reciente aparición.
- B. Prescribir varios medicamentos a la vez.
- C. Utilizar la dosis máxima posible.
- D. Restringir el empleo de medicación en el primer trimestre.

Pregunta nº 35: El síndrome de Swyer es un defecto en la diferenciación sexual que se caracteriza por:

- A. Defecto con gónada doble, la mayoría de los casos es 46XX y por lo general existe útero.
- B. Disgenesia gonadal pura, el cariotipo puede ser 46XY, parecen mujeres pero no tienen menstruación y falta de ovarios.
- C. Tienen un cariotipo 45X, con baja estatura, pezones invertidos, anomalías cardíaca, renales y tórax en escudo entre otras malformaciones
- D. Se produce por la no disyunción de los homólogos XX, caracterizados por infertilidad, ginecomastia e hipoandrogenización.

Pregunta nº 36: La vitamina A en dosis elevadas es teratogénica por producir defectos en:

- A. En el tracto genital y del sistema nervioso central.
- B. Bocio neonatal.
- C. Anomalía cardíaca de Ebstein.
- D. Alteraciones oculares y auditivas.

Pregunta nº 37: A qué se denomina Meromelia:

- A. A la falta de un dedo, por lo general es unilateral.
- B. La falta parcial de la extremidad.
- C. Los segmentos de la extremidad están completos, pero por lo general son cortos.
- D. A la fusión anormal de los dedos.

Pregunta nº 38: ¿Qué fármaco tiene efecto teratogénico?

- A. Aciclovir.
- B. Antibióticos por vía tópica (clindamicina).
- C. Retinol a dosis altas.
- D. Levoriroxina.

Pregunta nº 39: La alta proporción de espermatozoides con morfología anormal en un seminograma se denomina:

- A. Teratozoospermia
- B. Necrozoospermia
- C. Oligospermia
- D. Astenozoospermia

Pregunta nº 40: De entre las siguientes situaciones, una de ellas no se considera contraindicación absoluta (categoría 4) según los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos hormonales combinados, señálala.

- A. Migrañas con aura, a cualquier edad
- B. Mujeres de más de 35 años, fumadoras de menos de 15 cigarrillos /día
- C. Mujeres lactantes con menos de 6 semanas posparto
- D. Adenoma hepatocelular benigno

Pregunta nº 41: Con respecto a la hormona antimülleriana (AMH) señala la respuesta correcta:

- A. Es un marcador tumoral utilizado ante la sospecha de cáncer de ovario
- B. Sus niveles fluctúan según el momento del ciclo en que se realice la determinación
- C. Niveles altos de dicha hormona sugieren una baja respuesta ovárica
- D. En mujeres afectadas de SOP (síndrome de ovario poliquístico), se observan niveles altos de hormona AMH.

8

Pregunta nº 42: Sobre la amniocentesis no es cierto que :

- A. Puede realizarse a partir de la semana 15-16 de gestación
- B. Se precisa conseguir la extracción de 50 ml de líquido amniótico
- C. el riesgo total de pérdida fetal es del 0,5 al 1%
- D. En mujeres RH negativas debe administrarse Inmunoglobulina anti D en las siguientes 72 horas

Pregunta nº 43: Para realizar el cribado combinado del primer trimestre se precisan los siguientes datos, excepto:

- A. Edad materna
- B. TN (traslucencia nuchal)
- C. Niveles de B-HCG totales en sangre materna.
- D. Niveles de PAPP-A (proteína plasmática asociada al embarazo)

Pregunta nº 44: En una de las siguientes situaciones no existe recomendación para realizar la valoración del estado de inmunidad frente al Trypanosoma Cruzi (Chagas) , indícala:

- A. Mujeres de origen latinoamericano
- B. Mujeres originarias del Caribe
- C. Mujeres cuyas madres sean latinoamericanas
- D. Mujeres de cualquier nacionalidad que hayan vivido más de un mes en Latinoamérica.

Pregunta nº 45: Con respecto a la determinación de la altura uterina (AU) en los controles de embarazo, indica la respuesta incorrecta.

- A. La AU depende de la estática fetal y características anatómicas de la gestante
- B. A las 12 semanas de gestación el fondo de útero sobrepasa el borde superior del pubis
- C. El ritmo de crecimiento de la AU hasta la semana 36 es de unos 2 cm /mes
- D. Alrededor de la semana 20 alcanza el nivel de ombligo.

Pregunta nº 46: Señala el cambio digestivo que no se asocia con el embarazo:

- A. Disminución de la acidez de la saliva
- B. Disminución de la motilidad intestinal
- C. Hiperemia de las encías
- D. Hipotonía de la vesícula biliar

9

Pregunta nº 47: De las siguientes recomendaciones sobre vacunas en el embarazo, señala la respuesta incorrecta

- A. Se recomienda la vacunación antigripal atenuada durante la temporada gripal a todas las gestantes independientemente del momento de la gestación
- B. A las gestantes no inmunes frente a rubeola recomendar vacunación posparto evitando nuevo embarazo en las 4 semanas siguientes a su administración
- C. Debe recomendarse la vacuna de hepatitis B a mujeres no inmunizadas si presentan factores de riesgo
- D. Se recomienda vacunar contra la tosferina en cada embarazo, independientemente del estado previo de vacunación de la gestante.

Pregunta nº 48: En una hiperemesis gravídica durante el 1º T que precisa, por su gravedad, ingreso hospitalario no está indicado administrar:

- A. Metoclopramida
- B. Ondansetron
- C. Suplementos de tiamina
- D. Ranitidina endovenosa

Pregunta nº 49: Según la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) el ciclo menstrual normal se caracteriza por:

- A. Intervalo 21-35 días
- B. Duración del sangrado 2-7 días
- C. Cantidad de sangrado 5-80 ml/ciclo
- D. Todas las respuestas son ciertas

Pregunta nº 50: Una de las definiciones siguientes no es correcta, indícala

- A. Se define como menopausia precoz cuando ocurre antes de los 45 años.
- B. Premenopausia es una etapa de entre 2-6 años, previa a la menopausia que puede cursar con sintomatología.
- C. Posmenopausia inmediata es el periodo que va desde la última menstruación hasta un año después.
- D. Se define como climaterio el período de la vida de la mujer que se extiende desde 2-8 años antes de la fecha de la menopausia hasta 2-6 años después de la última menstruación.

Pregunta nº 51: No es una ITS (infección de transmisión sexual) que precise declaración obligatoria individualizada (EDO)

- A. Sífilis congénita
- B. Trichomonas vaginalis
- C. Sífilis primaria
- D. Chlamydia trachomatis

10

Pregunta nº 52: El chancro sifilítico:

- A. Es una lesión de bordes planos
- B. Son úlceras dolorosas
- C. Suelen asociarse con adenopatías inguinales blandas y dolorosas
- D. Su curación es espontánea entre la 4ª y 6ª semana

Pregunta nº 53: No es un factor de prevención primaria del cáncer de ovario

- A. Lactancia materna prolongada
- B. Uso de gonadotropinas
- C. Ligadura de trompas
- D. Uso prolongado de anticonceptivos hormonales combinados

Pregunta nº 54: Con respecto al cáncer de cuello de útero señala la respuesta incorrecta

- A. Los genotipos 16 -18 del VPH son los causantes del 40 % de los cánceres de cuello de útero
- B. Más del 90 % de las infecciones por VPH son transitorias, por tanto, irrelevantes desde el punto de vista oncogénico
- C. Las mujeres mayores de 30 años presentan una disminución de la prevalencia, pero la persistencia de la infección es más elevada
- D. Más del 60 % de los cánceres de cuello de útero en nuestro país corresponden a mujeres sin cribado previo

Pregunta nº 55: La modificación de las mamas en las cuales se desarrollan múltiples y pequeñas papilas que se corresponden con glándulas sebáceas hipertrofiadas y que toman el nombre de Tubérculos de Montgomery se produce a partir del.

- A. 2º mes de embarazo
- B. 4º mes de embarazo
- C. 6º mes de embarazo
- D. 7º mes de embarazo

Pregunta nº 56: La ganancia de peso normal para una gestante con normopeso es:

- A. 5-8 kg
- B. 9-12 kg
- C. 11-15kg
- D. Ninguna es correcta

11

Pregunta nº 57: Decimos que hay proteinuria cuando se da la presencia de:

- A. 300 mg/dl en orina de 24 horas
- B. De 200 a 300 mg/dl en orina de 24 horas
- C. De 100 a 200 mg/dl en orina de 24 horas
- D. 80 mg/dl en orina de 24 horas

Pregunta nº 58: ¿Cuál de los siguientes factores no supone un riesgo para padecer diabetes gestacional?:

- A. Índice de masa corporal (IMC) > 30
- B. Macrosomía de la gestante al nacimiento
- C. Antecedentes familiares de diabetes
- D. Edad menor de 25 años

Pregunta nº 59: Durante el embarazo el objetivo es mantener la glucemia capilar entre

- A. 60-69 mg/dl sin cetonuria
- B. 110-120 mg/dl sin cetonuria
- C. 70-100 mg/dl sin cetonuria
- D. 120-130 mg/dl sin cetonuria

Pregunta nº 60: En el puerperio inmediato y durante los primeros días, el pulso de la mujer presenta tendencia a la:

- A. Taquicardia
- B. Bradicardia
- C. Arritmia
- D. Ninguna es correcta

Pregunta nº 61: ¿Qué efectos beneficiosos tiene la deambulaci3n tras el puerperio?

- A. Disminuye el riesgo de tromboflebitis
- B. Mejora el tr3nsito intestinal
- C. Favorece la eliminaci3n de l3quidos
- D. Todas las anteriores

Pregunta nº 62: De las siguientes actuaciones durante el parto en una mujer gestante con enfermedad cardiovascular, se3ale la respuesta incorrecta:

- A. La analgesia epidural se recomienda en los mismos criterios que una gestante sin patolog3a.
- B. Durante el trabajo de parto se recomienda mantener a la gestante en dec3bito lateral izquierdo.
- C. En el expulsivo se evitar3n los pujos maternos y se ayudar3 con extracci3n instrumental una vez que cumpla los criterios obst3tricos.
- D. Los m3todos mec3nicos (bal3n de Cook) son preferibles a los farmacol3gicos para lograr la maduraci3n cervical.

Pregunta nº 63: Un Registro cardiotocogr3fico con l3nea de base de 140 lpm, variabilidad 15 lpm y desaceleraciones variables de m3s de 1 min de duraci3n en el 50% de las contracciones durante 50 min, seg3n la gu3a del "National Institute for Health and Care Excellence" (NICE) 2017, es un registro:

- A. Tranquilizador
- B. No tranquilizador
- C. Patol3gico
- D. Dudoso

Pregunta nº 64: La complicación neonatal más frecuente en una distocia de hombros es:

- A. Encefalopatía hipóxico-isquémica
- B. Parálisis braquial transitoria
- C. Fracturas óseas
- D. Muerte perinatal

Pregunta nº 65: En el manejo intraparto del parto de nalgas, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), señale la respuesta incorrecta:

- A. Se debe procurar excluir una desproporción feto pélvica antes de iniciar la estimulación con oxitocina.
- B. La amniorrexis se iniciará con los mismos criterios que con la presentación cefálica.
- C. No hay evidencia científica de que el parto vaginal de nalgas sea una indicación o una contraindicación para la analgesia epidural.
- D. Se considera que el parto no progresa si la dilatación cervical se detiene durante 4 horas o más con dinámica uterina adecuada.

Pregunta nº 66: En un parto prolongado ¿cuál sería la medida que no está indicada?:

- A. Administración de oxitocina en hipodinamia antes de descartar una desproporción cefalopélvica
- B. Adecuada analgesia materna.
- C. Hidratación y aporte energético.
- D. Cambio de posición materna.

13

Pregunta nº 67: En un parto, las actuaciones terapéuticas indicadas ante una incoordinación uterina serían, excepto:

- A. Analgesia epidural
- B. Tranquilizantes
- C. Oxitocina a altas dosis.
- D. Analgésicos

Pregunta nº 68: Se denomina taquisistolia a la frecuencia de las contracciones en 10 minutos superiores a:

- A. Cuatro por 10 min.
- B. Cinco por 10 min.
- C. Seis por 10 min.
- D. Tres por 10 min.

Pregunta nº 69: De las siguientes actuaciones ante un prolapso de cordón ¿Cuál no está indicada?

- A. Colocar inmediatamente a la gestante en posición de AntiTrendelenburg.
- B. Tacto vaginal para comprobar el latido fetal y descompresión del cordón.
- C. Sin retirar la mano desplazar la presentación hacia arriba, si la presentación está libre y la frecuencia cardíaca fetal es normal se pueden retirar los dedos de la vagina.
- D. Perfusión IV de β -miméticos a dosis altas.

Pregunta nº 70: Respecto a la Eclampsia, señale la respuesta correcta:

- A. La cefalea fronto-occipital es un síntoma que aparece en el 20% de los casos.
- B. El Diazepam es de elección para la dosis de carga.
- C. La eclampsia provoca en la mayoría de los casos el Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.
- D. El 80% de los casos se presenta después del parto.

Pregunta nº 71: El fórceps cruzado con ramas divergentes, sin tractor y sin curvatura pélvica se denomina:

- A. Zweifel
- B. Naegele
- C. Simpson
- D. Kjelland

14

Pregunta nº 72: En un parto instrumental ¿qué instrumento actúa por pulsión o empuje desde arriba?

- A. Ventosa
- B. Fórceps de Naegele
- C. Fórceps de Piper
- D. Espátula

Pregunta nº 73: ¿Cuál no es un parámetro de maduración neuromuscular en el Test de Ballard?

- A. Sujeción de la cabeza
- B. Signo de la bufanda
- C. Rebote de brazos
- D. Talón oreja

Pregunta nº 74: De las siguientes lesiones cutáneas del recién nacido, indica cuál no es una lesión cutánea benigna transitoria:

- A. Miliaria rubra
- B. Mancha de Baltz
- C. Pigmentación cutánea moteada
- D. Eritema tóxico del recién nacido

Pregunta nº 75: Si el recién nacido a los 30 segundos presenta una frecuencia cardiaca de 40 lpm, ¿cuál es la actuación correcta?:

- A. Administración de adrenalina
- B. Iniciar compresiones torácicas
- C. Ventilar con presión positiva intermitente
- D. Intubación y comenzar con compresiones torácicas

Pregunta nº 76: Señale la respuesta correcta de las siguientes recomendaciones para la prevención y manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido:

- A. La exposición a la luz solar es una terapia segura y su uso está recomendado en recién nacidos.
- B. El primer abordaje para mitigar la hiperbilirrubinemia asociada a la lactancia materna es asegurar que esta se realice satisfactoriamente.
- C. Se recomienda que todo recién nacido dado de alta antes de las 24h de edad debería ser revisado a la semana en su centro de salud.
- D. Son eficaces los suplementos de agua o suero glucosado para la prevención de hiperbilirrubinemia en recién nacidos con lactancia materna exclusiva.

15

Pregunta nº 77: Las siguientes cardiopatías están clasificadas de clase IV, excepto una, señale la respuesta correcta.

- A. Hipertensión arterial pulmonar
- B. Prolapso mitral
- C. Estenosis mitral grave
- D. Síndrome de Marfan con dilatación de la raíz aórtica

Pregunta nº 78: Señale la respuesta correcta. En la patología neurológica crónica durante el embarazo, las dos enfermedades más frecuentes son:

- A. Epilepsia y migraña
- B. Migraña y esclerosis
- C. Mononeuropatías y migraña
- D. Todas son correctas

Pregunta nº 79: Durante el embarazo, las siguientes cardiopatías se han clasificado de riesgo alto, excepto:

- A. Estenosis aórtica grave
- B. Hipertensión arterial pulmonar
- C. Estenosis mitral grave
- D. Válvula aórtica bicúspide

Pregunta nº 80: En la etiopatogenia del aborto, no se encuentra:

- A. Miomas submucosos
- B. Sinequias intrauterinas
- C. Lupus eritematoso diseminado
- D. Producción insuficiente de estrógenos

Pregunta nº 81: Señale la respuesta correcta. En la neoplasia trofoblástica gestacional, el órgano donde aparecen metástasis con más frecuencia es:

- A. Pulmón
- B. Vejiga
- C. Mama
- D. Hueso

Pregunta nº 82: Señale la respuesta correcta. Una de las complicaciones del aborto diferido es la coagulación intravascular diseminada por el paso a la circulación sanguínea materna de:

- A. Tromboplastina
- B. Fibrinógeno
- C. Trombocitos
- D. Todas son correctas

16

Pregunta nº 83: Señale la respuesta correcta en cuanto a la técnica de elección para el diagnóstico de la placenta previa:

- A. Placentografía directa
- B. Placentografía indirecta
- C. Ecografía
- D. Todas son falsas

Pregunta nº 84: Dentro de las alteraciones de las membranas no se encuentra:

- A. Quistes del amnios.
- B. Corioangioma placentario.
- C. Despegamiento amniótico.
- D. Bridas amnióticas.

Pregunta n° 85: Señale la respuesta correcta. Entre los tumores metastásicos de la placenta, se encuentran:

- A. Melanoma maligno
- B. Sarcoma de Ewing.
- C. Corioangioma placentario
- D. A y B son correctas

Pregunta n° 86: Las siguientes opciones se encuentran dentro de la atención de la matrona en el embarazo prolongado excepto:

- A. En la sala de partos, en situaciones de líquido amniótico meconial, ante un recién nacido deprimido, el primer paso debe ser la estimulación para iniciar la primera inspiración.
- B. Indicar la importancia de realizar controles de bienestar fetal periódicos a partir de la semana 41.
- C. Explicar a la gestante la técnica elegida para finalizar la gestación y tranquilizarla ante los próximos acontecimientos.
- D. Permitir a la madre que escuche el latido fetal durante la vigilancia del control fetal a partir de semana 41 para disminuir la ansiedad de la madre.

Pregunta n° 87: Con respecto a la etiología más frecuente del embarazo prolongado, señale la respuesta correcta.

- A. Exceso de sulfatasa placentaria
- B. Fecha incorrecta del inicio de la gestación
- C. Sexo fetal femenino
- D. Índice de masa corporal materna inferior a 25

17

Pregunta n° 88: En la clínica fetal del embarazo prolongado no se encuentra:

- A. Deshidratación
- B. Piel seca y arrugada
- C. Tendencia a la hiperglucemia
- D. Mayor riesgo de líquido amniótico meconial

Pregunta n° 89: Con respecto al Crecimiento Intrauterino Restringido, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:

- A. El Crecimiento Intrauterino Restringido y el Recién Nacido Pequeño para la Edad Gestacional, normalmente tienen resultados perinatales similares.
- B. Los fetos con Crecimiento Intrauterino Restringido tienen más riesgo de deterioro fetal intraútero.
- C. Los fetos con Crecimiento Intrauterino Restringido se asocian con más riesgo de preeclampsia.
- D. La principal causa de Crecimiento Intrauterino Restringido es la restricción del crecimiento.

Pregunta nº 90: ¿Cuál de las siguientes causas no se asocia a la restricción del crecimiento fetal?:

- A. Alteraciones genéticas
- B. Infecciones
- C. Insuficiencia placentaria
- D. Diabetes gestacional

PREGUNTAS DE RESERVA

Pregunta nº 91: Señale el enunciado incorrecto.

- A. La tasa de mortalidad absoluta es el indicador que mejor identifica el nivel sanitario de un país.
- B. La mortalidad es uno de los elementos fundamentales que configuran la estructura de una población
- C. La tasa de mortalidad infantil es el indicador que mejor identifica el nivel sanitario de un país.
- D. La esperanza de vida es un indicador ligado a la mortalidad.

18

Pregunta nº 92: Las arterias uterinas emiten varias ramas, indique cuál no procede de ellas:

- A. La arteria ureteral.
- B. Las arterias arcuatas.
- C. La arteria tubárica externa.
- D. La arteria vesicovaginal.

Pregunta nº 93: Durante la fecundación la reacción cortical consiste en:

- A. La modificación de las proteínas de la superficie del espermatozoide.
- B. La acción de las enzimas del acrosoma.
- C. La acción de las enzimas producidas por las células foliculares.
- D. La acción de las enzimas producidas por el ovocito.

Pregunta nº 94: Los ojos derivan de cuatro fuentes, cite de cual se deriva la retina, las capas posteriores del iris y el nervio óptico:

- A. Del ectodermo superficial de la cabeza.
- B. Del neuroectodermo del cerebro anterior.
- C. De las células de la cresta neural.
- D. Del mesodermo comprendido entre estas capas.

Pregunta nº 95: Ante la toma de fármacos inductores del citocromo P-450 en mujeres usuarias de anticoncepción hormonal combinada se debe recomendar:

- A. Protección alternativa durante el tiempo de duración del tratamiento
- B. Protección alternativa hasta una semana después de haber finalizado el tratamiento
- C. Protección alternativa hasta 28 días después de haber finalizado el tratamiento
- D. Los inductores del citocromo P450 no alteran la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados

Pregunta nº 96: Uno de los siguientes cuestionarios no es específico para valorar la calidad de vida de la mujer durante el climaterio y menopausia , señálelo.

- A. Escala Cervantes
- B. Escala MENCAV
- C. Escala Edimburgo
- D. Índice de Kupperman

Pregunta nº 97: ¿Cuándo es necesario administrar la Ig Anti-D en una mujer Rh negativa?

- A. Padre Rh negativo
- B. Dentro de las 72h postparto en un recién nacido (RN) Rh Negativo
- C. Coombs indirecto positivo
- D. En ninguna de las anteriores es necesario administrarla

19

Pregunta nº 98: En el parto en presentación podálica la maniobra de Müller se emplea para:

- A. Desprendimiento de los hombros.
- B. Desprendimiento de las nalgas.
- C. Extracción de la cabeza última encajada.
- D. Extracción de los hombros y la cabeza conjuntamente.

Pregunta nº 99: Al nacimiento un recién nacido presenta una frecuencia cardiaca de 80 lpm, una respiración lenta e irregular, cierta flexión de extremidades, respuesta refleja ausente y color pálido ¿Qué puntuación del test de Apgar le corresponde?

- A. Dos puntos
- B. Tres puntos
- C. Cuatro puntos
- D. Un punto

