



Calendario recomendado año 2026

CONDICIONES DE RIESGO*

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN	Inmuno depresión (ID)	Infección por VIH ID grave (CD4 según edad) ID no grave (CD4 según edad)	Asplenia, déficits o inhibidores del complemento	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónicas	Enfermedad hepática crónica	Fístula de LCR Implante coclear	Prematuros
Difteria, tétanos, tosferina								
<i>Haemophilus influenzae b</i>		Hib	Hib					
Sarampión, rubeola, parotiditis	Contraindicada				TV si susceptible			
Hepatitis B					HB			
Hepatitis A		HA					HA	
Enfermedad meningocócica		MenACWY	MenACWY MenB					
Varicela	Contraindicada				VVZ si susceptible			
Virus del Papiloma Humano		VPH						
Enfermedad neumocócica			** VN					
Rotavirus								Rotavirus
Gripe					Gripe estacional			
COVID-19					COVID-19			
Virus Respiratorio Sincitial	VRS					VRS		VRS

* Se incluyen las condiciones más frecuentes en las que se recomiendan específicamente más vacunas. Para patologías concretas consultar las recomendaciones correspondientes.

Recomendación específica por patología o condición Contraindicada

Recomendación general

No recomendada

Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 12 de diciembre de 2025



Difteria, tétanos, tosferina (DTPa, dTpa, Td)

Información general:

Verificar el estado de vacunación previo y, en caso necesario, se vacunará hasta completar pauta para su edad

Población con condiciones de riesgo:

- Inmunodepresión.
- Infección por VIH.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, deficiencias del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis.
- Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica.
- Enfermedad hepática crónica.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear.
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Información general:

Se administrará 1 dosis única de vacuna conjugada Hib independientemente de la vacunación anterior.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, déficits del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Menores de diez años tras padecer una enfermedad invasora, independientemente del status vacunal previo.
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica-TV)

Información general:

Verificar el estado de vacunación previo y, en caso necesario, se vacunará hasta completar pauta. En personas que no se hayan vacunado con anterioridad se administrarán 2 dosis de TV, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad, se administrará solo 1 dosis de TV.

Está **contraindicada** la vacunación de embarazadas, personas con inmunosupresión e infección por VIH en función de CD4 según edad.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH en función de CD4 según edad.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, deficiencias del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis.
- Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica.
- Enfermedad hepática crónica.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear.

Hepatitis B (HB)

Información general:

Verificar el estado de vacunación previo. En personas no vacunadas con anterioridad, se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH: En caso de no responder a primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo adulto (pauta 0, 1, 6 meses).
- Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis: Se utilizará vacuna de alta carga antigenética (20µg/0,5ml) o específica para diálisis y predialisis (si ≥15 años) en personas no vacunadas con anterioridad. Revisión serológica y revacunación cuando sea necesario.
- Enfermedad hepática crónica.
- Trasplante (de órgano sólido o hematopoyético) o en espera de TOS.

Hepatitis A (HA)

Información general:

Se administrará 1 dosis y otra de recuerdo a partir de los 6 meses. No es necesario realizar marcadores pre vacunación ni post vacunación.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH.
- Enfermedad hepática crónica.
- Trasplantados o en espera de trasplante hepático (serología posvacunal si TOS).

Las pautas de vacunación específicas para cada grupo de riesgo se detallan en el documento de recomendaciones correspondiente.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN ESPECÍFICA EN **MENORES Y ADOLESCENTES (<18 AÑOS)** CON CONDICIONES DE RIESGO

Calendario recomendado año 2026

Enfermedad meningocócica (MenACWY y MenB)

Información general:

MenACWY: 2 dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Se administrará dosis de recuerdo a los 5 años desde la última dosis, salvo en caso de infección por VIH que el recuerdo será a los 12 años de edad como en población general. Valorar necesidad dosis de recuerdo posteriores.

MenB: 2 dosis, con un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas. Se administrará 1 dosis de recuerdo 1 año después de completar la vacunación primaria y, posteriormente, 1 dosis de recuerdo cada 5 años.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH: solo MenACWY.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, déficits del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
- Padecimiento anterior de enfermedad meningocócica invasiva, independientemente del serogrupo causante: no se recomienda dosis de recuerdo.

Varicela (VVZ)

Información general:

En adolescentes que no refieran antecedentes de haber pasado la enfermedad y no se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis de VVZ separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas, o se completará pauta si se ha recibido 1 sola dosis con anterioridad.

Está **contraindicada** la vacunación de embarazadas, personas con inmunosupresión e infección por VIH en función de CD4 según edad.

Población con condiciones de riesgo:

- Infección por VIH en función de CD4 según edad.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, déficits del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis.
- Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica.
- Enfermedad hepática crónica.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Información general:

Se administrarán 3 dosis (0, 1-2, ≥6 meses), tanto en hombres como en mujeres. Captación de no vacunados hasta los 18 años (incluidos) con pauta de 1 dosis.

Población con condiciones de riesgo:

- Trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos.
- Infección por VIH.
- Síndrome WHIM (IDP): vacuna que cubra tipos 6 y 11.
- Mujeres que hayan recibido con cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN2+).
- Adolescentes hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: solo 1 dosis.

Enfermedad neumocócica (VN)

Información general:

Valorar pauta secuencial según vacunas utilizadas.

Población con condiciones de riesgo:

- Inmunodepresión.
- Infección por VIH.
- Asplenia o disfunción esplénica grave, déficits del complemento o tratamiento con inhibidores del complemento.
- Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis.
- Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica.
- Enfermedad hepática crónica.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear.

Rotavirus (RV)

Información general:

Se recomienda la vacunación frente a rotavirus en lactantes nacidos entre la semana 25-27 (según la vacuna utilizada) y semana 32 de gestación, clínicamente estables y sin contraindicaciones. La vacunación se realizará a partir de las 6 semanas de vida según la edad cronológica y siguiendo las pautas autorizadas para cada vacuna.

En los lactantes con edad gestacional inferior a la que figura en las fichas técnicas (≥25 semanas en RV5; ≥27 semanas en RV1), se podrá administrar cualquiera de las dos vacunas a las 6 semanas de vida contando con el consentimiento informado de los progenitores o tutores legales.

Población con condiciones de riesgo:

Prematuros.

Las pautas de vacunación específicas para cada grupo de riesgo se detallan en el documento de recomendaciones correspondiente.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN ESPECÍFICA EN **MENORES Y ADOLESCENTES (<18 AÑOS)** CON CONDICIONES DE RIESGO

Calendario recomendado año 2026

Gripe

Información general:

Se administrará 1 dosis estacional, salvo en menores de 9 años sin antecedentes de vacunación, en los que se administrarán 2 dosis, separadas al menos 4 semanas.

La vacuna atenuada intranasal está contraindicada en menores de 2 años, en personas con inmunosupresión y en menores de 18 años que reciben tratamiento con salicilato.

Población con condiciones de riesgo:

- Prematuros: En prematuros de menos de 32 semanas de gestación, vacuna inactivada de gripe anual entre los 6 y 24 meses de edad. Administrar 2 dosis la primera vez que se vacune, con intervalo mínimo de 4 semanas. Vacunaciones posteriores, 1 dosis.
- Personas a partir de 5 años con las patologías de riesgo indicadas en el documento de recomendaciones.
- Personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad o residentes en instituciones cerradas.
- Personas de 5-18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.
- Personas convivientes con aquellas con condiciones de riesgo y menores de 6 meses.

COVID-19

Información general:

Se administrará 1 dosis estacional salvo en menores de 5 años con condiciones de riesgo que no hayan pasado la enfermedad o no hayan sido vacunados con anterioridad, en los que se administrará 3 dosis. En ≥6 meses con alto grado de inmunosupresión se puede requerir la administración de una dosis adicional. Ver documento de recomendaciones.

Población con condiciones de riesgo:

- Personas a partir de 6 meses con especial vulnerabilidad (ID, infección VIH, receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento).
- Personas internas en centros de discapacidad o residentes en instituciones cerradas.
- Personas a partir de 12 años con las patologías de riesgo indicadas en el documento de recomendaciones.
- Personas de entre 6 meses y 11 años con las siguientes condiciones de riesgo:
 - Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
 - Trasplante de órgano sólido.
 - Inmunodeficiencias primarias y adquiridas.
 - Algunas terapias inmunosupresoras (ver Anexo 1 del documento de recomendaciones).
 - Enfermedades crónicas graves (cardiovasculares, respiratorias incluyendo asma, neurológicas o neuromusculares).

Las pautas de vacunación específicas para cada grupo de riesgo se detallan en el documento de recomendaciones correspondiente.

Podrán tener acceso a la vacunación como medida de protección personal:

- Personas convivientes con aquellas con condiciones de riesgo.

Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

Información general:

Inmunización con anticuerpo monoclonal. Posología según ficha técnica del producto utilizado.

Población con condiciones de riesgo:

- Prematuros de menos de 35 semanas de edad gestacional, hasta 12 meses.
- Población infantil menor de 24 meses con las siguientes condiciones de alto riesgo de enfermedad grave por VRS:
 - Cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa cianosantes o no cianosantes.
 - Displasia broncopulmonar.
 - Cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar.
 - Otras patologías de base que suponen un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave por VRS: inmunodepresión grave (enfermedades oncohematológicas; inmunodeficiencias primarias, sobre todo combinadas y agammaglobulinemia congénita; tratamiento con inmunosupresores de forma continuada), errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes, síndrome de Down, fibrosis quística, malformaciones esofágicas y cuidados paliativos.

Más información

Calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida:

<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/home.htm>

Documentos técnicos:

<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/comoTrabajamos/documentos-tecnicos.htm>

Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones:

<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/home.htm>

Documento de recomendaciones de vacunación gripe y COVID-19:

https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/home.htm