

















































 Prenatal (embarazadas)	 0 meses	2 meses 	3 meses 	4 meses 	6 meses 	11 meses 	12 meses 
<div style="text-align: center;">  <p>COVID GRIPE</p> <p>Según campaña</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TRIAXIS</p> <p>dTpa tétanos, difteria, tosferina</p>  <p>(25mm)</p> <p>Preferentemente semana 27 a 28</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>ESTACIONAL</p>  <p>Beyfortus™ (nirsevimab-afgi) injection < 5kg</p> <p>Beyfortus™ (nirsevimab-afgi) injection > 5kg</p>  <p>(16mm)</p> <p>AcVRS</p> <p>Anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>RotaTeq RV rotavirus</p> <p>+</p> <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p>  <p>(25/16mm)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>RotaTeq RV rotavirus</p>  </div>	<div style="text-align: center;">  <p>RotaTeq RV rotavirus</p> <p>+</p> <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p>  <p>(25mm)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Prevenar 20® suspensión inyectable / suspensión líquida</p> <p>VNC20 Neumocócica conjugada 20 Valente</p>  <p>(25mm)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>GRIPE</p> <p>Según campaña</p>  <p>Vaxelis HEXAVALENTE Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemophilus influenzae b</p>  <p>(25mm)</p> </div>	
<p style="text-align: center;">De 6 a 23 meses</p>							
<p style="text-align: center;">Vacunación frente a Gripe según rango de edad. <u>Estacional</u></p>							
<p style="text-align: center;">Vacunación frente a Covid según rango de edad. <u>Estacional</u></p>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>RECONSTITUIR</p>  Administración vía intramuscular región deltoidea.</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía subcutánea cara externa/posterior del tríceps</div> <div style="width: 20%;"> <p>JERINGA PRECARGADA</p>  Administración vía intramuscular región deltoidea</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía intramuscular vasto externo del muslo</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía oral</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía Intranasal (ambas fosas nasales)</div> </div> <div style="width: 80%;"> <div style="text-align: center;">  <p>VNC20 Neumocócica conjugada 20 Valente</p>  <p>(25/16mm)</p> <p>+</p>  <p>BEXSERO Meningococo B</p>  <p>(25/16mm)</p> </div> </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>RECONSTITUIR</p>  Administración vía intramuscular región deltoidea.</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía subcutánea cara externa/posterior del tríceps</div> <div style="width: 20%;"> <p>JERINGA PRECARGADA</p>  Administración vía intramuscular región deltoidea</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p>  Administración vía intramuscular vasto externo del muslo</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p> Administración vía oral</div> <div style="width: 20%;"> <p>VIA ORAL</p> Administración vía Intranasal (ambas fosas nasales)</div> </div> <div style="width: 80%;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prevenar 20® suspensión inyectable / suspensión líquida</p> <p>VNC20 Neumocócica conjugada 20 Valente</p>  <p>(25mm)</p> <p>+</p>  <p>BEXSERO Meningococo B</p>  <p>(25mm)</p> <p>+</p>  <p>Nimerix Meningococo ACYW</p>  <p>(25mm)</p> </div> </div>							
<div style="text-align: center;">  <p>MARVaxPro</p> <p>SRP (Triple Vírica) Sarapión, Rubéola, Parotiditis</p>  <p>(16mm)</p> <p>+</p>  <p>BEXSERO Meningococo B</p>  <p>(25mm)</p> <p>+</p>  <p>Nimerix Meningococo ACYW</p>  <p>(25mm)</p> </div>							

De 1 a 2 años el lugar de administración dependiendo de la masa muscular

1.VRS. Nacidos desde el 1 de abril del año en curso hasta el 31 de marzo del año siguiente en su primera temporada. Estacional.

