

¿Qué efectos secundarios tiene esta vacuna?

La vacuna de la varicela es bien tolerada. Los efectos secundarios son escasos y en general leves. Algunas personas pueden experimentar enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección y a veces puede aparecer un sarpullido leve, entre una y tres semanas después de recibir la vacuna.

¿Cómo se administra la vacuna?

La vacuna se administra mediante una inyección subcutánea en el tercio medio del brazo. Se debe recibir dos dosis de vacuna separadas al menos por un mes.

¿Dónde vacunarse?

La vacuna se administra en el centro de salud o punto de vacunación habitual.

Para más información:

Pueden obtener más información en su centro de salud, Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de su provincia o en

www.sanidad.jcyl.es/vacunaciones

Vacunación frente a la Varicela

si estás en
de primaria **6º**

Vacunación frente a la Varicela

¿Qué es la varicela?

La varicela es una de las enfermedades infantiles exantemáticas más comunes. Está producida por el virus varicela zóster.

Generalmente en niños sanos es una enfermedad leve, incómoda pero no peligrosa.

La mayor parte de las personas contraen la enfermedad durante la infancia, adquiriendo defensas para toda la vida.

¿Por qué vacunarse?

Cuando la varicela no se ha pasado durante la infancia y se padece en la adolescencia o la edad adulta, el riesgo de complicaciones y hospitalización es mayor.

¿Quién se debe vacunar de varicela?

Se recomienda la vacunación de los niños/as de 11 años o que cursen 6° de Educación Primaria, que no hayan pasado esta enfermedad y no hayan recibido esta vacuna con anterioridad.

¿Tiene alguna contraindicación la vacuna?

Esta vacuna no debe administrarse en los siguientes casos:

- Personas con **alergia** a la gelatina o a la neomicina.
- En el caso de los niños con **sistema inmunológico deprimido** (debido a una enfermedad tal como cáncer o infección de VIH, o que siguen tratamiento con esteroides), se debe realizar una evaluación médica antes de administrar esta vacuna.
- Si ha recibido recientemente una **transfusión o algún producto sanguíneo** tendrá que esperar varios meses antes de recibir la vacuna.
- En caso de sufrir una **enfermedad aguda moderada o severa** deberá posponer su administración hasta que se haya recuperado. La vacuna no debe administrarse en caso de estar embarazada.

En cualquiera de estas circunstancias consulta con tu médico.

¿Es eficaz esta vacuna?

Sí, aunque no de forma absoluta. La mayoría de las personas vacunadas no contraen la varicela, aunque en algunos casos pueden pasar la enfermedad de forma más leve.

si estás en
de primaria **6°**

