

SEGURIDAD DEL PACIENTE VACUNACIÓN COVID-19



Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) Presentación adultos (≥12 años). Tapón morado

Diluir con 1,8 ml de suero fisiológico 0,9%

Contenido tras la dilución: 6 dosis de 0,3 ml

Pauta de vacunación

Primovacunación: 2 dosis separadas 21 días (intervalo mínimo 19 días)

Dosis adicional si inmunosupresión severa (al menos 28 días tras 2ª dosis)

Dosis de recuerdo: separación mínima tras completar primovacunación:
5 meses (vacuna ARNm) / 3 meses (vacuna adenovirus)

Conservación

Vial sin diluir: 30 días (2-8 °C) / 2 horas (temperatura ambiente: 8-30 °C)

Vial diluido/jeringa: 6 horas



Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) Presentación pediátrica (5-11 años). Tapón naranja

Diluir con 1,3 ml de suero fisiológico 0,9%

Contenido tras la dilución: 10 dosis de 0,2 ml

Pauta de vacunación

Primovacunación: 2 dosis separadas 8 semanas


Dosis adicional si inmunosupresión severa (al menos 8 semanas tras 2ª dosis)

Conservación

Vial sin diluir: 10 semanas (2-8 °C) / 12 horas (temperatura ambiente: 8-30 °C)

Vial diluido/jeringa: 12 horas

→ Mantener siempre SEPARADOS viales sin diluir y diluidos



Spikevax® (Moderna)

No Diluir

Contenido: 5 ml

Pauta de vacunación

Primovacunación: ≥ 12 años: 2 dosis (0,5 ml cada una) separadas 28 días (intervalo mínimo 25 días)

6-11 años: 2 dosis (0,25 ml cada una) separadas 8 semanas

Dosis adicional si inmunosupresión severa (≥ 12 años: 0,5 ml al menos 28 días tras 2ª dosis;

6-11 años: 0,25 ml al menos 8 semanas tras 2ª dosis)

Dosis recuerdo (0,25 ml) en ≥ 12 años: separación mínima tras completar primovacunación:

5 meses (vacuna ARNm) / 3 meses (vacuna adenovirus)

Conservación

Vial sin perforar: 30 días (2-8 °C) / 24 horas (temperatura ambiente: 8-25 °C)

Vial perforado/jeringa: 19 horas

→ NO utilizar SIMULTÁNEAMENTE viales de diferentes presentaciones o marcas de vacunas