


Red de Médicos Centinelas de Castilla y León



Datos referidos
a las semanas
44 a 52 de 1989
y 1 al 15 de 1990



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Cultura y Bienestar Social

INTRODUCCION

Dentro del Sistema de Información Sanitaria, el Sistema de la Red de Médicos Centinelas de Castilla y León es un método de registro de enfermedades o de Problemas de Salud basado en la Atención Primaria. Esta Red Regional que cubre aproximadamente el ocho por ciento de la población castellano leonesa, de la que se extraen los datos y a la cual se van a extrapolar los resultados, comenzó su andadura en el mes de Mayo de 1989, hace ahora un año, con el registro de cinco problemas considerados importantes en nuestra Región. Después de un periodo de prueba de seis meses, en Noviembre de 1989, se inició el registro continuo y definitivo.

Este segundo informe trimestral (primero que se publica impreso) presenta los resultados más importantes obtenidos prácticamente en seis meses de recogida de datos, desde el 30 de Octubre de 1989 al 14 de Abril de 1990, según unos patrones de explotación periódica previamente definidos y utilizados para la información de retroceso.

En Junio de este año aparecerá una novedad en la Red Regional. Por primera vez un grupo de 46 pediatras extrahospitalarios registrarán, junto a los 145 médicos generales o de familia de Atención Primaria, tres problemas de Salud: Sarampión, Parotiditis y demanda de Test VIH, en un proyecto de colaboración con la red europea EUROSENTINEL.

Estos sistemas de registros de patologías de naturaleza infecciosa o no infecciosa representan un avance cuantitativo y sobre todo cualitativo en la obtención de información sanitaria hasta ahora no disponible de manera sistemática. Las posibilidades que ofrece van desde la estimación de la incidencia de los problemas de salud de una manera más precisa, hasta ofrecer una visión de la distribución de la enfermedad por sexo, edad y otras variables sociodemográficas, así como de factores de riesgo y consecuencias en la población. La información generada por este sistema será utilizada en las actividades de Educación para la Salud, en los cambios de los estilos de vida, en la disminución de riesgos, etc., de los futuros Programas Sanitarios.

Como podrá apreciarse a continuación, el volumen de datos generados, la flexibilidad de su manipulación y la cantidad de conclusiones que de ellos se puede extraer justifican sobradamente los esfuerzos de todos los epidemiólogos, técnicos de salud, médicos de Atención Primaria, pediatras, etc., que trabajamos para mantener y mejorar la Red de Médicos Centinelas de Castilla y León.

JOSÉ LUIS USEROS FERNÁNDEZ

*Director General de Salud
Pública y Asistencia*

1. Declaraciones Semanales

El número de fichas enviadas por los médicos centinelas oscila entre 110 y 139 por semana lo que nos sitúa en un porcentaje entre 78,57% y 99,28%. Por provincias, los resultados no difieren de los encontrados para el conjunto de la red.

TABLA 1.1
Número de declaraciones por semana
en el conjunto de la red.
1989

NUMERO DE LA SEMANA	
44	125
45	125
46	124
47	126
48	122
49	119
50	121
51	113
52	110

1990

NUMERO DE LA SEMANA	
1	121
2	122
3	120
4	118
5	120
6	128
7	126
8	130
9	139
10	132
11	137
12	129
13	129
14	124
15	118
NO CONSIGNADA	3

TABLA 1.2

Número de declaraciones semanales por provincia

	PROVINCIA									
	NO CONSIGNADA	AVILA	BURGOS	LEON	PALENCIA	SALAMANCA	SEGOVIA	SORIA	VALLADOLID	ZAMORA
	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones	Declaraciones
1989										
NUMERO DE LA SEMANA										
44		8	16	25	9	24	6	9	23	5
45		8	17	25	8	24	6	8	23	6
46		8	17	23	8	25	6	9	22	6
47		8	19	22	8	24	6	9	23	7
48		7	18	24	6	23	4	9	23	8
49		7	17	24	5	24	5	9	22	6
50		8	16	25	5	24	5	9	23	6
51		7	16	20	5	24	4	8	22	7
52		7	17	18	5	25	4	6	21	7
1990										
NUMERO DE LA SEMANA										
1		8	18	23	7	23	5	8	21	8
2		10	17	24	6	24	5	8	20	8
3		10	14	24	7	24	4	8	21	8
4		10	16	23	8	24	4	7	19	7
5		9	17	23	8	23	5	8	19	8
6		10	16	25	7	23	6	9	24	8
7		11	15	24	7	24	6	9	22	8
8		10	17	21	5	24	6	18	21	8
9		11	17	27	8	24	6	18	20	8
10		11	15	25	8	24	5	16	20	8
11		11	17	28	8	24	6	16	19	8
12		11	17	28	7	24	5	9	20	8
13		10	17	29	7	24	5	9	20	8
14	1	11	15	27	7	24	5	9	17	8
15	2	9	13	30	7	22	4	8	17	8
NO CONSIGNADA						1				

2. Accidentes cerebrovasculares

El número de accidentes cerebrovasculares declarados, 270, no presenta, en estas 24 semanas, una tendencia definida, y las diferencias encontradas podrían deberse única y exclusivamente a la variación en el número de fichas de registro enviadas.

Existe una mayor proporción de mujeres que de hombres que sufren un accidente cerebrovascular y la media de edad es también ligeramente superior en aquellas que en éstos.

La mayor proporción por grupos de edad se da en el intervalo de 80 a 89 años (43,6%), tanto para los ACV como para los ICT.

El síntoma deficitario más frecuente es el de los trastornos de la palabra, seguido de los trastornos de la conciencia y la paresia.

Entre los posibles factores de riesgo, el más señalado fue la presencia de hipertensión, 111 casos, muy por encima del segundo considerado, cardiopatías, con 65 casos.

Del total de casos registrados, el 58,5% permanecían en su domicilio a las 24 horas y sólo el 12,2% habían fallecido en ese intervalo de tiempo.

TABLA 2.1
Frecuencia de accidentes cerebrovasculares declarados por semana

NUMERO DE LA SEMANA	
1989	
44	14
45	13
46	13
47	21
48	11
49	3
50	7
51	7
52	6
1990	
1	10
2	21
3	14
4	12
5	12
6	20
7	6
8	13
9	12
10	9
11	16
12	9
13	7
14	8
15	6

TABLA 2.2

Distribución de los accidentes cerebrovasculares por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
SEXO				
NO CONSIGNADO	13	4.8%	77	9
MUJERES	133	49.3%	79	12
VARONES	124	45.9%	76	10
TOTAL	270	100.0%	78	11

TABLA 2.3

Frecuencia de accidentes cerebrovasculares por grupos de edad y tipo

	TIPO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR						TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		ACV		ICT			
GRUPOS DE EDAD								
49			3	2.1%	1	0.8%	4	1.5%
50-59			2	1.4%	5	4.2%	7	2.6%
60-69			16	11.2%	19	16.0%	35	13.2%
70-79	1	25.0%	43	30.1%	40	33.6%	84	31.6%
80-89	2	50.0%	67	46.9%	47	39.5%	116	43.6%
90 y más	1	25.0%	12	8.4%	7	5.9%	20	7.5%
TOTAL COLUMNA	4	100.0%	143	100.0%	119	100.0%	266	100.0%

ACV: Accidente cerebrovascular de más de 24 horas de evolución.

ICT: Insuficiencia cerebral transitoria.

TABLA 2.4

Frecuencia absoluta de cada uno de los síntomas deficitarios

	CASOS
PARALISIS	101
PAREZIA	116
TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA	165
TRASTORNOS DE LA PALABRA	181
INCONTINENCIA DE ESFINTERES	72
OTROS SINTOMAS DEFICITARIOS	32
NINGUNO	6

TABLA 2.5

Frecuencia de casos según el número de síntomas deficitarios

SINTOMAS DEFICITARIOS	CASOS	PORCENTAJE
NINGUNO	5	1.9%
UNO	64	23.7%
DOS	78	28.9%
TRES	71	26.3%
CUATRO	33	12.2%
CINCO	12	4.4%
MAS DE CINCO	7	2.6%
TOTAL	270	100.0%

TABLA 2.6
Frecuencia absoluta de los factores de riesgo
preexistentes

	CASOS
HIPERTENSION	111
HIPERLIPIDEMIA	38
DIABETES	31
TABAQUISMO	41
CARDIOPATIA	65
VASCULOPATIA	30
OTROS	37

TABLA 2.7
Frecuencia de casos según el número de factores de riesgo
preexistentes

FACTORES DE RIESGO PREEXISTENTES	CASOS	PORCENTAJE
NINGUNO	45	16.7%
UNO	129	47.8%
DOS	68	25.2%
TRES	24	8.9%
CUATRO	4	1.5%
TOTAL	270	100.0%

TABLA 2.8
Situación después de 24 horas

SITUACION DESPUES DE 24 HORAS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	7	2.6%
PACIENTE EN DOMICILIO	158	58.5%
PACIENTE EN HOSPITAL	70	25.9%
FALLECIDO	33	12.2%
DESCONOCIDO	2	0.7%
TOTAL	270	100.0%

3. Accidentes domésticos y peridomésticos

En las 24 semanas de registro se han declarado 930 accidentes domésticos que se distribuyen de manera homogénea en el tiempo.

La mayor frecuencia aparece en mujeres (55,1%) y con una edad media, 48 años, mayor también que la de los varones, 34 años.

Por grupos de edad se observa una bimodalidad en los intervalos de 0 a 19 y de 50 a 79 años.

Las lesiones más frecuentes se producen en las extremidades superiores (411 casos), prácticamente el doble de las producidas en las extremidades inferiores y las de cabeza o cuello.

Por causas, la más frecuente es la de las caídas con el 43,7% seguida de los accidentes ocasionados por objetos cortantes y punzantes 20,6% y los de fuego y líquidos calientes 15,6%.

El 80,8% fueron atendidos en consulta general o ambulatorios y sólo el 12,3% necesitaron hospitalización.

Siete casos, el 0,8%, fallecieron como consecuencia del accidente.

TABLA 3.1
Frecuencia de accidentes domésticos
declarados por semana

NUMERO DE LA SEMANA	
1989	
44	53
45	47
46	37
47	42
48	32
49	38
50	43
51	23
52	28
1990	
1	26
2	41
3	45
4	44
5	45
6	41
7	36
8	34
9	38
10	48
11	42
12	46
13	44
14	40
15	17

TABLA 3.2

Distribución de los accidentes domésticos por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
SEXO				
NO CONSIGNADO	49	5.3%	33	27
MUJERES	512	55.1%	48	24
VARONES	369	39.7%	34	25
TOTAL	930	100.0%	42	26

TABLA 3.3

Frecuencia de accidentes domésticos por grupos de edad

GRUPOS DE EDAD	CASOS	PORCENTAJE
9	130	14.0%
10-19	139	14.9%
20-29	76	8.2%
30-39	87	9.4%
40-49	92	9.9%
50-59	111	11.9%
60-69	143	15.4%
70-79	98	10.5%
80-89	45	4.8%
90 y más	8	0.9%
NO CONSIGNADO	1	0.1%
TOTAL COLUMNA	930	100.0%

TABLA 3.4

Frecuencia absoluta de la localización de los accidentes domésticos

	CASOS
LESIONES INTERNAS	17
EN CABEZA O CUELLO	192
EN ABDOMEN	13
EN TORAX	74
EXTREMIDADES SUPERIORES	411
EXTREMIDADES INFERIORES	254

TABLA 3.5

Frecuencia absoluta de accidentes domésticos según el tipo

	CASOS
DOMESTICO	473
PERIDOMESTICO	264

TABLA 3.6
Frecuencia de las causas de los accidentes domésticos por sexo

	SEXO								TOTAL FILA	
	DESCONOCIDO		MUJERES		VARONES		CASOS	PORCENTAJE %	CASOS	PORCENTAJE %
	CASOS	PORCENTAJE	CASOS	PORCENTAJE	CASOS	PORCENTAJE				
CAUSA										
NO CONSIGNADO	1	2.0%	6	1.2%	10	2.7%	17	1.8%		
MEDICAMENTOS O DRO- GAS			2	0.4%	2	0.5%	4	0.4%		
PRODUCTOS DEL HOGAR: DETERGENTES, PESTICI- DAS, ETC.	1	2.0%	9	1.8%	5	1.4%	15	1.6%		
CO, HUMOS, GASES			7	1.4%	4	1.1%	11	1.2%		
CORROSIVOS			4	0.8%	4	1.1%	8	0.9%		
FUEGO Y LIQUIDOS CA- LIENTES	9	18.4%	96	18.8%	40	10.8%	145	15.6%		
ELECTRICIDAD	1	2.0%	2	0.4%	1	0.3%	4	0.4%		
CAIDAS	19	38.8%	245	47.9%	142	38.5%	406	43.7%		
OBJETOS CORTANTES Y PUNZANTES	11	22.4%	83	16.2%	98	26.6%	192	20.6%		
JUGUETES	3	6.1%	1	0.2%	3	0.8%	7	0.8%		
ANIMALES DOMESTICOS OTROS	4	8.2%	22	4.3%	21	5.7%	43	4.6%		
DESCONOCIDA			30	5.9%	36	9.8%	70	7.5%		
			5	1.0%	3	0.8%	8	0.9%		
TOTAL COLUMNA	49	100.0%	512	100.0%	369	100.0%	930	100.0%		

TABLA 3.7
Frecuencia absoluta y porcentaje de
los accidentes domésticos según el lugar de tratamiento

LUGAR DE TRATAMIENTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	65	7.0%
EN CONSULTA GENERAL O AMBU- LATORIO	751	80.8%
EN HOSPITAL	114	12.3%
TOTAL COLUMNA	930	100.0%

TABLA 3.8
Frecuencia absoluta y porcentaje de
los accidentes domésticos según el desenlace

FALLECIMIENTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	294	31.6%
SI	7	0.8%
NO	629	67.6%
TOTAL COLUMNA	930	100.0%

4. Herpes Zóster

Los 338 casos declarados, 56,8% en mujeres y 40,5% en varones, no muestran una distribución temporal característica.

La localización más frecuente fue en el tórax, 156 casos, seguida del abdomen con 50. Es de señalar los 22 casos de Herpes Zóster oftálmico.

El 10,7% de los casos se asociaban con algún tipo de patología, siendo la tumoral de 2,7%.

Los antecedentes de varicela se pudieron demostrar sólo en el 6,8% de los registros.

TABLA 4.1
Frecuencia de Herpes Zóster declarados por semana

NUMERO DE LA SEMANA		NUMERO DE LA SEMANA	
1989		1990	
44	14	1	9
45	11	2	16
46	12	3	14
47	16	4	10
48	18	5	17
49	9	6	12
50	19	7	17
51	15	8	10
52	9	9	20
		10	22
		11	17
		12	18
		13	8
		14	15
		15	10

TABLA 4.2

Distribución del Herpes Zóster por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
SEXO				
NO CONSIGNADO	9	2.7%	53	24
MUJERES	192	56.8%	56	19
VARONES	137	40.5%	54	20
TOTAL	338	100.0%	55	19

TABLA 4.3

Frecuencia absoluta de la localización del Herpes Zóster

	CASOS
OFTALMICO	22
CABEZA	45
CUELLO	30
TORAX	156
ABDOMEN	56
EXTREMIDADES SUPERIORES	23
EXTREMIDADES INFERIORES	30

TABLA 4.4

Frecuencia de casos que están asociados con otra patología

ASOCIACION CON OTRA PATOLOGIA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADA	67	19.8%
TUMORAL	9	2.7%
NO TUMORAL	27	8.0%
DESCONOCIDA	235	69.5%
TOTAL	338	100.0%

TABLA 4.5

Frecuencia de casos que tienen antecedentes de varicela

ANTECEDENTES DE VARICELA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	216	63.9%
SI	23	6.8%
NO	16	4.7%
DESCONOCIDO	83	24.6%
TOTAL	338	100.0%

5. Uretritis venérea en los hombres

Se han registrado 81 casos que no presentan tendencia temporal, y con una edad media de 37 años.

Según el estado civil, el 63% eran solteros y el 27, 2% casados. Los otros valores de esta variable no son especialmente significativos.

El origen del contacto demuestra que el principal foco está localizado en la prostitución aunque llama la atención el 21% originado por contacto ocasional.

Treinta y cinco casos, el 43,25%, habían tenido ya uretritis de transmisión sexual anterior al episodio registrado.

Es de señalar que sólo en el 22,2% de los casos se efectuó análisis microbiológico frente a un 71,6% en que no se hicieron.

TABLA 5.1
Frecuencia de uretritis declaradas por semana

NUMERO DE LA SEMANA	
1989	
44	8
45	2
46	3
47	4
48	7
49	1
50	3
51	4
52	3
1990	
1	3
2	4
4	2
5	1
6	2
7	3
8	4
9	3
10	5
11	4
12	2
13	4
14	2
15	3
NO CONSIGNADA	4

TABLA 5.2

Distribución de las uretritis venéreas según el estado civil. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
E. CIVIL				
NO CONSIGNADO	4	4.9%	26	30
SOLTERO	51	63.0%	33	12
CASADO	22	27.2%	43	17
DIVORCIADO, SE- PARADO	1	1.2%	59	
DESCONOCIDO	3	3.7%	64	6
TOTAL	81	100.0%	37	16

TABLA 5.4

Frecuencia de uretritis venéreas según el origen del contacto

ORIGEN DEL CONTACTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	10	12.3%
CONTACTO HABITUAL	7	8.6%
CONTACTO OCASIONAL	17	21.0%
CONTACTO CON PROSTITUTAS	43	53.1%
OTROS	1	1.2%
DESCONOCIDO	3	3.7%
TOTAL	81	100.0%

TABLA 5.4

Frecuencia de uretritis venéreas con antecedentes

ANTECEDENTES DE URETRITIS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	7	8.6%
SI	35	43.2%
NO	39	48.1%
TOTAL	81	100.0%

TABLA 5.5

Frecuencia de uretritis venéreas en las que se ha efectuado análisis microbiológico

ANALISIS DE LABORATORIO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	5	6.2%
EFFECTUADO	18	22.2%
NO EFFECTUADO	58	71.6%
TOTAL	81	100.0%

6. Prescripción y demanda de tranquilizantes menores

Se registraron 1.620 casos que se distribuyeron de forma homogénea por las semanas consideradas. Sólo cabe señalar un ligero descenso en las últimas semanas de 1989 para recuperarse de nuevo en 1990.

Las mujeres superaron con mucho a los varones con un 65,9% frente a un 27,6%, no encontrándose diferencias en cuanto a la edad.

Sólo el 21,5%, fueron demandados por el paciente frente al 66,3% prescritos a iniciativa del médico de cabecera o de otro facultativo.

Poco más del 10% de las demandas por parte del paciente no fueron consideradas justificadas por el médico (39 casos de las 349 peticiones efectuadas).

Por grupos de edad la distribución es simétrica, alcanzando el punto máximo en el intervalo de 50 a 59 años con un 20%.

Según el tipo, las benzodiacepinas se llevan el mayor porcentaje de demandas y prescripciones con el 64,25%, seguido de los hipnóticos-sedantes y los no clasificados.

La posible patología que ocasionó la demanda o prescripción del tranquilizante se obtuvo a partir del estado actual del paciente, pudiéndose comprobar que el 40,5% presentaba un síndrome ansioso, seguido del 19,3% con alteraciones del sueño y el 16,9% con síndrome depresivo. Es de señalar que cerca del 30% presentaban asociación con alguna otra enfermedad física.

Por último ha de decirse que el 96,9% habían recibido ya algún tipo de tratamiento con tranquilizantes menores por otros episodios patológicos diferentes y/o anteriores a éste.

TABLA 6.1
Frecuencia de prescripción y demanda de tranquilizantes declarados por semana

NUMERO DE LA SEMANA	
1989	
44	49
45	47
46	72
47	81
48	84
49	47
50	66
51	58
52	31
1990	
1	50
2	67
3	71
4	72
5	72
6	72
7	69
8	75
9	75
10	63
11	76
12	81
13	82
14	66
15	40
NO CONSIGNADA	54

TABLA 6.2

Distribución de la demanda y prescripción de tranquilizantes por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
SEXO				
DESCONOCIDO	105	6.5%	51	20
MUJERES	1.068	65.9%	53	17
VARONES	447	27.6%	54	18
TOTAL	1.620	100.0%	53	18

TABLA 6.3

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes según el origen de la iniciativa

	PRESCRIPCION DEL TRANQUILIZANTES						TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		SI		NO			
A INICIATIVA DE:								
NO CONSIGNADO	4	9.1%	183	12.0%	9	16.4%	196	12.1%
INICIATIVA DEL PACIENTE	8	18.2%	302	19.9%	39	70.9%	349	21.5%
INICIATIVA DEL MEDICO	20	45.5%	791	52.0%	6	10.9%	817	50.4%
INICIATIVA DE OTRO MEDICO	12	27.3%	245	16.1%	1	1.8%	258	15.9%
TOTAL COLUMNA	44	100.0%	1.521	100.0%	55	100.0%	1.620	100.0%

TABLA 6.4

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes según los grupos de edad y el tipo

	TRANQUILIZANTE PRESCRITO O SOLICITADO								TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		BENZO- DIACEPINAS		HIPNOTICOS- SEDANTES		NO CLASIFICADOS			
GRUPOS DE EDAD										
20	2	1.6%	15	1.4%	15	4.2%	1	1.0%	33	2.0%
20-29	16	13.0%	77	7.4%	30	8.5%	16	15.7%	139	8.6%
30-39	15	12.2%	144	13.8%	41	11.6%	16	15.7%	216	13.3%
40-49	25	20.3%	173	16.6%	45	12.7%	21	20.6%	264	16.3%
50-59	33	26.8%	214	20.6%	63	17.8%	23	22.5%	333	20.6%
60-69	22	17.9%	202	19.4%	78	22.1%	14	13.7%	316	19.5%
70-79	9	7.3%	132	12.7%	53	15.0%	9	8.8%	203	12.5%
80 y más	1	0.8%	78	7.5%	27	7.6%	2	2.0%	110	6.8%
NO CONSIGNADO			6	0.6%	1	0.3%			7	0.4%
TOTAL COLUMNA	123	100.0%	1.041	100.0%	353	100.0%	102	100.0%	1.620	100.0%

TABLA 6.5

Frecuencia de la demanda y prescripción de tranquilizantes
según la asociación con enfermedad física

ASOCIACION CON ENFERMEDAD FISICA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	65	4.2%
SI	475	29.3%
NO	1.040	64.2%
DESCONOCIDO	37	2.3%
TOTAL	1.620	100.0%

TABLA 6.6

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes
según el estado del paciente

ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	182	11.2%
SINDROME ANSIOSO	656	40.5%
SINDROME DEPRESIVO	274	16.9%
SINDROME MANIACO	16	1.0%
SINDROME ESQUIZOFRENICO O PARANOIDE ..	26	1.6%
SINDROME DEMENCIAL	17	1.0%
ABUSO O DEPENDENCIA	30	1.9%
ALTERACIONES DEL SUEÑO	313	19.3%
NORMAL	37	2.3%
OTROS	69	4.3%
TOTAL COLUMNA	1.620	100.0%

TABLA 6.7

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes
según la existencia de prescripciones anteriores

PRESCRIPCIONES ANTERIORES DE PSICOFARMACOS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO	118	7.3%
SI	760	46.9%
NO	666	41.1%
DESCONOCIDO	76	4.7%
TOTAL	1.620	100.0%