


# Red de Médicos Centinelas de Castilla y León



Datos referidos  
a las semanas  
44 a 52 de 1989  
y 1 a 27 de 1990

Informe N° 2  
Agosto 1990



**Junta de  
Castilla y León**

Consejería de Cultura y Bienestar Social  
Dirección General de Salud Pública y Asistencia

## INTRODUCCION

*Este segundo informe de la Red de Médicos Centinelas de Castilla y León, que presenta los resultados acumulados desde Octubre de 1989 a Julio de 1990, pone de manifiesto la importancia de mantener un registro continuo y voluntario para disponer de información epidemiológica fiable y precisa.*

*En las tablas mostradas a continuación, los resultados analizados no difieren significativamente de los encontrados en el informe referido a las semanas 44 a 52 de 1989 y 1 al 15 de 1990, lo que muestra la estabilidad de las declaraciones y la veracidad de la información recibida.*

*Por otra parte, el volumen de registros acumulados de los que disponemos actualmente permiten augurar que a finales de año, cuando procesemos la información de manera mucho más exhaustiva y analítica, podamos presentar unos estimadores válidos desde el punto de vista estadístico y epidemiológico.*

*Quizás los dos puntos más sobresalientes de este informe sean la cara y cruz de cualquier sistema de colaboración voluntaria. Por una parte, el número de errores detectados en las fichas ha disminuido considerablemente, así como el porcentaje de casos que presenta ausencia de información de una o varias variables. Esto pone de manifiesto que el interés de los participantes en cubrir correctamente las fichas es cada vez mayor.*

*Como aspecto negativo, se ha observado una ligera disminución de las declaraciones recibidas en algunas de las provincias, con especial relevancia en Burgos y Valladolid. Esto ha hecho que la tasa media de participación semanal descendiera de 119 médicos entre las semanas 44/1989 y 15/1990 a 114 entre la 16/1990 y 27/1990.*

*En lo que se refiere al registro de sarampión, parotiditis y demanda de test VIH iniciado en el mes de Junio de este año, la Dirección General de Salud Pública y Asistencia espera poder ofrecer un informe preliminar de los resultados en el mes de Septiembre, una vez que tengamos recogidos los datos de un trimestre. Estos datos serán posteriormente enviados a Bruselas para ser analizados conjuntamente con los registrados en otros países europeos dentro del proyecto EUROSENTINEL.*

Centro Coordinador de la Red de Médicos  
Centinelas de Castilla y León.

*Dirección General de Salud  
Pública y Asistencia*

# 1. Declaraciones Semanales

El número de fichas que han sido enviadas durante el último trimestre (desde la semana 16 a la 27 de 1990) ha disminuido ligeramente con respecto a los datos globalizados del anterior informe. El número medio de declaraciones en este periodo ha sido aproximadamente de 114 por semana lo que supone un porcentaje medio del 81%.

Las provincias de Burgos y Valladolid son las que más han contribuido a este descenso por delante de León, Segovia y Soria que también han acusado una ligera disminución en las declaraciones.

**TABLA 1.1**  
**Número de declaraciones por semana**  
**en el conjunto de la red.**

NUMERO DE LA SEMANA	
<b>1989</b>	
44 .....	125
45 .....	126
46 .....	124
47 .....	126
48 .....	122
49 .....	120
50 .....	121
51 .....	113
52 .....	110
<b>1990</b>	
1 .....	121
2 .....	122
3 .....	120
4 .....	118
5 .....	120
6 .....	126
7 .....	126
8 .....	121
9 .....	130
10 .....	123
11 .....	129
12 .....	129
13 .....	128
14 .....	122
15 .....	118
16 .....	118
17 .....	117
18 .....	118
19 .....	120
20 .....	121
21 .....	120
22 .....	105
23 .....	109
24 .....	113
25 .....	115
26 .....	111
27 .....	104
NO CONSIGNADA .....	3



## 2. Accidentes cerebrovasculares

Al contrario que en el anterior informe, la distribución por sexo no muestra diferencias, 47,8% en mujeres y 47,6% en varones.

En lo que se refiere a la edad, tres cada cuatro accidentes cerebrovasculares están localizados en el grupo de 70 a 89 años. Se mantienen como síntomas deficitarios más frecuentes los trastornos de la palabra y de la conciencia y como factores de riesgo, la hipertensión y las cardiopatías. Es significativo también los 62 casos que declaran el tabaquismo entre los antecedentes del paciente.

El número de fallecidos ha aumentado ligeramente en estas últimas 12 semanas, situándose el porcentaje medio total en el 13,7%.

TABLA 2.1  
Frecuencia de accidentes cerebrovasculares declarados por semana

NUMERO DE LA SEMANA	
<b>1989</b>	
44 .....	14
45 .....	13
46 .....	13
47 .....	21
48 .....	11
49 .....	3
50 .....	7
51 .....	7
52 .....	6
<b>1990</b>	
1 .....	10
2 .....	21
3 .....	14
4 .....	12
5 .....	12
6 .....	20
7 .....	6
8 .....	13
9 .....	12
10 .....	9
11 .....	16
12 .....	9
13 .....	7
14 .....	8
15 .....	6
16 .....	19
17 .....	12
18 .....	4
19 .....	8
20 .....	11
21 .....	11
22 .....	11
23 .....	9
24 .....	10
25 .....	11
26 .....	11
27 .....	8

TABLA 2.2

Distribución de los accidentes cerebrovasculares por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
<b>SEXO</b>				
NO CONSIGNADO	18	4.6%	77	8
MUJERES	189	47.8%	80	9
VARONES	188	47.6%	76	10
<b>TOTAL</b>	395	100.0%	78	10

TABLA 2.3

Frecuencia de accidentes cerebrovasculares por grupos de edad y tipo

	TIPO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR						TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		ACV		ICT			
GRUPOS DE EDAD								
menos de 49			5	2.4%	1	0.6%	6	1.5%
50-59			3	1.5%	6	3.4%	9	2.3%
60-69			26	12.6%	23	13.2%	49	12.6%
70-79	4	44.4%	60	29.1%	62	35.6%	126	32.4%
80-89	4	44.4%	96	46.6%	73	42.0%	173	44.5%
90 y más	1	11.1%	16	7.8%	9	5.2%	26	6.7%
TOTAL COLUMNA	9	100.0%	206	100.0%	174	100.0%	389	100.0%

ACV: Accidente cerebrovascular de más de 24 horas de evolución.

ICT: Insuficiencia cerebral transitoria.

TABLA 2.4

Frecuencia absoluta de cada uno de los síntomas deficitarios

	CASOS
PARALISIS	148
PAREZIA	170
TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA	232
TRASTORNOS DE LA PALABRA	254
INCONTINENCIA DE ESFINTERES	101
OTROS SINTOMAS DEFICITARIOS	57
NINGUNO	9

TABLA 2.5

Frecuencia de casos según el número de síntomas deficitarios

SINTOMAS DEFICITARIOS	CASOS	PORCENTAJE
NINGUNO .....	9	2.3%
UNO .....	99	25.1%
DOS .....	108	27.3%
TRES .....	105	26.6%
CUATRO .....	46	11.6%
CINCO .....	20	5.1%
MAS DE CINCO .....	8	2.0%
<b>TOTAL .....</b>	<b>395</b>	<b>100.0%</b>

**TABLA 2.6**  
**Frecuencia absoluta de los factores de riesgo**  
**preexistentes**

	CASOS
HIPERTENSION	166
HIPERLIPIDEMIA	59
DIABETES	42
TABAQUISMO	62
CARDIOPATIA	95
VASCULOPATIA	55
OTROS	53

**TABLA 2.7**  
**Frecuencia de casos según el número de factores de riesgo**  
**preexistentes**

FACTORES DE RIESGO PREEXISTENTES	CASOS	PORCENTAJE
NINGUNO .....	60	15.2%
UNO .....	189	47.8%
DOS .....	108	26.1%
TRES .....	35	8.9%
CUATRO .....	8	2.0%
TOTAL .....	395	100.0%

**TABLA 2.8**  
**Situación después de 24 horas**

SITUACION DESPUES DE 24 HORAS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	9	2.3%
PACIENTE EN DOMICILIO .....	232	58.7%
PACIENTE EN HOSPITAL .....	98	24.8%
FALLECIDO .....	54	13.7%
DESCONOCIDO .....	2	0.5%
TOTAL .....	395	100.0%

### 3. Accidentes domésticos y peridomésticos

El número de accidentes domésticos acumulados hasta la fecha es de 1.415. En las últimas semanas se ha notado un ligero aumento de casos, probablemente debido al inicio del periodo estival (semanas 25 a 27).

Ni la distribución por sexo ni por edad muestra diferencias con el anterior informe.

Según la localización, se nota un ligero aumento en las extremidades inferiores, que se corresponde con un aumento de las caídas como causa de accidente (un 44,6% frente a un 43,7% en el informe anterior).

**TABLA 3.1**  
**Frecuencia de accidentes domésticos**  
**declarados por semana**

NUMERO DE LA SEMANA	
<b>1989</b>	
44 .....	52
45 .....	47
46 .....	37
47 .....	42
48 .....	32
49 .....	38
50 .....	43
51 .....	23
52 .....	28
<b>1990</b>	
1 .....	26
2 .....	41
3 .....	45
4 .....	44
5 .....	45
6 .....	41
7 .....	36
8 .....	34
9 .....	38
10 .....	48
11 .....	42
12 .....	46
13 .....	44
14 .....	41
15 .....	17
16 .....	32
17 .....	36
18 .....	42
19 .....	47
20 .....	41
21 .....	38
22 .....	35
23 .....	36
24 .....	34
25 .....	42
26 .....	43
27 .....	59



TABLA 3.2

Distribución de accidentes domésticos por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
<b>SEXO</b>				
NO CONSIGNADO	66	4.7%	32	27
MUJERES	788	55.7%	49	24
VARONES	561	39.6%	31	25
<b>TOTAL</b>	1.415	100.0%	41	26

TABLA 3.3

Frecuencia de accidentes domésticos por grupos de edad

GRUPOS DE EDAD	CASOS	PORCENTAJE
menos de 9 .....	192	13.6%
10-19 .....	233	16.5%
20-29 .....	126	8.9%
30-39 .....	134	9.5%
40-49 .....	124	8.8%
50-59 .....	152	10.7%
60-69 .....	225	15.9%
70-79 .....	144	10.2%
80-89 .....	71	5.0%
90 y más .....	11	0.8%
NO CONSIGNADO .....	3	0.2%
<b>TOTAL COLUMNA .....</b>	<b>1.415</b>	<b>100.0%</b>

TABLA 3.4

Frecuencia absoluta de la localización de los accidentes domésticos

	CASOS
LESIONES INTERNAS	26
EN CABEZA O CUELLO	266
EN ABDOMEN	17
EN TORAX	121
EXTREMIDADES SUPERIORES	615
EXTREMIDADES INFERIORES	418

TABLA 3.5

Frecuencia absoluta de accidentes domésticos según el tipo

	CASOS
DOMESTICO	723
PERIDOMESTICO	456

TABLA 3.6  
Frecuencia de las causas de los accidentes domésticos por sexo

	SEXO						TOTAL FILA	
	DESCONOCIDO		MUJERES		VARONES		CASOS	PORCENTAJE %
	CASOS	PORCENTAJE	CASOS	PORCENTAJE	CASOS	PORCENTAJE		
CAUSA								
NO CONSIGNADO .....	1	1.5%	7	0.9%	14	2.5%	22	1.6%
MEDICAMENTOS O DRO- GAS .....			4	0.5%	2	0.4%	6	0.4%
PRODUCTOS DEL HOGAR: DETERGENTES, PESTICI- DAS, ETC. ....	1	1.5%	17	2.2%	6	1.1%	24	1.7%
CO, HUMOS, GASES .....			8	1.0%	4	0.7%	12	0.8%
CORROSIVOS .....			6	0.8%	4	0.7%	10	0.7%
FUEGO Y LIQUIDOS CA- LIENTES .....	9	13.6%	148	18.8%	55	9.8%	212	15.0%
ELECTRICIDAD .....	1	1.5%	2	0.3%	2	0.4%	5	0.4%
CAIDAS .....	29	43.9%	372	47.2%	230	41.0%	631	44.6%
SUMERSION, SOFOCA- CION O AHOGAMIENTO ...			1	0.1%			1	0.1%
OBJETOS CORTANTES Y PUNZANTES .....	17	25.8%	130	16.5%	148	26.4%	295	20.8%
JUGUETES .....	3	4.5%	2	0.3%	10	1.8%	15	1.1%
ANIMALES DOMESTICOS			32	4.1%	31	5.5%	63	4.5%
OTROS .....	5	7.6%	54	6.9%	52	9.3%	111	7.8%
DESCONOCIDA .....			5	.6%	3	0.5%	8	0.6%
TOTAL COLUMNA .....	66	100.0%	788	100.0%	561	100.0%	1.415	100.0%

TABLA 3.7

Frecuencia absoluta y porcentaje de  
los accidentes domésticos según el lugar de tratamiento

LUGAR DE TRATAMIENTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	82	5.8%
EN CONSULTA GENERAL O AMBU- LATORIO .....	1.151	81.3%
EN HOSPITAL .....	182	12.9%
TOTAL COLUMNA .....	1.415	100.0%

TABLA 3.8

Frecuencia absoluta y porcentaje de  
los accidentes domésticos según el desenlace

FALLECIMIENTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	412	29.1%
SI .....	7	0.5%
NO .....	996	70.4%
TOTAL COLUMNA .....	1.415	100.0%

## 4. Herpes Zóster

El número de casos acumulados es de 473. No se observa una tendencia definida a lo largo del periodo considerado aunque si se pueden apreciar ligeras variaciones semanales que deban ser estudiadas en un futuro de manera más precisa.

TABLA 4.1

Frecuencia de Herpes Zóster declarados por semana

NÚMERO DE LA SEMANA		NUMERO DE LA SEMANA	
1989		1990	
44 .....	12	1 .....	9
45 .....	11	2 .....	16
46 .....	12	3 .....	14
47 .....	16	4 .....	10
48 .....	18	5 .....	17
49 .....	9	6 .....	12
50 .....	19	7 .....	17
51 .....	15	8 .....	10
52 .....	9	9 .....	20
		10 .....	22
		11 .....	17
		12 .....	18
		13 .....	8
		14 .....	15
		15 .....	10
		16 .....	10
		17 .....	9
		18 .....	4
		19 .....	9
		20 .....	14
		21 .....	9
		22 .....	14
		23 .....	13
		24 .....	11
		25 .....	14
		26 .....	19
		27 .....	11

TABLA 4.2

Frecuencia del Herpes Zóster por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
<b>SEXO</b>				
NO CONSIGNADO	13	2.7%	54	22
MUJERES	271	57.3%	56	19
VARONES	189	40.0%	54	20
<b>TOTAL</b>	473	100.0%	56	20

TABLA 4.3

Frecuencia absoluta de la localización del Herpes Zóster

	CASOS
OFTALMICO	34
CABEZA	63
CUELLO	40
TORAX	210
ABDOMEN	77
EXTREMIDADES SUPERIORES	34
EXTREMIDADES INFERIORES	44

TABLA 4.4

Frecuencia de casos que están asociados con otra patología

ASOCIACION CON OTRA PATOLOGIA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADA .....	91	19.2%
TUMORAL .....	13	2.7%
NO TUMORAL .....	48	10.1%
DESCONOCIDA .....	321	67.9%
<b>TOTAL .....</b>	<b>473</b>	<b>100.0%</b>

TABLA 4.5

Frecuencia de casos que tienen antecedentes de varicela

ANTECEDENTES DE VARICELA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	305	64.5%
SI .....	31	6.6%
NO .....	25	5.3%
DESCONOCIDO .....	112	23.7%
<b>TOTAL .....</b>	<b>473</b>	<b>100.0%</b>

## 5. Uretritis venérea en los hombres

Hasta la semana 27 de 1990 se han registrado 113 casos sin mostrar una especial tendencia. La variación más importante con respecto al anterior informe se encuentra en el origen del contacto con el aumento de más de cuatro puntos en el porcentaje de casos originados en la prostitución.

También aumenta el porcentaje de los que declaran que no han tenido antecedentes anteriores de uretritis (41,8%).

Por el contrario el porcentaje de análisis de laboratorio efectuados para descubrir el microorganismo responsable muestra un ligero y preocupante descenso, alcanzando límites considerablemente bajos (20%).

**TABLA 5.1**  
**Frecuencia de uretritis declaradas por semana**

NUMERO DE LA SEMANA	
<b>1989</b>	
44 .....	7
45 .....	2
46 .....	3
47 .....	4
48 .....	7
49 .....	1
50 .....	3
51 .....	4
52 .....	3
<b>1990</b>	
1 .....	3
2 .....	4
4 .....	2
5 .....	1
6 .....	2
7 .....	3
8 .....	4
9 .....	3
10 .....	5
11 .....	4
12 .....	2
13 .....	4
14 .....	2
15 .....	3
16 .....	4
17 .....	3
18 .....	1
19 .....	3
20 .....	1
21 .....	4
22 .....	5
23 .....	2
24 .....	5
25 .....	1
26 .....	2
27 .....	2

TABLA 5.2

Distribución de uretritis venéreas por estado civil. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
<b>E. CIVIL</b>				
NO CONSIGNADO	1	0.9%	52	
SOLTERO	73	64.6%	33	10
CASADO	32	28.3%	41	15
DIVORCIADO, SE- PARADO	2	1.8%	48	6
DESCONOCIDO	5	4.4%	64	6
<b>TOTAL</b>	113	100.0%	37	14

TABLA 5.3

Frecuencia de uretritis venéreas según el origen del contacto

ORIGEN DEL CONTACTO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	7	6.2%
CONTACTO HABITUAL .....	11	9.7%
CONTACTO OCASIONAL .....	21	18.6%
CONTACTO CON PROSTITUTAS .....	65	57.5%
OTROS .....	3	2.7%
DESCONOCIDO .....	6	5.3%
<b>TOTAL .....</b>	<b>113</b>	<b>100.0%</b>

TABLA 5.4

Frecuencia de uretritis venéreas con antecedentes

ANTECEDENTES DE URETRITIS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	4	3.5%
SI .....	49	43.4%
NO .....	60	53.1%
<b>TOTAL .....</b>	<b>113</b>	<b>100.0%</b>

TABLA 5.5

Frecuencia de uretritis venéreas en las que se ha efectuado análisis microbiológico

ANALISIS DE LABORATORIO	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	5	4.4%
EFFECTUADO .....	24	21.2%
NO EFFECTUADO .....	84	74.3%
<b>TOTAL .....</b>	<b>113</b>	<b>100.0%</b>

## 6. Prescripción y demanda de tranquilizantes menores

El número de prescripciones y demandas de tranquilizantes menores mantiene unas tasas más o menos regulares, alcanzando hasta la semana 27 de 1990 la considerable cifra de 2.300 casos registrados.

Las siguientes tablas no muestran diferencias significativas con las presentadas en el anterior informe. Sólomente en los grupos de edad, se aprecia un ligero desplazamiento hacia edades mayores: 20,2% en el grupo de 60-69 años y 13,8% en el de 70-75.

**TABLA 6.1**  
**Frecuencia de prescripción y demanda de tranquilizantes declarados por semana**

NUMERO DE LA SEMANA	
<b>1989</b>	
44 .....	49
45 .....	47
46 .....	72
47 .....	81
48 .....	84
49 .....	47
50 .....	65
51 .....	58
52 .....	31
<b>1990</b>	
1 .....	41
2 .....	68
3 .....	71
4 .....	72
5 .....	72
6 .....	72
7 .....	69
8 .....	75
9 .....	75
10 .....	64
11 .....	76
12 .....	81
13 .....	82
14 .....	66
15 .....	40
16 .....	64
17 .....	57
18 .....	61
19 .....	63
20 .....	53
21 .....	55
22 .....	69
23 .....	55
24 .....	59
25 .....	66
26 .....	60
27 .....	53
NO CONSIGNADA .....	27

TABLA 6.2

Distribución de la demanda y prescripción de tranquilizantes por sexo. Edad media y desviación estándar en cada grupo

			EDAD	
	CASOS	PORCENTAJE	EDAD MEDIA	DESV. ESTANDAR
<b>SEXO</b>				
DESCONOCIDO	142	6.2%	50	20
MUJERES	1.510	65.7%	53	17
VARONES	648	28.2%	54	18
<b>TOTAL</b>	2.300	100.0%	53	18

TABLA 6.3

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes según el origen de la iniciativa

	PRESCRIPCION DEL TRANQUILIZANTES						TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		SI		NO			
A INICIATIVA								
NO CONSIGNADO	7	11.9%	193	9.0%	15	17.4%	215	9.3%
INICIATIVA DEL PACIENTE	9	15.3%	446	20.7%	61	70.9%	516	22.4%
INICIATIVA DEL MEDICO	24	40.7%	1.159	53.8%	9	10.5%	1.192	51.8%
INICIATIVA DE OTRO MEDICO	19	32.2%	357	16.6%	1	1.2%	377	16.4%
TOTAL COLUMNA	59	100.0%	2.155	100.0%	86	100.0%	2.300	100.0%

TABLA 6.4

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes según los grupos de edad y el tipo

	TRANQUILIZANTE PRESCRITO O SOLICITADO								TOTAL FILA	
	NO CONSIGNADO		BENZO- DIACEPINAS		HIPNOTICOS- SEDANTES		NO CLASIFICADOS			
GRUPOS DE EDAD										
menos de 20	2	1.5%	28	1.9%	18	3.6%	2	1.3%	50	2.2%
20-29	18	13.3%	121	8.1%	44	8.7%	24	15.4%	207	9.0%
30-39	22	16.3%	198	13.2%	58	11.4%	24	15.4%	302	13.1%
40-49	25	18.5%	253	16.8%	62	12.2%	27	17.3%	367	16.0%
50-59	38	28.1%	289	19.2%	73	14.4%	32	20.5%	432	18.8%
60-69	18	13.3%	303	20.2%	121	23.9%	23	14.7%	465	20.2%
70-79	7	5.2%	204	13.6%	88	17.4%	19	12.2%	318	13.8%
80 y más	5	3.7%	99	6.6%	42	8.3%	5	3.2%	151	6.6%
NO CONSIGNADO			7	0.5%	1	0.2%			8	0.3%
TOTAL COLUMNA	135	100.0%	1.502	100.0%	507	100.0%	156	100.0%	2.300	100.0%



TABLA 6.5

Frecuencia de la demanda y prescripción de tranquilizantes  
según la asociación con enfermedad física

ASOCIACION CON ENFERMEDAD FISICA	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	85	3.7%
SI .....	687	29.9%
NO .....	1.472	64.0%
DESCONOCIDO .....	56	2.4%
TOTAL .....	2.300	100.0%

TABLA 6.6

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes  
según el estado del paciente

ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	220	9.6%
SINDROME ANSIOSO .....	949	41.3%
SINDROME DEPRESIVO .....	361	15.7%
SINDROME MANIACO .....	25	1.1%
SINDROME ESQUIZOFRENICO O PARANOIDE ..	42	1.8%
SINDROME DEMENCIAL .....	26	1.1%
ABUSO O DEPENDENCIA .....	41	1.8%
ALTERACIONES DEL SUEÑO .....	463	20.1%
NORMAL .....	51	2.2%
OTROS .....	122	5.3%
TOTAL .....	2.300	100.0%

TABLA 6.7

Frecuencia de demanda y prescripción de tranquilizantes  
según la existencia de prescripciones anteriores

PRESCRIPCIONES ANTERIORES DE PSICOFARMACOS	CASOS	PORCENTAJE
NO CONSIGNADO .....	110	4.8%
SI .....	1.121	48.7%
NO .....	960	41.7%
DESCONOCIDO .....	109	4.7%
TOTAL .....	2.300	100.0%