Vigilancia Epidemiológica del VIH en España, 2025

3.239 nuevos diagnósticos

Porcentaje de hombres y mujeres

	Hombres	Mujeres
	2.679 nuevos diagnósticos	560 nuevos diagnósticos
	82,7%	17,3%
Mediana de edad al diagnóstico (RIC)	35 años (28-45 años)	39 años (31-48 años)

Distribución de hombres y mujeres según edad

	Hombres	Mujeres
<25 años	11,8%	10,0%
25-34 años	35,5%	26,4%
35-44 años	26,7%	27,5%
45-54 años	15,6%	20,4%
55 años o más	10,4%	15,7%

Distribución por mecanismo de transmisión

46,9% Hombres que tienen sexo con hombres	1,5% Personas que se inyectan drogas
15,7% Hombres heterosexuales	12,2% Mujeres
23,7% Otros / No consta	


Distribución por lugar de nacimiento por hombres y mujeres

	Hombres	Mujeres
España	42,5%	29,6%
Latinoamérica	36,8%	32,5%
Europa Occidental	2,4%	2,2%
Europa Central/Este	3,0%	5,5%
África Subsahariana	4,5%	20,0%
Norte de África	3,3%	3,9%
Otros/No consta	7,5%	6,3%

Distribución según el primer recuento de CD4 (células/mm³) por hombres y mujeres

	Hombres		Mujeres	
Diagnóstico tardío <350 CD4 cel/mm³	28,1%	<200 CD4	31,8%	Diagnóstico tardío <350 CD4 cel/mm³
	21,1%	200-349 CD4	21,6%	
	21,2%	350-499 CD4	17,4%	
	29,6%	≥500 CD4	29,3%	

Porcentaje anual de cambio en las tasas de nuevos diagnósticos de VIH por 100.000 habitantes, 2013-2025



HSH: hombres que tienen sexo con hombres; PID: personas que se inyectan drogas

PUNTOS CLAVE

- Continuo descenso de las tasas de nuevos diagnósticos
- Mayor afectación en hombres y adultos jóvenes
- La vía sexual es el principal modo de transmisión
- Retraso diagnóstico en la mitad de los casos

Unidad de vigilancia de VIH, ITS , hepatitis B y C. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España, 2025. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III / División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis– Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud; 2026