

## ¿CÓMO EVITAR SU CONTAGIO?

Medidas en relación con los perros:

- No poseer más perros de los que se pueda cuidar y alimentar correctamente.
- No alimentar a los perros con vísceras crudas o cadáveres de animales. Los animales muertos y las vísceras de éstos deben ser retiradas y destruidas conforme a lo estipulado en la legislación vigente.
- Desparasitar periódicamente (cada tres meses) a los perros, mediante un antihelmíntico eficaz y destruir las heces de los perros durante los dos días siguientes a cada desparasitación.
- Siga las pautas indicadas por su VETERINARIO.

## MEDIDAS HIGIÉNICAS

Medidas higiénicas que deben adoptar las personas:

LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER  
Y DESPUÉS DE ACARICIAR O JUGAR  
CON UN PERRO



LAVAR LA FRUTA Y PRODUCTOS DE  
LA HUERTA ANTES DE SU CONSUMO

# PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS

## *EVITARLA ES FÁCIL*



## PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis o “quiste del perro”, es una enfermedad producida por un parásito, la tenia *Echinococcus granulosus*, que afecta al hombre y a los animales, principalmente perros, ovejas y cabras.

Las personas se contagian al ingerir huevos del parásito, bien por haber estado en contacto con perros infestados o bien por consumir productos de huerta o agua contaminados. Una persona que se ha contagiado desarrolla quistes hidatídicos principalmente en hígado y pulmón pero a veces en cerebro y corazón. En la mayoría de los casos el tratamiento es una OPERACIÓN QUIRÚRGICA.




IMAGEN RADIOLÓGICA DE LOS PULMONES CON HIDATIDOSIS EN SERES HUMANOS

Las ovejas y cabras se contagian cuando ingieren pastos contaminados con huevos del parásito propagados con las heces de los perros y desarrollan quistes hidatídicos en pulmón e hígado, que causan **DISMINUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CARNE Y LECHE Y MENOR VALOR ECONÓMICO DE LOS ANIMALES.**



Los perros se contagian cuando se alimentan con vísceras o cadáveres de ovejas, cabras y otros animales que tienen quistes hidatídicos.



## CICLO BIOLÓGICO

