

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. VIGIRA

Procedimiento de registro de las IRA en MEDORA y solicitud de análisis microbiológico

PROCESOS CLINICOS INCLUIDOS	CIE-10-ES
Amigdalitis aguda	J03
Bronquiolitis aguda	J21
Bronquitis aguda	J20
Covid-19	U07.1
Faringitis aguda, no especificada	J02
Influenza (gripe) debida a virus de la gripe identificados o no	J09, J10, J11
Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	J22
Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localización múltiple o no especificada	J06
Laringitis aguda obstructiva [crup] y epiglotitis aguda obstructiva	J05
Laringitis y traqueítis agudas	J04
Nasofaringitis aguda [resfriado común]	J00
Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro concepto	J15, A48.1
Neumonía por otros microorganismos infecciosos, no clasificados bajo otro concepto	J16
Neumonía en enfermedades clasificadas bajo otro concepto	J17
Neumonía por Streptococcus pNeumoníae,	J13
Neumonía por Haemophilus influenzae	J14
Neumonía vírica, no clasificada bajo otro concepto	J12
Neumonía, microorganismo no especificado	J18
Otros trastornos respiratorios especificados (1)	J98
Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto (Adenovirus; Coronavirus; VRS; Metaneumovirus)	B97.0, B97.2, B97.4, B97.81
(1) Se mantiene este código porque presentan una clara tendencia estacional y se detectan patógenos respiratorios en un alto porcentaje.	

Definición de IRA

- ☐ Aparición (o exacerbación en pacientes con enfermedad pulmonar crónica) en los últimos 10 días de al menos uno de los siguientes síntomas respiratorios:

Tos
Dolor de garganta
Disnea.
Rinitis/coriza (síntomas nasales)

Y

- ☐ Que el juicio clínico sea de un proceso infeccioso

Nota 1: Puede presentarse con o sin fiebre

Nota 2: Se entiende que la primera consulta (con el centinela o no) se realizó en los 7 primeros días desde el inicio de síntomas.

Criterios de Síndrome gripal (Influenza like illness)

- ☐ Comienzo súbito de la enfermedad en los últimos 10 días con al menos uno de los cuatro síntomas generales siguientes:

Fiebre o febrícula
Malestar general
Cefalea
Mialgia

Y

- ☐ Al menos, uno de estos tres síntomas respiratorios:

Tos
Dolor de garganta
Disnea

Claves para el registro de un proceso clínico de IRA

- No usar un Proceso Clínico abierto para incluir nuevos episodios de IRA.
- No abrir dos Procesos Clínicos para un mismo episodio..
- Anotar siempre la fecha de inicio del proceso clínico.
- No utilizar términos como Fiebre, Tos, Disnea, etc. para definir un proceso clínico, ya que estos casos no se cargan en el sistema de vigilancia y pueden originar inconsistencias con resultados de laboratorio positivo para un virus respiratorio del que no dispongamos del proceso clínico.

Selección de pacientes para la toma de MUESTRA DE SALUD PÚBLICA

- Se recogerán un **mínimo de 2 y un máximo de 4 MUESTRAS DE SALUD PÚBLICA por semana para remitir al laboratorio de Microbiología.**
- Pacientes que consultan en los 5 días posteriores al inicio de los síntomas, para asegurar una carga viral adecuada.
- Se recogerán muestras de **los dos primeros pacientes que consulten en esa semana (o en los días anteriores a la recogida de muestras en el consultorio local o Centro de Salud)** independientemente de la edad y del tipo de proceso y hasta otras dos muestras de pacientes a lo largo del resto de la semana procurando variar la edad con respecto a los dos primeros.
- **Utilizad la ETIQUETA AUTOADHESIVA ROSA** para identificar muestra y volante como MUESTRA DE SALUD PÚBLICA-RED CENTINELA SANITARIA



1. Valorar proceso clínico de IRA



Síndrome gripal

Otros procesos IRA

2. Crear proceso clínico



Síndrome gripal

- **IRA sin una focalización evidente:** registrar como 'Infección respiratoria aguda' (en infección de vías respiratorias inferiores) o 'infección aguda de vías respiratorias superiores'
- **IRA con focalización:** regístralo con cualquiera de los literales de la tabla CIE10
- **Covid-19:** Se registrarán como Covid-19 sólo aquellos casos en los que haya una prueba positiva a SARS-CoV-2

3. Abrir proceso clínico

MUY IMPORTANTE. Verificar la 'Fecha de Inicio'. Cambiarla en su caso por la fecha de inicio del primer síntoma

4. Abrir Guías asistenciales

GUÍA DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA PARA RED CENTINELA

*Completar al menos los campos obligatorios y opcionalmente la información complementaria de síntomas y del paciente

5. Solicitar PCR

Si se hace un test rápido de Ag de patógenos respiratorios, se debe tomar otro frotis para remitir al laboratorio en Medio de Transporte de Virus.



Identificar muestra y volante

6. Revisar resultado

En caso de resultado positivo o negativo a SARS-COV-2: revisar el proceso clínico asociado y cambiarlo según protocolo