



## DESAFÍO sobre la ATENCIÓN INTEGRAL de las PERSONAS con ENFERMEDAD RENAL



1. ¿Qué **dieta** recomendarías a la población sana y a las personas con enfermedad renal?

2. ¿Qué **medicamentos** precisan ajuste de dosis según la función renal?




3. ¿Cómo puedo saber el **grado** de la enfermedad renal de las personas con **factores de riesgo**?

4. ¿Es posible cuantificar y frenar la **progresión** de la enfermedad renal crónica (ERC)?




5. ¿Cuándo se debe iniciar el **proceso de toma de decisiones** relacionado con el **tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR)**?

6. ¿Cómo son los **cuidados** del paciente en TSFR con **diálisis peritoneal**?



Compruebas tus respuestas en: 2022\_ DÍA MUNDIAL RIÑÓN



# El Proceso Asistencial Integrado (PAI) para la prevención y la atención de las personas con ERC **tiene las RESPUESTAS**

1. ¿Qué **dieta** recomendarías a la población sana y a las personas con ERC?  
Las recomendaciones dietéticas vienen descritas en el [anexo 7 y 8](#) del PAI de ERC.
2. ¿Qué **medicamentos** precisan ajuste de dosis según la función renal?  
En la [ficha 1](#) se recuerdan los fármacos nefrotóxicos (pág. 21).  
El ajuste de dosis según el aclaramiento de creatinina aparece en el [anexo 3](#) (pág. 67).
3. ¿Cómo puedo saber el **grado** de la enfermedad renal de las personas con **factores de riesgo**?  
En la [ficha 4](#) del PAI se describe el diagnóstico y la clasificación pronóstica del paciente con ERC (pág. 27). Los factores de riesgo de ERC se enumeran en la [ficha 1](#) (pág. 21).
4. ¿Es posible cuantificar y frenar la **progresión** de la enfermedad renal?  
En la [ficha 6](#) se desarrolla el control de la progresión y el seguimiento del paciente con ERC (págs. 31), siendo de especial interés la [tabla 3](#) con los objetivos por nivel asistencial según el estadio del paciente con ERC (pág. 37).
5. ¿Cuándo se debe iniciar el **proceso de toma de decisiones (PTD)** relacionado con el **tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR)**?  
En los pacientes con filtrado glomerular estimado <30 ml/min/1.73m<sup>2</sup> se recomienda informar sobre las modalidades de TSFR ([anexo 9](#)) y el PTD ([anexo 10 y 11](#)), tal y como se desarrolla en la [ficha 9](#) del PAI (pág. 41).
6. ¿Cómo son los **cuidados** del paciente en TSFR con **diálisis peritoneal**?  
La atención del paciente en TSFR con diálisis peritoneal viene descrita en la [ficha 12](#) (pág. 46) y en el [anexo 12](#) aparecen los cuidados del orificio de salida del catéter peritoneal (pág. 82).

**+INFO:** [PAI ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA](#)

**CONTACTO:** [procesosasist.grs@saludcastillayleon.es](mailto:procesosasist.grs@saludcastillayleon.es)

